



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>



FROM THE LIBRARY
Professor Karl H
OF THE UNIVERSITY OF
PRESENTED TO
UNIVERSITY OF
BY
Mr. Philo P
OF DETROIT
1871

100-100



FROM THE LIBRARY OF
Professor Karl Heinrich Rau
OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN


BY
Mr. Philo Parsons


OF DETROIT

1871

AP
20
B75







BIBLIOTHEQUE



BRITANNIQUE;

OU

R E C U E I L

Extrait des ouvrages Anglais périodiques &
autres, des Mémoires & Transactions des
Sociétés & Académies de la Grande-Bretagne,
d'Asie, d'Afrique & d'Amérique;

en DEUX SÉRIES, intitulées:

L I T T É R A T U R E

E T

S C I E N C E S E T A R T S,

rédigé à Genève,

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES.

TOME NEUVIEME.


SCIENCES ET ARTS.



A G È N E V E ,

De l'imprim. de la BIBLIOTH. BRITANNIQUE.

1 7 9 8.



P H Y S I Q U E.

SOME. OBSERVATIONS ON THE PHÆNOMENA WHICH TAKE PLACE BETWEEN OIL ET WATER, &c. Observations sur les phénomènes qui ont lieu quand on jette de l'huile sur de l'eau, adressées en forme de lettre au Dr. THOMAS PERCIVAL, Membre de la Société Royale de Londres, &c. par le Dr. MARTIN WALL, Professeur de Chimie dans l'Université d'Oxford; avec une réponse du Dr. PERCIVAL, & une réplique du Dr. WALL; tirées du 2d. vol. des mémoires de la Société *Littéraire & Philosophique* de Manchester. — On a joint à cet Extrait celui d'une lettre relative au même sujet, adressée par Mr. RICHARD PATTERSON au Dr. BENJ. RUSH de Philadelphie & tirée du 3^e. vol. des *Transactions Américaines*.

Si l'on verse de l'huile sur de l'eau agitée; l'huile se répand à l'instant sur la surface de l'eau & la recouvre comme une fine pellicule, dont l'épaisseur est proportionnée d'une part à la quantité de l'huile, & de l'autre à l'étendue de la surface qu'elle tapisse. Mais ce qu'il y a de très-singulier, c'est que l'agitation de l'eau

cesse à l'instant. Ce phénomène connu depuis long-temps n'avoit encore fait l'objet des recherches d'aucun philosophe. On n'y avoit fait aucune attention, lorsque dans un voyage de Londres en Amérique, le D. FRANKLIN frappé de l'extrême agitation que les moindres balancemens du vaisseau faisoient éprouver à de l'eau sur laquelle il avoit fait surnager de l'huile, fit remarquer la singularité de ce phénomène, d'abord dans une de ses lettres imprimées à Londres en 1769, & ensuite dans un mémoire lu à la Société Royale de Londres, & inséré dans les transactions philosophiques pour l'année 1775. Dès lors le phénomène même du calme que l'huile donne à la surface de l'eau agitée a passé pour une découverte du Dr. Franklin, quoique loin de se l'attribuer, il cite plusieurs preuves de sa haute antiquité. Dans le mémoire dont nous donnons ici l'extrait, le Dr. Wall montre par de nouveaux indices très-frappans que le fait étoit connu depuis plusieurs siècles, & que les marins en ont souvent tiré parti dans les tempêtes. « Ce n'est pas, ajoute-t-il, » le seul exemple qu'on puisse citer de « l'oubli dans lequel demeurent souvent des phénomènes très-communs, quoique très-singuliers, & du besoin qu'ils ont d'être présentés aux Philosophes par un homme de génie & déjà célèbre, » pour les engager à y faire attention. »

Ce mémoire adressé par l'auteur à son ami

EFFETS DE L'HUILE SUR L'EAU. 3

le Dr. Percival de Manchester pour le mettre sous les yeux de la Société Littéraire & Philosophique de cette ville, a pour objet principal une nouvelle explication du phénomène, différente de celle qu'en avoit donnée le Dr. Américain. Celui-ci avoit recours pour l'expliquer à un prétendu principe de répulsion qu'on a depuis long-temps imaginé exister entre l'huile & l'eau. Le Dr. Wall cherche à prouver que la différence seule d'attraction entre les particules de l'eau & celles de l'huile suffit pour en rendre raison. Le Dr. Percival soutient dans sa réponse le principe de répulsion. Le Dr. Wall dans sa réplique l'attaque de nouveau & réfute les objections faites contre son hypothèse. Dans cette discussion, le Dr. Percival rappelle le phénomène observé par Franklin dans son voyage maritime. Il cherche à en tirer parti pour appuyer son opinion. Le Dr. Wall lui dispute cet avantage; il explique mécaniquement ce phénomène; & c'est cette explication qu'un troisième interlocuteur, Mr. Patterson, vient attaquer dans les transactions Américaines, en lui en substituant une autre fondée sur un principe d'hydrostatique qui lui paroît rendre beaucoup mieux raison & du fait lui-même, & d'autres faits analogues.

Tel est le précis de ces quatre mémoires. Revenons sur les détails, en commençant par le mémoire du Dr. Wall. En voici le résumé:

PHYSIQUE.

Le principal agent de la nature dans toutes ses opérations paroît être l'attraction que toutes les parties de la matière ont les unes pour les autres. Mais les phénomènes de la gravitation, de la cohésion, de l'électricité, du magnétisme, & des affinités chimiques, montrent que ce principe est susceptible de différentes modifications, qu'il n'obéit pas toujours aux mêmes loix. On voit souvent deux corps qui s'attirent mutuellement, être repoussés par un troisième, & même en certaines circonstances se repousser entr'eux. Pour expliquer ces disparates, dont l'électricité & la magnétisme offrent surtout plusieurs exemples, les philosophes ont eu recours à un principe agissant en sens contraire de l'attraction, & dont ils supposent que l'action commence là où celle de l'attraction finit. Ce principe qu'on a appelé le principe de *répulsion* a été admis même en chimie; & quand deux corps ne montrent aucune disposition à se réunir, on leur attribue assez généralement une faculté répulsive l'un à l'égard de l'autre. Ce seroit pousser peut-être l'hétérodoxie un peu trop loin que de nier totalement en physique l'existence d'un principe de répulsion; mais il y a lieu de croire qu'en chimie, on en a porté l'application trop loin, & que dans les cas où l'on n'apperoit aucune affinité entre deux corps, il n'est pas nécessaire de supposer entre eux un principe contraire.

EFFETS DE L'HUILE SUR L'EAU. 7

Ainsi , par exemple quoique l'huile ne se mêle point avec l'eau sans un intermede , il ne s'ensuit pas qu'il y ait entr'eux une vraie répulsion. C'est peut-être tout simplement un de ces cas auxquels on a donné le nom d'*attraction élective* ; & pour expliquer cette immiscibilité , il suffit de supposer que les parties de l'eau s'attirent entre elles avec plus de force qu'elles n'attirent celles de l'huile , & réciproquement. On sent qu'il doit nécessairement résulter de cette supposition que si l'on verse de l'huile sur de l'eau , ou même si l'on agite fortement ensemble ces deux fluides , les particules de l'huile tendront à se réunir entr'elles & à se séparer de l'eau , surtout si celles de l'eau ont la même tendance à se séparer de l'huile.

Appliquons cette théorie à quelques-uns des phénomènes qui résultent du contact de ces deux fluides. Le Dr. Nash nous apprend dans son histoire du comté de Worcester (*Nash's hist. of Worcester-shire* ; vol. I. pag. 300) que dans la fabrique de sel commun à Droitwich ; on jette dans la chaudiere qui contient la saumure un morceau de résine pour rendre le grain du sel moins grossier. Il ajoute que Mr. Romney l'un des principaux propriétaires de cette fabrique lui a assuré que plus on mettoit de résine , plus le grain du sel étoit fin , à tel point que si l'on en mettoit seulement la grosseur de deux noix , le sel ne se cristalliferoit

point du tout. Le beurre , le suif & toute autre substance huileuse susceptible de se liquéfier par la chaleur nécessaire pour faire bouillir la saumure , ont le même effet. Elles se fondent sans se mêler à l'eau , mais se répandent sur sa surface , sous la forme d'une pellicule d'autant plus épaisse qu'on en a mis davantage. Or on sait que la cristallisation ne se fait bien que lorsque l'eau s'évapore lentement & présente une grande surface à l'air , parce que l'air est aussi nécessaire que l'eau à la formation des cristaux , dont il est comme elle une des parties constituantes. Si donc la communication de l'air avec l'eau est interrompue , comme elle doit l'être par l'interposition de la lame huileuse dont nous venons de parler , la cristallisation se fera mal , le sel se déposera en très-petits cristaux au fonds de la chaudière , & son grain sera d'autant plus fin que l'interception sera plus complète.

Le fait cité par le Dr. Franklin & si bien décrit par lui du calme qui résulte de l'huile répandue sur la surface de la mer agitée , est susceptible d'une explication parfaitement analogue. On sait que l'air a pour l'eau une grande attraction. Quand ces deux fluides sont en contact , ils adhèrent & se réunissent l'un à l'autre avec la double force d'une affinité chimique & d'une cohésion mécanique , tellement qu'on les trouve rarement l'un sans l'autre , l'air con-

EFFETS DE L'HUILE SUR L'EAU. 9

tenant toujours plus ou moins d'eau, & l'eau plus ou moins d'air. C'est pourquoi, lorsque dans une tempête, une masse considérable d'air est poussée avec une grande force sur la surface de l'eau, l'air se saisit pour ainsi dire de l'eau, l'entraîne avec lui dans son cours, & ne s'en sépare que lorsque la masse d'eau soulevée réagit par son poids, & retombe pour prendre son niveau. C'est par ces impulsions & ces réactions fréquemment répétées que l'eau contracte enfin cette violente agitation qui constitue la tempête. Mais si on jette de l'huile sur la surface de l'eau, elle se répand sur le champ au loin en une pellicule non interrompue, qui intercepte absolument la communication de l'eau avec l'air, en sorte que ce dernier fluide n'ayant que peu ou point d'attraction pour l'huile ne mord point sur elle, glisse sur sa surface, & n'y occasionne aucune agitation, aucun tumulte.

Il n'est pas besoin de supposer pour cela aucune force répulsive entre l'huile & l'eau. Il suffit que les parties de l'huile aient entr'elles une forte attraction, & qu'elles n'en aient que peu ou point pour l'eau ou pour l'air. On peut même conclure directement de la facilité & de la promptitude avec laquelle l'huile se répand sur la surface de l'eau qu'elle n'en est pas repoussée. Si elle l'étoit, elle fuirait, pour ainsi dire, le contact de l'eau, elle se réunirait en globules, & fuirait vers les bords, au lieu

que si l'on ne suppose aucune répulsion pareille : elle doit naturellement par sa légèreté spécifique, surnager sur l'eau, & suivant les loix de l'hydrostatique, se répandre également au loin pour reprendre son niveau.

Cette propriété que l'huile a de calmer l'agitation de l'eau sur laquelle on la répand est accompagnée d'une autre propriété non moins remarquable, qui est de la rendre plus transparente, soit parce que la plus légère ondulation de l'eau tendant toujours à troubler sa limpidité, l'huile la rétablit en faisant cesser l'agitation, soit parce que l'addition de l'huile modifie la réfraction de la lumière. Quoiqu'il en soit le fait est certain. Bien que peu observé par les philosophes, il paroît avoir été connu par tous les peuples du monde. Pline en parlant de la mer dit expressément que « l'huile » a la propriété de calmer son agitation & d'augmenter sa transparence ». Il ajoute que « c'est » par cette raison que les plongeurs ont soin » d'en tenir dans leur bouche pour la répandre sur l'eau. (1) « Plutarque en fait le sujet d'une de ses questions de philosophie naturelle. » Quelle est la cause du calme & de la transparence de l'eau arrosée d'huile, » ? (2) On

(1) *Omne oleo tranquillari, & ob id urinantes ore spargere, quoniam mitiget naturam asperam, lucemque deportet.*

(2) *Δια τι της θαλάσσης εἰσὼν καταρρονομένης χιμερῆς καταρροενία καὶ γαλήνη.*

EFFETS DE L'HUILE SUR L'EAU. IX

trouve dans le naufrage d'Erasme ce passage singulier. En parlant des divers efforts que faisoient les matelots dans la tempête. « Quelques-uns, » dit-il, se prosternoient, adorant la mer, rappelant de vieux contes & jetant à grands flots sur les ondes tout ce qu'ils pouvoient trouver d'huile sur le vaisseau. » (1)

Dans l'édition des Elzevirs, ce passage est éclairci par une note dans laquelle on remarque que « l'huile a la propriété de donner de la lumière, & de répandre partout le calme, même sur la mer, le plus implacable des élémens. » (2)

Et ce n'est pas ici un objet de pure spéculation. Les pêcheurs de la côte de Provence, ceux qui habitent les bords du Tage près de Lisbonne, les habitans des isles Hébrides, & jusqu'à ceux de St. Kilda, la plus reculée de ces isles, ont recours au même moyen pour distinguer avec plus de facilité les moules & autres coquillages au fonds de la mer. Enfin dans le *Register annual* (3) pour l'an 1760, c'est-à-dire 15 ans avant la publication du mémoire du Dr. Franklin, on trouve un passage curieux ;

(1) *Nonnulli procumbetes in fabulas adorabant mare, quicquid erat olei effundentes in undas.*

(2) *Ea natura est olei, ut lucem afferat, ac tranquillat omnia, etiam mare, quo non aliud elementum implacabilius.*

(3) Journal historique très-estimé qui se publie à Londres toutes les années.

probablement copié des papiers du jour. « Dans
 » le terrible incendie qui eut lieu il n'y a pas
 » long - temps sur les bords de la Tamise ,
 » on remarqua que l'huile qu'on avoit jeté
 » dans la riviere pour empêcher les progrès du
 » feu , avoit visiblement calmé l'agitation des va-
 » gues. Il paroît que cette propriété de l'huile
 » de calmer la surface de l'eau , est connue de-
 » puis long-temps. Une ancienne loi prescrivait
 » dans les cas de tempête , où l'on est obligé
 » de jeter les marchandises à la mer pour allé-
 » ger le vaisseau , de commencer par l'huile ,
 » s'il s'en trouvoit à bord. — Les habitans de
 » Raguse sont encore aujourd'hui dans l'usage ,
 » lorsqu'ils vont à la pêche au harpon , de jeter
 » de l'huile sur l'eau avec un arrosoir pour
 » mieux voir jusqu'au fonds. Les ouvertures
 » que forment ainsi sur l'eau les gouttes d'huile ,
 » portent dans leur pays le nom de fenêtres. »

Telle est la substance du Mémoire du Dr. Wall. Voici celle de la réponse du Dr. Percival.

1^o. Il commence par rappeler le phénomène décrit par le Dr. Franklin relatif à l'agitation de l'eau sous l'huile. Si l'on verse de l'eau dans un verre ordinaire jusqu'au tiers de sa hauteur , & qu'on y verse ensuite autant d'huile , qu'on suspende le verre par une ficelle nouée à la distance d'un pied au-dessus du verre , & qu'en tenant la ficelle par le nœud , on lui fasse éprouver de légers balancemens pareils à ceux

qu'il éprouveroit dans un vaisseau dans lequel il seroit suspendu au plafond, on verra l'huile à la surface parfaitement unie & tranquille, tandis que l'eau paroîtra au-dessous dans une grande agitation. Mais si l'on verse l'huile, & qu'on la remplace par de l'eau, la totalité du fluide paroîtra immobile, & la surface demeurera parfaitement tranquille. « J'ai montré cette » expérience à plusieurs personnes, » dit le Dr. Franklin. « Ceux qui n'avoient qu'une » connoissance superficielle des principes de » l'hydrostatique ont cru d'abord être en état » d'expliquer le phénomène. Mais l'explication » qu'ils en ont donnée, a beaucoup varié & » m'a paru inintelligible. Ceux qui étoient plus » profondément versés dans cette science ont » trouvé le fait singulier, & ont promis d'y » réfléchir. Il mérite en effet qu'on y réfléchisse. » Car un phénomène inexplicable par nos vieux » principes peut nous en fournir de nouveaux » dont on tirera peut-être quelque parti pour » la solution d'autres problèmes obscurs dans » les sciences naturelles. » Le Dr. P. attribue ce phénomène, non sans quelque défiance, à la répulsion qui a lieu entre les particules de l'huile & celles de l'eau. Il rapporte cette répulsion aux oscillations de l'æther subtil qui, suivant Sir Isaac Newton, traverse tous les corps, oscillations qui en augmentant sa densité, doivent aussi augmenter sa force élasti-

que. Le Dr. Franklin ne trouveroit peut-être pas cette explication fort intelligible. Mais ce qui l'est davantage, c'est le parti que le Dr. P. tire du fait même pour expliquer l'effet des matieres huileuses qu'on répand sur la surface de la saumure en ébullition. L'agitation de la saumure lui paroît devoir être augmentée, comme celle de l'eau dans le verre, par la lame huileuse dont on la recouvre, & il n'en faut pas davantage pour rompre la cristallisation du sel.

2°. Tout le monde connoît les effets suffoquans de l'air chargé des exhalaisons de la graisse brulée, ou de la mouchure de chandelle. Quand on inspire ces vapeurs, on éprouve dans la poitrine une sensation de conflit très-différente de celle que procure l'inspiration de l'acide carbonique ou de l'air inflammable. L'explication la plus simple qu'on puisse donner de ce phénomène n'est-elle pas que l'air abandonnant les parties huileuses pour se réunir aux parties aqueuses avec lesquelles il entre en contact, une grande force répulsive succede à l'attraction qui le réunissoit aux premières? Car comme on voit en algebre les quantités négatives commencer lorsque les quantités affirmatives s'évanouissent, de même aussi en physique la répulsion commence quand l'attraction finit.

3°. On a un grand nombre de preuves de

cette force de répulsion. Tout le monde connoît l'éclat que jettent les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles de chou. On a démontré qu'il provient d'une abondante réflexion de lumière par la surface inférieure & aplatie de ces gouttes. Or c'est ce qui ne pourroit pas avoir lieu s'il y avoit un contact parfait & sans intervalle entre la feuille & la goutte. Puis donc qu'il y a un intervalle entre elles, il y a répulsion, & c'est ce qui explique la volubilité de ces gouttes, & leur chute le long de la feuille, sans laisser aucune trace d'humidité après elles. — Un autre exemple encore très-évident de répulsion, est celui d'une aiguille d'acier poli qu'on peut faire flotter sur l'eau, parce que si on la pose doucement, elle n'entre pas en contact avec l'eau, mais se fait sur sa surface par sa force répulsive un lit dont la concavité est beaucoup plus grande que le volume de l'aiguille.

4°. Les attractions & les répulsions qui ont lieu entre la rosée & certaines substances sont encore plus remarquables. On connoît les expériences par lesquelles Muschembroeck a prouvé que certains corps l'attirent avec beaucoup de force, tandis que d'autres la repoussent. Ces expériences ont été répétées par l'académicien Dufay qui a fait voir que la rosée tombe abondamment dans les vases de verre ou de porcelaine; mais absolument point dans

ceux de métal, surtout si le métal est bien poli. Si l'on place à la même exposition, & à côté l'une de l'autre, deux soucoupes, l'une de porcelaine sur un plat d'argent, & l'autre d'argent sur un plat de porcelaine, la soucoupe & le plat de porcelaine se trouvent couverts de rosée, tandis qu'il n'en tombe pas une goutte sur la soucoupe ou le plat d'argent. Il y a plus. Deux verres de montre parfaitement semblables furent placés l'un au milieu d'un plat d'argent & l'autre au milieu d'un plat de porcelaine, en entourant le premier d'un anneau d'argent bien poli pour que le côté convexe du verre fût bien à l'abri de la rosée. Au bout de quelques jours le second verre se trouva contenir cinq ou six fois plus de rosée que le premier. Elle étoit dans celui-ci ramassée en petites gouttes dans le centre; & ces gouttes devenoient toujours plus petites en approchant du bord, autour duquel, dans toute la circonférence intérieure du verre, il y avoit un espace parfaitement sec. Cette expérience fut répétée 30 fois; toujours avec le même succès.

Le Dr. Watson, aujourd'hui Evêque de Landaff, en a depuis peu confirmé les résultats par une suite d'expériences très-curieuses faites dans le but de déterminer la quantité des vapeurs qui s'élèvent dans un espace donné de la surface de la terre. Voici ses propres paroles : « au moyen d'un peu de cire je fixai un petit
 » écu,

EFFETS DE L'HUILE SUR L'EAU. 17

» écu au milieu du côté concave d'un verre,
 » de manière qu'il en fut très-près sans le tou-
 » cher. Je plaçai le verre sur du gazon, avec
 » sa convexité en-déhors. Il fut à l'instant com-
 » vert de vapeurs partout ailleurs que dans le
 » voisinage de l'écu. Non-seulement l'écu en-
 » étoit lui-même parfaitement exempt : mais il
 » avoit empêché les parties voisines de son bord
 » d'en recevoir. Car entre la partie du verre
 » située immédiatement au-dessous, il y avoit
 » tout autour de l'écu sur le verre, un anneau
 » large d'un quart de ponce, parfaitement sec,
 » comme si l'écu avoit repoussé les vapeurs jus-
 » ques-là. Un grand pain à cacheter rouge,
 » un cercle de papier blanc, & plusieurs autres
 » substances, dont il seroit ennuyeux de faire
 » l'énumération, eurent exactement le même
 » effet &c. (*Watson's chemical Essays. V. III. p. 64*)

Tels sont les faits d'après lesquels le Dr. P.
 se croit autorisé à regarder le principe de ré-
 pulsion comme un puissant agent dans les opé-
 rations de la nature. C'est à lui, » dit-il, « que
 » l'air que nous respirons doit probablement
 » son existence & son élasticité, la lumière qui
 » nous éclaire son mouvement rapide, & ses
 » diverses inflexions, & le feu son énergie vivi-
 » fiante. Cela posé, l'analogie permet-elle qu'on
 » exclue la répulsion de cette branche de la phy-
 » sique que comprend la chimie ? c'est une ques-

» tion que je soumets de nouveau au génie philosophique du Dr. Wall. »

Celui-ci accepte le défi , & le soutient avec un ton de civilité rare entre les Savans. Il commence par déclarer qu'il est fort éloigné de nier absolument le principe de répulsion en physique. Ce principe lui paroît incontestablement devoir être admis pour expliquer les phénomènes de l'électricité & du magnétisme. Mais il soutient qu'en chimie on n'en a pas besoin & que les répulsions apparentes peuvent toujours s'y résoudre en de simples attractions électives.

Il écarte ensuite de la question le sentiment de suffocation qu'on éprouve en respirant les vapeurs de l'huile brûlée, comme n'ayant rien de commun avec le principe de répulsion entre l'huile & l'eau , & comme s'expliquant très-naturellement par la phlogistification de l'air imprégné de ces vapeurs qui le rendent non-seulement peu propre à déphlogistiquer le sang & à se convertir en air fixe, mais encore très-irritant en lui-même. Le Dr. W. paroît ici , comme en quelques autres endroits de son mémoire, encore imbu de l'ancienne théorie. Il ne parle ni de la décomposition de l'air dans les poumons, ni de l'absorption de l'oxigène par le sang. Il suppose que le principal effet de la respiration est d'enlever au sang le phlogistique surabondant. Mais son raisonnement n'en est pas moins concluant. Il suffit d'admettre que l'air

EFFETS DE L'HUILE SUR L'EAU. 19

imprégné de ces vapeurs ne peut servir à la respiration, & qu'elles sont elles-mêmes très-irritantes, & c'est ce qui ne peut gueres se nier, pour expliquer parfaitement bien le phénomène, lors même qu'au lieu de répulsion on supposeroit une attraction très-forte entre ces vapeurs & l'humidité naturelle des poumons.

Le Dr. W. n'admet point en chimie les lois de l'attraction mécanique, encore moins les propriétés des quantités algébriques, & il regarde avec le Dr. Lewis comme un point très-important de doctrine, la distinction des deux especes d'attraction qu'on observe l'une dans les phénomènes mécaniques, & l'autre dans les phénomènes chimiques. On ne peut sans s'exposer à de grandes erreurs appliquer à l'une les lois de l'autre.

Les gouttes de pluie qui tombent sur la feuille de chou sans la mouiller l'ont d'abord ébranlé en faveur du principe de répulsion; mais en y réfléchissant, il a vu que le même effet a lieu lorsque l'eau tombe goutte à goutte sur des substances en poussière avec lesquelles elle a d'ailleurs beaucoup d'affinité, comme la farine, surtout si ces substances sont sur un plan incliné. Qui fait si les feuilles de chou ne sont pas ordinairement recouvertes de la poussière qui flotte dans l'air, ou de quelque farine résineuse, ou de quelques gouttes imperceptibles de rosée huileuse, qui par leur sphéricité empêchent les

gouttes d'eau d'entrer en contact avec la feuille & les font rouler en globules par l'effet de l'attraction intrinsèque & réciproque de leurs parties ? (1) C'est ainsi que le mercure roule en globules non-seulement sur le bois ou le marbre, mais encore sur d'autres substances avec lesquelles il a beaucoup d'affinité, telles que l'étain & le cuivre, & même l'or & l'argent, quoique l'affinité que ces deux derniers métaux ont avec lui, surmonte beaucoup plus promptement l'attraction intrinsèque & réciproque de ses parties, qui le force à se mettre en globules. En général c'est à cette attraction réciproque que toutes les parties d'un liquide quelconque ont entr'elles, qu'est due leur tendance à se mettre en globules, lorsque la quantité en est peu considérable; l'attraction même plus grande que d'autres corps ont pour elles ne surmonte cette tendance & ne force les gouttes à s'applatir & à se répandre sur ces corps qu'au bout d'un temps plus ou moins long, proportionnellement à la force de cette dernière attraction.

Quant à l'expérience de l'aiguille flottante, le Dr. W. l'a examinée avec la plus grande

(1) Cette conjecture se trouve vérifiée par les belles Observations de *Dumont de Courset* sur les substances glauques, observations qui ont été publiées par *Boucher* dans le *Journal de Physique* pour le mois d'Avril 1798, page 279. (R)

attention, tant à l'œil nud qu'avec une bonne loupe, & il s'est convaincu qu'il n'est pas exact de dire que l'aiguille ne touche l'eau en aucun point. Il y a plusieurs points de contact ; mais il est vrai que le contact n'est pas général, ce que notre auteur explique, d'après les principes de l'ancienne théorie chimique, en faisant remarquer que l'eau a peu d'attraction pour les corps qui contiennent beaucoup de phlogistique, particulièrement lorsque la surface de ces corps est bien polie, de manière à ne mettre aucune entrave à celles de leurs propriétés qui dépendent du phlogistique. Tous les métaux, mais surtout l'acier bien poli sont dans ce cas là. L'eau a de la peine à les mouiller. Elle n'adhère point à leur surface, ou si elle y adhère, ce n'est que par places & d'une manière interrompue. Que le fait dépende ou non du phlogistique, peu importe. Il n'en est pas moins curieux. Faut-il pour l'expliquer avoir recours à un principe de répulsion ? L'auteur n'en voit pas la nécessité. Une attraction foible ou nulle lui paroît suffisante pour en rendre raison.

Enfin quant au fait de l'agitation de l'eau sous l'huile, cette agitation contribue sans doute à rompre la cristallisation du sel, mais elle ne suffit pas pour expliquer l'utilité de l'huile sur la saumure, parce que si l'agitation seule de l'eau étoit la cause de la finesse du grain, il suffiroit de tenir constamment la saumure agi-

tée par l'ébullition pour produire le même effet ; ce qui est contraire à l'expérience.

Au surplus , il n'est pas besoin de recourir à un principe de répulsion entre les deux fluides pour résoudre le problème proposé à cet égard par Franklin. Il s'explique facilement par leur différence de gravité spécifique qui leur fait recevoir l'impulsion dans des proportions inégales , & par la légèreté de l'huile, légèreté qui lui maintient constamment sa position à la surface , quelle que soit l'agitation de l'eau au-dessous.

Mais, dit à cette occasion Mr. Patterson, si cette explication étoit juste, il s'ensuivroit qu'en mettant sous l'huile du mercure au lieu d'eau , l'agitation de ce fluide à la moindre impulsion seroit beaucoup plus grande , puisqu'en raison de sa gravité spécifique bien supérieure à celle de l'eau , il recevrait l'impulsion dans une proportion beaucoup plus grande. C'est précisément le contraire de ce qui arrive. L'agitation du mercure sous l'huile est très-légère. De plus , si l'on verse deux fluides de gravité spécifique inégale dans deux verres différens , & qu'on les mette en mouvement avec le même degré de vitesse , on trouvera l'agitation du fluide le plus pesant, moindre que celle du fluide le plus léger ; le premier aura plus de tendance à maintenir son niveau ; l'explication du Dr. W. ne peut donc pas se soutenir. Mais on peut en donner

une autre beaucoup plus plausible.

Lorsque la gravité spécifique d'un corps plongé dans un fluide n'est pas de beaucoup supérieure à celle de ce fluide, sa tendance de bas en haut dans le fluide est peu inférieure à sa tendance de haut en bas, & une légère impulsion suffit pour lui donner la première direction. C'est le cas de l'eau plongée dans l'huile. Une impulsion aussi légère que celle des balancemens d'un vaisseau, suffit pour la faire ondoyer & lui donner l'agitation dont parle le Dr. Franklin.

Si cette explication est juste, l'agitation du fluide inférieur sera d'autant plus grande, que sa différence de gravité spécifique avec le fluide supérieur sera plus petite & réciproquement. Aussi voit-on que l'agitation du mercure sous l'eau est très-petite, & celle de l'eau sous l'huile beaucoup plus grande; mais elle est surtout très-considérable entre l'huile & l'esprit-de-vin; parce que la gravité spécifique de ces deux fluides est à-peu-près égale. D'après ce principe, elle doit être presque nulle entre l'eau ou l'huile & l'air, & c'est ce qui, beaucoup mieux que la ténacité de ses parties, explique la tranquillité de la surface supérieure de l'huile dans l'expérience de Franklin. Car si on fait flotter sur la surface de l'huile un liquide beaucoup plus pesant que l'air, mais un peu plus léger que l'huile, tel que l'éther, la surface de l'huile est agitée à la moindre impulsion.

comme le feroit celle d'un autre fluide.

Voilà pourquoi , ajoute Mr. P. , lorsqu'en hiver nous mettons notre biere auprès du feu pour la réchauffer , il suffit de balancer un instant le pot qui la contient pour mêler parfaitement les parties froides avec les parties chaudes , & pour rendre sa température uniforme , parce qu'il n'y a qu'une très-petite différence de gravité spécifique entr'elles.

Qu'il nous soit permis de remarquer en finissant que c'est probablement là ce qui a fait pendant si long-temps illusion aux Physiciens sur le prétendu pouvoir attribué par eux aux fluides comme aux solides de conduire la chaleur , illusion que le Comte Rumford vient de dissiper , en démontrant que les fluides sont absolument privés de ce pouvoir. Mais puisque la moindre impulsion suffit pour mêler leurs différentes parties , ils n'en ont pas besoin.

SUFFRAGES BRITANNIQUES FAVORABLES A LA PHYSIQUE SPÉCULATIVE. (1)

Ce siècle , surnommé *philosophique* ; qui se dit si bien affranchi , du joug de toute *Autorité* ; y est cependant encore asservi , à l'égard de certaines Questions délicates ; savoir ; quand il croit pouvoir se dispenser de les examiner ;

(1) Voy. Vol. 8. Sc. & Arts , p. 140.

en s'en rapportant passivement à quelques grands noms , sur ce qu'il doit en penser. Et cela doit être ainsi : Vû l'immense Multitude d'Ecrits , qui s'offrent actuellement à nôtre curiosité , sans que pourtant nôtre vie soit plus longue que celle de nos dévanciers.

Si donc , ces respectables Autorités ; passaient (par exemple) pour avoir proscrit certaines Recherches , comme *infructueuses* à tous égards. Il étoit assés naturel ; que la foule des Lecteurs , les regardât du même œil.

Seulement. On aurait dû s'assurer auparavant ; si le *Fait* , n'étoit pas exagéré , ou même hasardé : C'est-à-dire ; si ces premiers Juges , n'avaient point modifié leur sentence , par quelques restrictions ; ou si même , ils n'avaient pas été d'un Avis contraire à celui qu'on leur prête.

Mais : Les mêmes occupations ou distractions ; qui avaient détourné tant d'Esprits superficiels , d'examiner le fond même des Questions ; les ont détournés aussi , de vérifier (par une lecture soigneuse des livres originaux) , si leurs Auteurs avaient réellement soutenu les Opinions que le bruit public leur attribue.

Non-seulement ; ils n'ont point eu occasion , de se guérir de leurs *Préjugés* : Mais encore ; ils s'y sont confirmés de plus en plus ; soit , par la répercussion mutuelle des Echos ; soit par le silence , (pris pour approbation) du petit

nombre d'Esprits éclairés qui auraient pu détruire ces Préjugés.

Il serait bien temps enfin ; que quelqu'un qui fut écrire avec un peu d'énergie , réclamât hautement , contre ces Citations incomplètes (ou même infidèles), qui ont entraîné tant de gens inattentifs. Et en attendant mieux. Il ne fera pas entièrement inutile ; qu'on ébauche du moins de gros en gros , une telle *Réclamation* : Ce qui donnera peut-être l'Éveil , à des Ecrivains capables de la développer convenablement.

Chapitre I. LE CHANCELIER BACON.

M'étant occupé , pendant toute ma jeunesse , de la recherche des Causes générales : Mais , ayant ensuite vu affirmer (& répéter jusqu'à Pennui) , dans presque tous les Livres modernes de Physique ; que le grand BACON , avait condamné cette Recherche , comme désespérée & comme inutile. Je voulus enfin savoir ; sur quelles Raisons , ce Législateur de la Philosophie appuyait deux Opinions , qui ne me paraissent point raisonnables. Car ces Ecrivains , ne rapportaient jamais que ses simples Affertions. Et il me parut indispensable , de m'en informer , par moi-même : Parce que je soupçonnais fort ; qu'il n'y avait qu'un petit nombre d'entr'eux , qui eussent lu l'Original : Puisqu'ils s'accordaient tous , à en citer les mêmes Passages , courts & très-peu nombreux ; comme

s'ils les eussent copié les uns sur les autres.

Or : Je fus très amplement dédommagé , de la petite Fatigue que donne quelquefois la Nomenclature de ce Génie incomparable ; par la multitude des Vuës sublimes & fort judicieuses dont ses Ouvrages philosophiques sont parsemés. Et j'y vis entr'autres avec satisfaction. Que ; comme on ne possédoit point encore , quelque Art de découvrir sûrement la Vérité ; du moins en Physique ; il n'était pas surpris , qu'il y eut tant de sceptiques sur cette matière. A quoi il ajoutait : Qu'au lieu de jeter le manche après la coignée , ces Philosophes auraient dû observer ; que le Mal provenait , de ce qu'on était entré dans de *mauvaises Routes*. Il se proposait donc d'y suppléer : Non (disoit-il modestement) par la force de son génie ; mais , en indiquant quelques nouvelles Règles , pour discerner la Vérité. Et même , il ne dévelop. pait pas assés ces Règles ; pour qu'il fut aisé à des Esprits ordinaires , d'en faire tout de suite quelques Applications.

Son coup-d'œil perçant , lui fit bien concevoir : Qu'on pourrait aller très-loin , dans la recherche des Causes naturelles , même les moins à portée de nos Sens ; pourvû qu'on entrât dans de *nouvelles Routes*. Mais , il avouait modestement ; qu'il ne se faisait presque aucune idée déterminée , de ce que pourraient être ces Routes : Excepté cependant , une sorte d'*In-*

Induction ; plus propre que l'Induction ordinaire ; à avancer dans cette Recherche : savoir , des *Exclusions* ou Rejections ; dont il pressentait vaguement les avantages , sans en déterminer la Marche. J'articule (de préférence) cette Route-là : Parce que j'ai toujours été fort surpris ; qu'aucun des Physiciens qui semblent avoir lu les Ecrits de BACON , ne se soit avisé de cultiver cette Méthode ; que moi Commentant , j'avais déjà essayé d'appliquer à la Physique.

Cet incomparable Philosophe , fut prévoir aussi : Qu'on réussirait beaucoup mieux , à découvrir les Causes naturelles ; en disséquant & subdivisant la Matière , comme avait fait DEMOCRITE ; qu'en partant , comme ARISTOTE , de quelques Qualités considérées abstraitement.

Il attachait aussi un très-grand prix ; à la *Configuration* des Particules , & à leur *Mouvement*. Il disait même ; sur ce dernier Chef : Qu'il n'était point étonné ; que la connaissance des Causes n'eût fait aucun progrès , tant qu'on ne les avait cherchées que dans des Principes tranquilles ; puisque c'était sans doute dans des Principes agités , qu'il aurait fallu les chercher. Mais , il ne pouvait pas insister en détail là-dessus : Vû l'ignorance où l'on étoit alors , des Règles de la communication du Mouvement.

En général : Les Préceptes de BACON , étaient trop relevés , pour être goûtés & suivis

par son siècle. (1) Aussi ; ne fit-il point d'Enthousiastes , ni par conséquent de Secte. La Vérité , consistant ordinairement dans des Milieux tempérés ; que les Esprits communs ne saisissent guère , & que les Esprits ardens goûtent fort peu : Elle étend plus lentement son empire ; que ne font les Opinions extrêmes & tranchées. D'autant plus : Que ceux qui l'annoncent , étant ordinairement des Gens sans intrigue ni passions ; ils ne cabalent & ne machinent point en sa faveur.

Il dut surtout bien déplaire aux Philosophes de son temps ; quand il prononça itérativement : Qu'un Physicien *calomnie la Nature* ; lorsqu'il multiplie les Principes - d'explication , uniquement parce qu'il ne fait pas expliquer tous les Phénomènes par peu de Principes : Et qu'il *calomnie l'Esprit - humain* ; quand il le juge incapable d'aucune autre Ressource , que de celles dont ce Physicien-là a su s'aviser lui-même.

(1) On a remarqué ; que les jeunes-gens , tiraient peu de fruit ; de la lecture des Reflexions de Morale , fondées sur une longue Expérience ; parce qu'ils n'en avaient pas encore éprouvé eux-mêmes , l'importance & la vérité. Il en est de même , des Réflexions d'une Logique un peu profonde , comme sont la plupart de celles du Chancelier BACON : On en sent peu la solidité & le prix ; quand on n'a pas encore beaucoup lu & médité , sur les Recherches dont il nous indique tant les Écueils , que les bonnes Avenües.

Je ne m'étends pas davantage , sur ce qu'il dit des *Moyens* de perfectionner la Physique. Parce que , ce n'est pas là-dessus principalement , qu'on a tronqué ou défiguré ses Pensées : Mais bien plutôt , à l'égard de la prétendue *Inutilité d'une Connaissance des Causes-générales* ; ce que , par cette raison , je vais examiner plus au long.

Et : Comme ce sont surtout les Réflexions favorables à l'*Utilité* de cette Connaissance ; qu'ont supprimé le plus constamment , les Ecrivains qui rapportent d'autres Passages de ce respectable Législateur : J'aurai soin ; de traduire bien littéralement , la plupart de ces Réflexions-là.

Enfin : Pour ne pas disperser l'attention du Lecteur , sur tant de Citations éparées & diverses ; en la faisant sautiller trop souvent , d'une certaine Considération , à une Considération toute différente , pour revenir ensuite à cette première (comme le fait très-souvent notre Auteur) : Je rapprocherai les uns des autres , les Passages qui ont le plus d'analogie entr'eux ; en les groupant ensemble , à part de ceux qui ont moins de ressemblance avec eux.

Mais ; avant que de passer à ces divers Groupes de Passages favorables à ma Thèse : Je vais répondre aux deux Raisons qu'on allègue en faveur de la Thèse contraire.

1°. Donc , on observe : Que **BACON** s'est

beaucoup plus étendu , sur les avantages de l'Expérience , que sur ceux de la recherche des Causes. A quoi je réponds : Que cela , était absolument nécessaire de son temps ; vu qu'alors , on négligeait beaucoup trop les Observations , pour courir après des Subtilités scholastiques.

2°. L'on répète jusqu'à satiété , la Période suivante du *Novum Organum* (laquelle fait partie du 10^{me}. Aphorisme du second Livre) : *Neque fingendum aut excogitandum ; sed inveniendum , quid Natura faciat aut ferat* ; Comme si elle nous interdisait la recherche des Causes. Mais ; je n'y vois qu'une Distinction , sur la manière dont on doit procéder à cette Recherche ; & voici comment je traduirais cette Période : « Il ne faut pas , fabriquer ou imaginer » gratuitement , des Explications ou Causes ; » mais on doit , procéder méthodiquement , à » découvrir les Opérations & Productions de » la Nature. » D'ailleurs : Cette Règle-là , ne doit pas être prise généralement : Puisqu'elle n'est prescrite , que dans l'une des trois *Ministrations* de la 1^{re}. Partie des *Indices sur l'Interprétation de la Nature*.

Au reste : Les Lecteurs fort économes de leur temps , ne doivent pas appréhender ; de ne trouver ici , que des Passages uniquement propres à soutenir la Thèse pour laquelle j'écris tout ceci. Ces mêmes Passages , étant entremêlés aussi ; d'autres excellentes Réflexions ,

qui peuvent avoir échappé à quelques-uns de ces Lecteurs.

ARTICLE I. Inconvéniens qui résultent ; de ce qu'on se livre exclusivement aux Expériences.

§. 1. LA Considération des Antipathies & Sympathies, ainsi que des *Propriétés cachées & particulières* ; est une espece de *Magie* ou de *Grimoire* : Qui endort l'Entendement humain, par le murmure & le jargon de ces Vertus occultes & spécifiques ; en les transmettant respectueusement & mystérieusement aux Lecteurs trop dociles, comme si elles étoient descendues du Ciel. Desorte que ; la Crédulité, se reposant sur ces Traditions oisives ; les hommes ne sont plus excités, à une Recherche vigilante & approfondie, des *Causes* proprement dites.

2. La plupart des Physiciens ; renoncent à une Connoissance universelle des Choses, & à la recherche des *Principes* : Ce qui est extrêmement nuisible à l'avancement des Doctrines. Car, quand on veut découvrir au loin, on doit monter sur des Tours, ou sur des lieux fort élevés : Et il est impossible à qui que ce soit, de sonder les parties éloignées & intimes de quelque science ; s'il s'arrête au Rez-de-chaussée de cette science, au lieu de s'élever au Faîte, comme sur un Observatoire.

3. Tant que l'Astronomie se borne, à l'Enté-
rieur

viens des Choses célestes (comme sont , leur nombre , leur situation , leurs mouvemens , leurs périodes) ; sans y joindre les *visceres* de ces Choses (savoir les Causes physiques) : Elle n'instruit l'Entendement humain ; que comme une Peau empaillée , nous donne la connoissance d'un Animal. Et il nous manque une autre Astronomie , qu'on puisse appeler *organisée & vivante*.

4. Pour étendre le Pouvoir & les Opérations de l'homme ; il ne suffit pas (ou il n'importe pas beaucoup) de connoître *de quoi* les Choses sont composées ; si l'on ignore *les Moyens & les Voyes* des Changemens qu'elles subissent. C'est cependant sur ces *Principes morts* ; que travaillent le plus souvent les spéculatifs : Comme s'ils ne se propoisoient , que de contempler le *cadavre* de la Nature , sans rechercher les Facultés qui constituent sa *Vie*. Desorte qu'on ne s'occupe des *Principes moteurs* , que presque en passant & fort négligemment ; quoiqu'ils soient la Chose la plus considérable & la plus utile de toutes.

5. Quand un Physicien , n'aura recherché d'entre les *Causes* ; que celles des Phénomènes tels qu'ils se présentent au Vulgaire (c'est-à-dire , composés de plusieurs) ; sans les avoir réduits , à une véritable décomposition ou *simplicité* , comme par Distillation.

Il pourra bien (s'il est conséquent d'ailleurs) ;
Sciences & Arts. Vol. 9. N°. 1. an VI. (1798. v. st.) C

ajouter quelque chose de passable, & même d'ingénieux, aux découvertes d'autrui. Mais : Il n'ouvrira aucune Route majeure, & comme séculaire ; & il ne méritera pas le titre *d'Inter-prête de la Nature*.

6. En philosophant uniquement d'après *l'Expérience* ; on tombe encore plus aisément dans des Opinions irrégulières & contraires au cours de la Nature ; qu'en philosophant uniquement *a priori* & spéculativement. NB. Voici quelques-uns des Abus auxquels on s'expose, dans la première de ces Routes.

L'Instruction que nous fournissent nos sens, étant souvent en défaut & même trompeuse ; l'Observation sur laquelle on se fonde, pouvant avoir été faite avec peu de soin ou de régularité, & comme au hasard ; les Témoignages, étant ordinairement légers & mal rapportés, les Pratiques, dirigées vers le leure, & asservies à la Routine ; la Marche des Expériences, aveugle, déraisonnable, vague & irrégulière ; enfin, l'Histoire-naturelle étant superficielle & incomplète : Ces Moyens-là, n'ont pu fournir à l'Entendement, que des Matériaux très-défectueux, pour l'avancement de la Philosophie & des sciences.

7. On se tromperoit du tout au tout sur mon Intention ; quand je recommande aux Physiciens, de rassembler des Expériences concernant les Arts : Si l'on se figuroit ; qu'il s'agit *seulement*,

d'en venir à les mieux perfectionner.

Car : Quoique , dans plusieurs cas ; je ne méprise pas complètement ce *Perfectionnement des Arts* : Cependant , mon But est entièrement , que les Ruisseaux de toutes les *Expériences* mécaniques , se rendent enfin de toutes parts , dans l'Océan de la *Philosophie*.

Je le repète donc : Ce n'est pas pour les *Faits* eux-mêmes , que je propose d'en faire des Collections , Et il ne convient point ; d'en mesurer l'Importance , d'après eux ; mais , d'après leurs Conséquences , & leur influence sur la *Philosophie*.

& En général. Les hommes ne pourront tirer parti de toutes leurs Forces : Que , quand ils ne se livreront pas tous à-la-fois , à un seul & même genre de Recherches : Mais que les uns , en embrasseront d'une certaine sorte ; & les autres d'une espèce différente (suivant la diversité de leurs goûts & de leurs talens).

ARTICLE II. Préférence que méritent , les Expériences utiles à la Philosophie , sur celles qui sont utiles aux Arts.

§. 1. IL faut toujours avoir présent à l'esprit , ce que j'inculque perpétuellement : Qu'on doit rechercher les *Expériences* propres à nous éclairer : avec encore plus de soin , que celles dont on peut retirer quelque autre Avantage.

2. La première Conséquence qu'il faut tirer ; d'une Expérience quelconque ; c'est la *Connoissance des Causes*, ou des Propositions générales. Et l'on doit s'attacher aux Expériences *lucifères*, plutôt qu'à celles qui sont *fructifères*.

3. Le bon Ordre des Expériences, consiste ; d'abord, à *allumer le flambeau* qui doit éclairer la Route ; ensuite, à la parcourir. En commençant, par quelque Expérience régulière, réfléchie, & exempte de tâtonnemens ; en en déduisant ensuite, des Propositions générales ou Principes ; & en passant delà, aux nouvelles Expériences que suggéreront ces Propositions.

4. On pourra concevoir une Espérance bien fondée, sur l'avancement ultérieur des Sciences : Quand on introduira & qu'on accumulera dans l'Histoire-naturelle, beaucoup de ces Expériences ; qui n'ont *aucune Utilité* par elles-mêmes ; mais qui servent seulement, à trouver des Propositions théoretiques & des *Causes* : Expériences, que j'ai accoutumé d'appeler *lucifères*, pour les distinguer des *fructifères*.

Or ; ces *Expériences lucifères*, possèdent une merveilleuse Prérogative : savoir ; de ne jamais tromper ou frustrer notre attente. Car : Comme on les employe ; non, pour produire quelque *Effet* ; mais, pour contribuer à constater la réalité de quelque Cause soupçonnée : Quel que soit leur Résultat ; elles répondent toujours également à notre But ; puisqu'elles décident la

Question affirmativement ou négativement.

5. Il y aura beaucoup de Choses, dans l'*Histoire-naturelle* telle que je la propose ; qui paroîtront subtiles , & plus curieuses qu'utiles ; non-seulement aux Esprits vulgaires , mais même à un Entendement quelconque accoutumé à l'état présent de la Physique. C'est pourquoi ; je dis & répète : Que je requiers qu'on débute , par des Expériences *lucifères* & non *fructifères*..... La connoissance des Principes simples , bien examinée & déterminée ; est comme une *Lumière* ; qui éclaire toutes les Opérations , & qui a la force , d'embrasser (ou de mener à sa suite) des multitudes Pratiques , ainsi que d'être la source de Propositions éminentes : sans (cependant) que cette Connoissance , considérée en elle-même , soit d'une grande Utilité.

6. L'*Histoire-naturelle* que je propose ; n'est point celle , qui amuserait par la Variété des objets , ou qui apporterait quelque Profit immédiat par des Expériences avantageuses : Mais plutôt celle , qui puisse éclairer la *Recherche des Causes* , & allaiter l'enfance de la Philosophie. Car : Quoique je prêche principalement , la Pratique & la partie active des Sciences : Cependant ; je crois qu'on doit attendre la saison la plus propre à la Récolte , & ne point moissonner le bled en herbe. Car je fais parfaitement : Que les Propositions solidement établies , mènent à des légions de Pratiques ; non éparfes ,

mais groupées. Au lieu que , je blâme & déconseille entièrement (comme la pomme d'or qui retarda la course d'ATALANTE) ; ce Desir prématuré & puéril , de capter promptement quelques Gages de nouvelles manipulations.

7. Si quelqu'un ; qui n'aurait fait aucune Découverte particulière , matériellement utile ; avait *allumé un flambeau* , propre à éclairer les bords des Choses qui touchent à celles qu'on connoissoit déjà : Et qu'ensuite ; ce Flambeau ayant été exhaussé ; il vienne à faire voir & à dévoiler les Choses les plus abstruses ; Un tel Penseur ; me paroît étendre l'empire de l'homme sur l'Univers , ainsi que le délivrer de ses fers & entraves.

8. Le *But le plus élevé* de l'Histoire-naturelle ; est : De fournir les moyens & matériaux , d'une Induction solide & concluante ; & de tirer , des objets qui tombent sous nos sens , autant de Connoissances qu'il en faut pour *instruire notre Entendement*.

Car , quant à l'autre But de cette Etude ; qui se borne , à nous amuser par des Descriptions , ou à nous procurer quelque Avantage matériel ; Il est certainement ; d'un Ordre inférieur & d'un genre subalterne ; en comparaison de celui qui est propre à préparer notre esprit pour établir la *Philosophie*.

L'Histoire-naturelle que je recommande principalement ici ; est donc celle : Qui sert de

Base solide & durable , à une *Philosophie* réelle & active ; & qui fournit à l'étude de la Nature , la première étincelle d'une lumière pure & exempte d'illusions.

9. Ce qui a perdu la Physique expérimentale : C'est que les hommes ont recherché principalement les *Expériences fructifères* , & même plus promptement que les *lucifères* : Et qu'ils se sont entièrement attachés , à produire quelque Ouvrage éclatant ; plutôt qu'à manifester les *Oracles de la Nature* ; ce qui cependant , ferait l'Ouvrage des Ouvrages , & renfermerait toutes les Puissances humaines. Leur Méprise & Erreur à cet égard , provient de ce qu'ils se sont figuré , que l'office de la physique consistoit à plier & réduire les *Faits* qui arrivent rarement , à ceux qui nous sont familiers. Au lieu que cet Office , consiste plutôt ; à déterrer , les *Causes* de ces choses familières même , & les *Causes reculées de ces Causes*.

ARTICLE III. Avantages généraux , de la connaissance des Causes.

§. I. DE même que , l'Abeille ne se borne pas , à puiser dans les fleurs , la Matière de sa cire & de son miel ; mais , qu'elle la digère & la transforme encore , par une Faculté qui lui appartient. Ainsi : Le travail de la véritable Philosophie , consiste ; à déposer les Matériaux

de l'Histoire-naturelle & de l'Expérience; non dans la *Mémoire* seulement, & tels qu'ils se présentent; mais, dans l'*Entendement*, après les avoir transformés & façonnés. Desorte qu'on peut augurer les plus heureux succès; d'une Alliance plus étroite & plus sage, que formeront nos successeurs, entre ces deux genres de travaux.

2. Celui qui connaît bien, les *Qualités universelles* de la Matière, & parlà, dequoi elle est capable: Ne pourra pas ignorer non plus, le Passé ni le Présent ni l'Avenir; au moins, quant aux Résultats généraux.

3. La connoissances des *Causes physiques*; répand du jour sur les Objets analogues, & donne prise à de nouvelles Inventions.

4. Celui qui connaît les *Formes* (c'est-à-dire, les *Qualités fondamentales*); en déduit, & découvre (ce qu'on n'a point fait jusqu'à présent) des Choses que, les vicissitudes de la Nature, ni les Expériences les plus industrieuses, n'auroient jamais mis au jour; & qui ne seraient jamais entrées dans la Pensée des autres hommes.

5. C'est avec raison, qu'on dit: Que, pour savoir véritablement les Choses, il faut en connaître les Causes. Car il n'est pas vraisemblable: Qu'on puisse savoir véritablement une chose, avant que l'Esprit soit entièrement affermi dans l'explication de ses Causes.

6. Ce qui fait manquer les Opérations; c'est

Sur tout l'ignorance des Causes. Car, ceux qui connaissent bien les Causes; seront aussi de bons juges, des Effets & des Opérations.

7. Celui qui connaît les *Formes* (c'est-à-dire, les différentes Qualités des différentes substances); est en état de classer ensemble, par quelque Conformité naturelle, les Matières même les plus dissemblables en apparence.

Ainsi: Il peut découvrir & produire, des Choses qui n'avoient point encore été faites; & qui n'auroient jamais été réduites en acte, soit par les vicissitudes de la Nature, soit par des Expériences ingénieuses, soit même par le hazard; enfin, qui ne seraient jamais entrées dans la Pensée de l'homme.

*ARTICLE IV. Considérations plus particulières;
sur la Recherche des Causes.*

§. I. Je propose une Entreprise, beaucoup plus grande que *l'Astronomie vulgaire*. Car; je ne pense pas seulement, aux Calculs & aux Prédications, qui composent ordinairement cette science; mais, à la *Philosophie*. Savoir celle; qui puisse instruire l'Entendement humain (par des Causes naturelles & des Raisons solides), de tout ce qui concerne les Corps célestes: Non-seulement, de leur Mouvement & de leurs Périodes; mais aussi, de leur substance & de toutes leurs Qualités.

2. Il n'y a presque personne, qui ait fait des Recherches sur les Causes physiques; par exemple, sur la substance des Choses célestes, soit des Etoiles, soit de ce qui occupe leurs Intervalles. C'est pourquoi j'affirme; que la *Partie physique de l'Astronomie*, est une chose encore à faire.

3. La recherche de la première *Constitution des Atomes*, est si importante: Que je doute; si son *Utilité*, n'est pas absolument la plus grande de toutes. Vû qu'elle est; la Règle Suprême de l'action & de la force, la véritable Déterminatrice de nos espérances, & la Directrice de nos opérations.

4. Si la doctrine de DEMOCRITE sur les *Atomes*, n'est pas vraie: On peut du moins s'en servir, pour faire comprendre certaines Vérités. Et l'on ne doit point s'en effrayer ni s'en défier, à cause de la *Subtilité* qu'elle suppose dans la Nature. Car on doit comprendre que les choses les plus petites sont soumises au calcul comme les plus grandes. Et personne ne doit se figurer; que cette Doctrine, soit une *Spéculation plus curieuse qu'utile*. Car on peut remarquer: Que presque tous les Philosophes (qui se sont fort occupés d'Expérience & d'Objets particuliers, & ont comme dissequé la Nature jusqu'au vif); tombent enfin tout naturellement, dans de semblables Recherches; quoiqu'ils n'en viennent pas heureusement à bout.

5. Quant à l'*Utilité* de cette Recherche sur la

première Constitution des Atomes : Je ne fais, si elle n'est pas de la plus haute importance; puisqu'elle doit servir de Règle, pour juger en dernier ressort, de toute activité & force des Corps.

6. Il faut bien, décomposer les Corps : Pourvu que ce ne soit pas à l'aide du Feu; mais, par la *Raison*, & par une Induction proprement dite, avec les Expériences auxiliaires. Il faut aussi, comparer les Corps entr'eux, les réduire à de simples Elémens; enfin, démêler les Qualités qui s'y rencontrent & s'y combinent. Il faut, en un mot, quitter VULCAIN pour MINERVE; si l'on veut répandre la Lumière, sur les *Tissus & Configurations* intimes des Corps : Choses; d'où dépend toute Propriété & Vertu, & d'où l'on déduit toute Règle des Altérations & Transformations considérables.

7. Les hommes ont accoutumé; de borner leurs recherches sur les Causes, à ceci : De rapporter les Phénomènes rares, à ceux qui sont fréquens; en donnant ceux-ci, pour Causes de ceux-là : Mais; de ne point rechercher les Causes, de ce qui arrive souvent; le regardant, comme suffisamment admis. Ainsi : Ils ne recherchent pas les Causes, de la Pesanteur, ni des autres Phénomènes journaliers : Mais; en partant de ces Faits, comme manifestes & reçus; ils discutent les autres Choses, moins familières; & ils prononcent, qu'elles sont des Conséquences de ces Faits.

Au lieu que je suis sûr : Qu'on ne peut porter aucun jugement , sur les Choses rares ou remarquables (& , bien moins encore , en mettre au jour de nouvelles) ; avant que d'avoir examiné & trouvé , les *Causes des Choses ordinaires* , & même les *Causes de leurs Causes*.....

Rien n'a autant nui à la Philosophie ; que la Négligence des hommes , à l'égard des Choses familières & fréquentes : Car ; ils n'y arrêtent point leur regard ni leur attention ; mais , ils les admettent en passant , & sans en chercher les Causes.

Renvoi de ces 31 Paragraphes , aux endroits de l'Original dont ils font la Traduction.

ART. I. §. 1. Est traduit , du Traité *De Argumentis Scientiarum* , Livre III. Chap. V.

2. du même Traité , Livre I. qui n'est pas divisé en Chapitre.

3. Livre III. Chap. IV, dans le premier quart.

NB. J'ai supprimé une ancienne Fable , que l'Auteur paraît avoir mal rapportée.

4. Traduit des *Cogitationes de Naturarum* , &c. , Pensée III.

5. des *Impetus philosophici* , Ch. I, paragraphe VIII.

NB. Voyés sur le même sujet , deux Passages du paragraphe X.

6. Traduit , du *Novum Organum* , Aph. LXIV ; & de la Distribution de l'*Inf-tauratio magna*.

ART. I. 6. 7. Traduit de la *Parasceve ad Hist nat. & Experimentalem*, Aphorismes V & VI.

8. du *Novum Organum*, Aphorisme CXIII, à la fin.

ART. II. 6. 1. Traduit du Liv. V. *De Augmentis Scientiarum*, Chap. II.

2. Traduit du *Novum Organum*, Livre I, Aphorisme LXX.

3. Aphorisme LXXXII.

4. Aphorisme XCIX.

5. Aphorisme CXXI.

6. Traduit de la Distribution de l'*Instauratio magna*.

7. Traduit du Préambule du Traité *De Interpretatione Naturæ*.

8. Traduit de la *Descriptio Globi intellectualis*, Chapitre III.

9. Traduit de la Préface de l'*Historia Universi*.

ART. III. 6. 1. Traduit des *Cogitata & visa*.

2. Traduit de la *Descriptio Globi intellectualis*, Chap. V.

3. Traduit du Livre III, *De Augmentis Scientiarum*, Chap. IV, vers la fin.

4. Traduit des *Aphor. & Consilia de Auxiliis Mentis*.

5. Traduit du *Novum Organum*, Livre II, Aph. II, & de la *Scala Intellectus*.

6. Traduit, de la Distribution de l'*Instauratio magna*; & de la Préface des *Phænomena Universi*.

7. Traduit du *Novum Organum*, Livre II, Aphorisme III.

ART. IV. §. 1. Traduit de la *Descriptio Globi intellectualis*, Chap. V.

2. Traduit du Traité *De Augmentis Scientiarum*, Livre III. Chap. IV.

3. Traduit de la première des dix Pensées, qui font partie des *Impetus philosophici*.

5. Traduit de la seconde des mêmes Pensées.

NB. Sur le même sujet que ces deux derniers paragraphes; voyés aussi, le Livre II. du *Novum Organum*, Aphorismes VII & XXV.

6. Traduit du *Novum Organum*, Liv. II, Aphorisme VII, au milieu.

7. Traduit du *Novum Organum*, Liv. I, Aphorisme CXIX.

HISTOIRE NATURELLE.

ELEMENTS OF MINERALOGY, &c. Elémens de minéralogie, par RICHARD KIRWAN Esq. Membre des Acad. de Sockholm, d'Upsal, de Berlin, de Manchester, de Philadelphie, &c. seconde édition : corrigée & augmentée. Vol. II. Elmsly. (*Second Extrait.*)

L'AUTEUR commence la quatrième partie de son ouvrage, dans laquelle il s'occupe exclusivement des substances métalliques, en donnant un résumé des propriétés qui distinguent cette classe de substance, dont l'homme civilisé à se tirer tant d'avantages. Voici cette introduction :

« Les substances métalliques, chacune dans son état parfait, & sans alliage réciproque, présentent les caractères suivans : »

« Leur couleur est ou un orangé rougeâtre plus ou moins clair; ou rouge jaunâtre; ou jaune rougeâtre; ou blanc pur; ou blanc rougeâtre; ou blanc bleuâtre plus ou moins clair; ou gris blanchâtre; ou enfin, gris bleuâtre. »

« Lustre, 4, 3, 2. Transparence 6.

« Fracture, grenue, ou grenue en feuillets; ou striée.

« Fragmens, 4, 3.

» *Dureté* de 5, à 12.

» *Pesanteur spécifique*, de 6 à 23.

» Tous les métaux sont solubles ou dans l'acide nitreux, ou dans l'eau régale, & on peut les en précipiter par les alkalis, ou caustiques, ou aérés (1) ou bien (sauf le Platine) par l'alkali prussien (prussiate de potasse). Tous sont fusibles, à un degré de chaleur propre à chacun, & lorsqu'ils sont en fusion, ils prennent une surface convexe, ou, s'ils sont en petite quantité, globulaire. Lorsqu'ils sont calcinés, s'ils ne sont pas trop volatils, ils donnent au Borax ou au sel microcosmique une couleur particulière après la fusion, ou bien ils les rendent opaques. »

» Lorsqu'ils sont parfaitement fondus, ils sont, pour la plupart, miscibles ou combinables les uns avec les autres, mais (à l'exception du fer) ils refusent de s'allier avec leurs propres chaux (oxides) ou avec les autres substances non-métalliques, à l'exception du soufre, du phosphore, & du charbon; & des acides sulfurique & phosphorique qui s'unissent à la plupart d'entr'eux. »

» On connoît actuellement dix-sept substances susceptibles de prendre l'apparence métallique : L'or, le platine, l'argent; le cuivre, le fer, le plomb, l'étain, le mercure, l'antimoine, le régule d'arsenic,

(1) Les précipités sont souvent redissous. (A)

d'arsenic, le bismuth, le cobalt, le nickel, le régule de manganèse, l'uranite, le Sylvanite & le Titanite. Il y en a trois autres dont la faculté de passer à l'état métallique est jusqu'à un certain point, douteuse. Ce sont le Molybden, le Wolfranc (1), & le Ménachanite. »

» Parmi ces substances, les trois premières, & le mercure, sont ordinairement appelées métaux nobles & parfaits, parce que lorsqu'ils ont été calcinés, ils repassent à l'état de régule, c'est-à-dire qu'ils recouvrent toutes les propriétés métalliques par le seul effet de la chaleur, & sans l'addition d'aucun combustible. Tandis que le cuivre, le fer, le plomb & l'étain ne peuvent se réduire bien sans cet intermédiaire. On appelle ceux-ci, par cette raison, métaux imparfaits. Mais tous ceux que nous venons de nommer, en y comprenant même le mercure, ont pour propriété commune d'être malléables à un très-haut degré, & sont, par cette raison, appelés métaux entiers ou complets ; tandis que le zinc, le régule d'antimoine, &c. sont ou très-peu malléables ou ne supportent point le marteau sans se briser. On les nomme à

(1) Nous nous étonnons que l'auteur en plaçant ici le Wolfranc, & en ne nommant point le Tungstène fasse abstraction des travaux de Scheele & des frères d'Elmhuyar, qui paroissent avoir bien prouvé que le Tungstène est un véritable métal, & que le Wolfranc est cette même substance unie au fer. (R).

cause de cela, *demi-métaux*. Quelques minéralogistes rejettent cette distinction, parce qu'on observe une diminution progressive & aucune transition bien décidée dans cette propriété : mais si cette objection étoit fondée, on devroit aussi rejeter la distinction des sels & des pierres, & même celle des plantes & des animaux par la difficulté d'établir des limites bien précises. Le sens commun repousse ces scrupules. Il y a même une différence marquée entre les métaux nobles & les métaux imparfaits & les demi-métaux, c'est que le mercure, allié à ceux-ci, les volatilise avec lui dans la distillation, tandis qu'il n'emporte point les premiers. On soupçonnoit il y a quelques années & d'après des apparences assez plausibles que certaines terres simples, étoient aussi susceptibles de *réduction* ou métallisation ; mais l'illusion fut découverte & dissipée par *Savarese*, *Klaproth*, *Westrumb* & *Thiauski*. »

» On appelle métaux *natifs* ceux que la nature présente à l'état de régule ; c'est-à-dire sous forme métallique ; lors même qu'ils sont alliés entr'eux. Mais ceux qu'on trouve (& c'est leur apparence ordinaire dans les mines,) combinés avec quelque substance non-métallique, sont dits *minéralisés* par cette substance, on la désigne elle-même par l'épithète de *minéralisateur* & l'ensemble porte le nom de *mine* ; expression qui désigne aussi les terres ou pierres qui renfer-

ÉLÉMENTS DE MINÉRALOGIE. §1.

ment des matières métalliques en quantité notable ; minéralisées ou non. »

Lorsque le minéralisateur est de nature saline , & rend le métal soluble dans moins de 20 fois son poids d'eau ; on place d'ordinaire le composé parmi les *sels* : c'est le cas des vitriols de fer , de cuivre & de zinc. Mais lorsqu'on les considère surtout sous le rapport de leur base métallique , comme par exemple, les vitriols de cobalt & de nickel , on les range parmi les *mines*. Le plus commun des minéralisateurs est l'air pur (oxygène) dans son état concret , & l'air fixe (acide carbonique) s'y trouve souvent réuni. Le soufre , & l'arsenic à l'état de chaux , tiennent ensuite les premiers rangs ; & les acides vitriolique , marin , phosphorique , arsenical , & molybdique , se rencontrent moins communément. Le soufre & l'arsenic laissent , pour l'ordinaire , le brillant métallique aux métaux qu'ils minéralisent ; mais les autres minéralisateurs leur donnent , tout au plus une apparence saline , sans laquelle il seroit bien difficile de les reconnoître.

• Dans quelques cas le soufre s'unit aux substances métalliques non calcinées ; dans d'autres il se combine avec leurs chaux (oxides) ainsi que je l'ai déjà indiqué en traitant des pyrites. Cette distinction a son utilité lorsqu'il est question de choisir entre les diverses manières d'opérer , & d'estimer la richesse d'une

52 HISTOIRE NATURELLE.

mine donnée, avant de l'analyser. Quelques minéralogistes du premier mérite étoient disposés à ne point admettre l'arsenic parmi les minéralisateurs, à raison de ce qu'il est lui-même un métal, mais comme il est maintenant certain qu'il est minéralisateur lorsqu'il se rencontre à l'état d'acide, je ne vois pas pourquoi la chaux, qui est certainement demi-acidifiée, ne joueroit pas le même rôle. »

» Lorsqu'on observe la pesanteur spécifique d'une mine, il faut la séparer soigneusement de toutes les molécules de terre ou de pierres qui peuvent lui être étrangères. »

» En donnant les résultats de l'analyse des mines, je n'ai pas désigné la quantité de métal parfait à laquelle correspondoit une quantité donnée de chaux ou de sel métallique, parce que ces rapports se trouvent réunis dans les Tables qui sont à la fin de ce volume. »

Après ces généralités l'auteur entre en matière. Quelques nomenclateurs en traitant des métaux, les ont rangés selon l'ordre dans lequel ils paroissent acquérir successivement des propriétés métalliques de plus en plus parfaites ; on peut y arriver ainsi comme insensiblement en passant de la plombagine au molybdène, de celui-ci au Tungstène ou à l'arsenic. D'autres ont suivi un ordre inverse, & commencent par les plus parfaits. C'est la méthode qu'a adoptée Mr. Kirwan, & en conséquence il commence par l'or.

Nous ferions un volume si nous prétendions suivre notre savant auteur dans les détails qu'il donne sur chaque métal. Il en décrit d'abord les propriétés physiques & chimiques dans l'état de régule. Il le considère ensuite sous l'état de mine & classe avec beaucoup d'ordre ces composés très-variés ; en introduisant toutes les subdivisions nécessaires ; savoir, en espèces, tribus, familles & variétés. Chaque métal fait le sujet d'un chapitre. Ensuite, dans son chapitre 24^e. intitulé : *De l'analyse & de l'essai des mines métalliques*, & qui remplit seul un quart du volume. Il indique, avec les détails suffisans, tous les procédés de métallurgie pratiqués par les meilleurs auteurs pour le traitement des mines. Il cite toujours ses autorités, & son érudition paroît être aussi vaste que son jugement est sain. C'est surtout des écrivains Allemands & Suédois qu'il emprunte les lumières quand sa propre expérience ne les lui a pas fournies. Nous allons prendre çà & là quelques morceaux pour faire connoître sa manière.

CHAPITRE II. *Platine.*

« Ce métal, dans son état le plus parfait ;
a les propriétés suivantes :

» Sa couleur est blanche, d'une teinte intermédiaire entre l'étain & l'argent. »

» Son lustre 4. Sa dureté 7,5. Sa pesanteur

54 HISTOIRE NATURELLE.

spécifique, de 20,6 à 23. Celle d'un coin dont l'amiral Gravina m'a fait présent est de 20,663 & celle d'une barre que le Roi d'Espagne envoya au Roi de Pologne, de 20,722. Les variations dépendent du plus ou moins de refoulement que lui a procuré l'action du marteau & de la quantité de flux qu'il peut avoir retenu à la fonte. »

» Il est malléable, ductile, & laminable comme l'or; il n'est point affecté par l'action de l'air; il n'est soluble que dans l'eau régale ou dans l'acide oxy-muriatique, qui prend lorsqu'il en est saturé, une couleur d'un rouge foncé; on l'en précipite par le Tartarin (la potasse) & plus difficilement par la soude (1). Il n'est pas visiblement affecté par l'alkali Prussien pur, (2) & point du tout par une solution étendue, de vitriol de fer; ces propriétés le distinguent de l'or. Il s'amalgame avec le mercure. »

» Il est à-peu-près infusible dans le feu de nos fourneaux; mais il cède à l'action des fortes lentilles & à celle du chalumeau avec un jet d'air pur. »

» Le Platine cru ou commun nous vient du Pérou, en grains; d'une couleur de fer grisâtre.

(1) Nous avons observé que le précipité de platine employé comme couleur dans la peinture à l'émail fournit des teintes gris de fer plus ou moins foncé qui ressemblent à l'encre de la Chine. (R)

(2) Mr. Berthollet a trouvé que lorsqu'il est dis-

de figure irrégulière & plus ou moins aplatis, mêlés de sables ferrugineux & quartzeux en différentes proportions. Sa pesanteur spécifique dans cet état, est de 6 à 11. Il renferme souvent des particules d'or ou de mercure. Lorsqu'il est purgé des particules pierreuses étrangères, sa pesanteur spécifique est de 12 à 16 (1). Le platine en cet état, est encore intimement combiné avec le fer & agit sur l'aiman; il est extensible jusques à un certain point sous le marteau & contient entre un tiers & un quart de son poids de fer. Cependant cet alliage n'est soluble que dans l'eau régale ou dans l'acide oxy-muriatique. »

« On le sépare du fer en le dissolvant dans environ huit fois son poids d'eau régale, en aidant la dissolution sur la fin par la chaleur. On précipite le fer par l'alkali Prussien, ou, encore mieux, par une solution concentrée de sel ammoniac qui ne précipite que le platine. Ce précipité séché & chauffé au plus haut degré pendant deux heures au feu de forge, donne une masse agglutinée qui supporte le marteau. »

» L'esprit de sel lui enlève aussi beaucoup de son fer. L'acide phosphorique dans l'état glacé le rend aussi fusible dans un creuset garni

ous il s'acidifie dans un degré très marqué, ce qui explique plusieurs phénomènes singuliers qu'offre ce métal. (A)

(1) Nous l'avons trouvé de 15,725. (R)

56 HISTOIRE NATURELLE.

de charbon, ainsi que l'a découvert M. Pelletier, »

» Mais la meilleure méthode pour traiter ce métal est celle de Mr. Jeannetty. Je vais la décrire parce qu'elle n'est pas encore bien connue. »

» 1°. Il triture d'abord le platine ordinaire avec de l'eau pure pour le séparer du fer & des autres matieres qui s'y trouvent mêlées. »

» 2°. Il en mêle ensuite 1,5 livre avec 3 d'arsenic blanc, & une de potasse purifiée; il prépare un creuset capable de contenir vingt livres de cette matiere. »

» 3°. Quand le creuset & le fourneau sont bien chauds, il y met d'abord un premier tiers du mélange, puis donne chaud; il en jette un second & donne encore un bon coup de feu, puis il projette la dernière dose. »

» 4°. Quand le tout est bien fondu, il enlève le creuset; il le laisse refroidir; casse le régule, qui attire alors l'aiman; il le fond une seconde fois, puis une troisième, s'il est encore magnétique; il le laisse enfin refroidir & casse le régule. »

» 5°. Il prépare alors des creusets capables de contenir des régules de trois pouces & demi de diamètre; il met dans chacun une livre & demi du régule en morceaux avec poids égal d'arsenic; & demi livre de potasse; il fond le tout & le laisse refroidir dans une position horizontale, afin que le régule soit partout d'épaisseur égale. »

» 6°. Il met ces régules sous une moufle ; il les chauffe jusqu'à ce qu'ils commencent à s'évaporer : il ferme le fourneau pour modérer la chaleur , qui pourroit volatiliser le tout , & il les tient dans cet état pendant six heures. »

» 7°. Il les chauffe dans l'huile commune au degré où l'huile s'évapore à siccité : il continue cette opération pendant toute la durée de l'évaporation de l'arsenic. »

» 8°. Finalement il les met dans l'acide nitreux (probablement pour détruire les derniers restes de l'arsenic) & pour libérer ensuite les régules de cet acide il les fait bouillir dans l'eau : il les chauffe au rouge dans un creuset pour prévenir toute absorption de matière étrangère , vu qu'ils sont encore très - spongieux. Enfin , il les fait chauffer à feu nud & les forge en barreaux. »

» Le platine n'a point de mines connues ; mais on le trouve dans l'état métallique parmi les mines d'or d'alluvion , mêlée au sable , dans les paroisses de Novita & de Citaria , au nord de Choco dans le Pérou. On le sépare de l'or , partie par le lavage & partie par l'amalgame. »

» Il y a dans le cabinet de l'Académie de Bergara , un morceau de platine qui est de la grosseur d'un œuf de pigeon. »

» Mr. Tillet a trouvé que le platine combiné avec une certaine portion d'argent , est soluble dans l'acide nitreux. »

38. HISTOIRE NATURELLE

„ Mr. Richter nous assure qu'on peut le débarrasser complètement du fer, en ajoutant du Tartarin (potasse) à la solution, jusqu'à-ce que le précipité paroisse : on ajoute ensuite du tartre vitriolé (sulfate de potasse,) jusqu'à-ce que le tout soit précipité; on lave ensuite jusqu'à-ce que le vitriol de fer, beaucoup plus soluble que ne l'est celui de platine, soit dissout par le lavage, & on le reconnoît par l'alkali prussique. On fait sécher le reste du précipité, & on le mêle avec une fois & demi son poids de soude desséchée : on le place ensuite dans un creuset, qu'il ne remplisse pas tout-à-fait; ensuite on le couvre & on le chauffe par degrés jusqu'à-ce qu'il soit fondu. On trouve alors, assure-t-il, un régule couleur d'argent. »

On voit, d'après cette description que le platine possède dans un degré éminent toutes les propriétés qui caractérisent une substance métallique; qu'il est en quelque sorte *le plus métal des métaux* : passons à l'autre extrémité de l'échelle & décrivons avec l'auteur le Titanite.

„ C'est l'infatigable Klaproth qui a découvert que cette substance étoit de nature métallique. On l'avoit nommé *schorl rouge*; & je l'avois désigné sous ce nom dans mon premier volume. Il me semble être une substance intermédiaire entre un demi métal & une terre; mais des expériences ultérieures, & en particulier, sa faculté de s'allier avec d'autres substances métalliques décideront la question. »

» On le trouve , d'après le baron de Born , à Rhonitsz ; selon d'autres à Boinick en Hongrie » (1).

» Sa couleur est d'un rouge brunâtre. »

» On le trouve cristallisé en prismes rectangulaires à quatre faces, rayés ou sillonnés longitudinalement, longs d'environ $\frac{1}{2}$ pouce, ou moins ; souvent en aiguilles & placés sur du mica schisteux alternant avec le quartz (2). »

» Lustre 3. Transparence 0 excepté en très-petits fragmens : alors , 1.

» Sa fracture en travers est feuilletée : la fracture longitudinale tient le milieu entre la feuilletée & la raboteuse ; dans quelques endroits elle approche de la forme conchoïde. »

» Fragmens 3. sa poudre est couleur de brique ; ou rouge orange. »

» Dureté 9 ; fragile ; pesanteur spécifique 4,18.

» Exposé à une chaleur de porcelaine dans un creuset d'argile il ne change point. Seulement sa couleur brunit un peu. Mais dans un creuset de charbon il s'est rompu en fragment anguleux, a perdu son lustre & sa couleur, & a passé au brun pâle. «

» Au chalumeau, il résiste au sel microcos.

(1) Nous en avons de beaux échantillons venant du St. Gothard. (R)

(2) Il affecte volontiers l'apparence d'un tissu formant des mailles rhomboidales. (R)

mique, mais il cède au borax & à la soude; & donne avec le premier un verre, couleur d'hyacinthe, & avec le second, un verre rouge blanchâtre. »

Aucun des acides minéraux, ni l'eau régale, ne l'attaquent, même aidés de la chaleur :

» 200 grains de cette substance, fondus dans un creuset de porcelaine avec 5 fois son poids de Tartarin doux (carbonate de potasse) formèrent après le refroidissement une masse grislâtre, assez blanche, dont la surface étoit cristallisée en aiguilles & la structure fibreuse. Dissoute dans l'eau bouillante, elle ne tarda pas à précipiter une substance blanche qui édulcorée & doucement séchée pesoit 328 grains & avoit une apparence terreuse. Je l'appelle en cet état *chaux de Titanite*. La liqueur alcaline étant ensuite saturée d'acide marin déposéit un mélange argillo-siliceux, à la quantité d'environ 8 grains & qui provenoit vraisemblablement du creuset. »

Propriétés de cette chaux. Elle est soluble dans les acides vitriolique, nitreux, & marin; mais par l'évaporation spontanée, elle forme avec tous ces acides une masse plus ou moins gélatineuse, que Klaproth attribue à la terre siliceuse qui s'y trouve mêlée, car la solution nitreuse ainsi évaporée laisse voir quelques cristaux. »

» Ces solutions se précipitent en flocons blancs

légers, par le Tartarin doux ou le sel alkali caustique, ils sont d'un vert brunâtre par l'alkali prussien & d'un rouge brunâtre par la teinture de Galle.

» L'étain change la solution muriatique en rouge bleuâtre & le zinc en bleu indigo. Cette dernière cependant blanchit lorsqu'on la chauffe peu-à-peu, & laisse un précipité blanc redissoluble dans l'acide marin, & avec le zinc il redonne une couleur bleue, comme auparavant. On pourroit présumer de là, que la chaux est plus complètement désoxygénée par l'étain que par le zinc, la couleur bleue étant la transition ou la teinte par laquelle passent plusieurs substances avant que de devenir rouge. Il s'ensuit que le rouge est la couleur de ce métal dans son état métallique & qu'il est à cet état de régule sous l'apparence sous laquelle on lui avoit donné le nom de schorl. »

» 50 grains de cette chaux blanche furent réduits par l'ignition à 38. Elle étoit jaunâtre tant qu'elle étoit chaude, mais, comme la chaux de zinc, elle blanchissoit en se refroidissant. Après l'ignition elle devient insoluble dans les acides, probablement à raison de la cohésion qui unit ses molécules. Echauffée sur le charbon elle devient couleur de rose, & ensuite bleu d'ardoise, & finalement se fond en un verre imparfait, dont la surface est finement striée. Cette chaux se conduit avec les flux comme

62 HISTOIRE NATURELLE.

le fait le Titanite natif. Elle est irréductible par les méthodes ordinaires. »

» Elle me paroît se rapprocher par un grand nombre de ses propriétés de la chaux de ménachanite ; la différence entre ces deux substances peut provenir du fer contenu dans la dernière. »

Nous supprimons les détails sur les mines de Titanite. Ils n'offrent gueres que la répétition de ce qu'on a lu tout-à-l'heure , puis que ce métal s'offre naturellement sous l'état de régule. Au surplus , en donnant à cette substance le nom de métal , on la met dans une classe à laquelle elle ne paroît avoir jusqu'à présent que bien peu de titres.

Le fer occupe 40 pages dans l'ouvrage de Mr. K. c'est , sans contredit , le premier des métaux , sous le rapport de l'utilité ; & c'est aussi celui dont les transformations sous l'état de mine sont les plus variées ; & il est répandu avec une telle profusion à la surface du globe que sa découverte ne pouvoit échapper dès les premiers pas de la civilisation. Nous disons *sa découverte* , car autant il est commun sous le masque de la minéralisation , sous lequel il est , d'ordinaire , absolument méconnoissable , autant il est rare dans l'état natif. On a même soupçonné que les échantillons de ce genre qu'on a trouvés en fort petit nombre , étoient le résultat de quelque réduction artificielle produite par l'action du feu. L'auteur paroît cependant

persuadé que le fer natif d'Eibensteck en Saxe, celui de la montagne du grand Gilbert en Dauphiné, & celui trouvé en gros bloc dans les plaines d'Etumpa au Pérou; sans parler de la grande masse observée par Pallas en Sibérie, que tous les échantillons; disons-nous, sont des produits naturels soit par la voie sèche, soit par la voie humide.

L'auteur classe les mines de fer en douze espèces. La seconde de ces espèces favoir le fer minéralisé par l'air pur, ou oxydé, est la plus nombreuse. Il la subdivise en quatre Tribus dont l'une a jusques à six familles, & une de ces familles renferme jusques à 5 variétés. Ce système fournit trente-huit divisions ou sous-divisions qui nous paroissent heureusement & ingénieusement distribuées pour qu'on puisse se reconnoître parmi ces nombreux composés qui tous ont le fer pour base; & remarquons que ce nombre seroit bien plus grand encore si l'auteur n'en eût exclu les pyrites soit sulfureuses, soit arsenicales. Il a placé les premières parmi les combustibles & les secondes parmi les mines d'arsenic.

Le chapitre 24 qui traite, ainsi que nous le disions tout-à-l'heure, de l'analyse & de l'essai des mines est un abrégé de métallurgie très-complet & très-instructif. Il commence par une table assez étendue dont l'objet est d'aider les commençans à juger par les caractères exté-

rieurs d'une mine , de l'espece de métal qu'on doit en attendre par l'analyse. L'auteur réunit les mines qui se ressemblent le plus sous les deux caracteres *visibles* les plus frappans , savoir , la *couleur* & le *lustre* , abstraction faite du métal auquel elles appartiennent. Chaque couleur forme un chef de division , & renferme , quant au *lustre* , trois subdivisions ou gradations , savoir , le *lustre métallique* , le *lustre ordinaire* & le *lustre nul*. Le commençant trouve dans cette ordonnance particulière ses termes de comparaison rapprochés les uns des autres & peut ainsi se former plus promptement le *coup-d'œil*, qualité si essentielle dans l'étude des minéraux.

Suit un tableau des pesanteurs spécifiques des mines de diverses substances métalliques : les pesanteurs *extrêmes* seulement , sont indiquées pour chaque métal.

• Lorsqu'on a approché jusqu'à un certain point (dit ensuite l'auteur) en observant la couleur & le lustre de la mine , de la détermination du genre du métal auquel elle appartient , on peut circonscrire sa recherche en comparant les caracteres extérieurs de la mine à examiner , avec ceux de l'espece de mine dont elle paroît se rapprocher ; on arrive ensuite encore plus près en examinant les résultats de l'action des acides & du chalumeau , & en les comparant avec ceux connus dans l'échantillon qui sert de comparaison. Si toutes ces apparences s'accordent

à faire rapporter la mine inconnue à l'échantillon connu, alors on procède à l'essai par la voie sèche, ou à l'analyse par la voie humide, ainsi qu'on le verra dans les sections suivantes.

L'auteur traite une à une dans ces sections toutes les variétés de mines, métal par métal, & indique d'une manière détaillée, les procédés suivis par les meilleurs métallurgistes modernes. L'embarras du choix, & le peu de chance que nous aurions d'être utiles en transcrivant le traitement de l'une quelconque de ces mines, nous arrête.

On trouve à la fin du volume, des tables très-étendues qui renferment les proportions des divers ingrédiens qui composent les chaux métalliques. La première colonne désigne l'oxide dont il est question & son précipitant; les quatre suivantes indiquent la proportion du métal, de l'oxygène, de l'eau, & de l'air fixe sur cent parties de chaque oxide. La dernière colonne contient les noms des chimistes qui ont fourni les résultats. La principale différence entre ces tables & celles du même genre qui ont déjà paru consiste, indépendamment de leur plus grande étendue, dans la distinction essentielle introduite par l'auteur, entre la quantité d'oxygène contenu dans les oxides & celle de l'eau qui s'y trouve souvent associée. Ces tableaux sont au nombre de trois. Nous venons de décrire le premier. Le second donne la propor.

66 HISTOIRE NATURELLE, &c.

tion des ingrédiens dans les précipités acido-métalliques provenant des solutions dans l'acide nitreux. Le troisieme indique la proportion du soufre & du métal sur 100 parties de chaque sulfure métallique. En voici le résultat abrégé.

100 parties d'argent peuvent prendre 15 parties de soufre	
. . . . de cuivre	25,4
. . . . de fer	56
. . . . d'étain	18
. . . . de chaux d'étain	40
. . . . de plomb	15
. . . . de mercure	25
. . . . de régule d'antimoine .	29,8
. . . . d'antimoine natif . . .	35
. . . . de bismuth	17,6

Vingt pages de notes explicatives accompagnent ces trois Tableaux.

L'ouvrage entier porte l'empreinte du génie méthodique de son savant auteur, de ses connoissances très-étendues & de son amour pour la vérité. Il est au-dessus de tout préjugé national, & les écrits des savans du Continent paroissent lui être aussi familiers que ceux de ses compatriotes.

PHYSIOLOGIE.

A TRANSLATION OF DR. BELL'S THESIS DE
Physiologia plantarum. Dissertation sur la phy-
 siologie des plantes, publiée en latin à Edim-
 bourg par le Dr. GEORGE BELL, traduite par
 le Dr. JAMES CURRIE, à la réquisition de
 la Société Littéraire & Philosophique de Man-
 chester, & insérée dans le 2d. volume des
 Mémoires de cette Société.

QUOIQUE l'étude des plantes ait été assez
 cultivée dans ce siècle, les Naturalistes se sont
 plus occupés de leurs formes extérieures, de
 leur nomenclature & de leur distribution par
 classes, ordres, genres & espèces que de leur
 structure interne, & du jeu de leurs organes.
 Cette dernière étude est cependant d'une toute
 autre importance que la première, soit pour
 l'agriculture, soit pour la médecine, soit pour
 la plupart des arts qui ont pour objet des sub-
 stances végétales. Elle a les plus grands rap-
 ports avec celle de l'économie animale, à la
 quelle on a donné par excellence le nom de
Physiologie, ou étude de la nature. Il n'est pres-
 que aucun problème important dans l'une de
 ces deux sciences qui n'ait dans l'autre un
 problème analogue, donc la solution jette

nécessairement du jour sur celle du premier.

Aussi de nos jours de grands Philosophes ont-ils fait de la physiologie des plantes l'objet particulier de leurs recherches. Indépendamment d'un grand nombre d'excellens mémoires sur cet important sujet qu'on trouve dans les *Transactions philosophiques*, dans les *mémoires de l'Académie des Sciences*, & dans d'autres *Recueils scientifiques*, on peut consulter les ouvrages de Du Hamel, du Dr. Hales, du Dr. Hill, sans oublier ceux du savant Hedwîg, si connu par ses nombreuses recherches sur la physiologie des plantes, & ceux de nos célèbres compatriotes, Charles Bonnet, qui le premier, dans ses *Considérations sur les êtres organisés*, a fait sentir la liaison qui existe entre les principales fonctions des animaux & celles des végétaux, & Jean Senebier, auteur de la *physiologie végétale*, dans l'*Encyclopédie méthodique*, des *mémoires physico-chymiques* sur l'influence de la lumière solaire &c.

A côté de ces grands noms, on aime à voir la Société Littéraire & Philosophique de Manchester, placer celui d'un jeune homme de 22 ans, le Dr. George Bell qui en 1777 avoit fait de la physiologie des plantes le sujet de sa dissertation inaugurale pour obtenir le grade de Dr. en médecine à Edimbourg, & qui y avoit acquis une si grande réputation de science sur la physique végétale, que le célèbre Lord Kames

demandant un jour au professeur Cullen quelques informations sur ce sujet, dont il avoit besoin pour un ouvrage important auquel il travailloit alors, & qu'il a publié depuis (*The gentleman Farmer*) le savant Professeur lui recommanda le jeune Bell, alors âgé de 20 ans, comme l'homme le plus capable de lui donner tous les renseignemens dont il auroit besoin. C'est à cette circonstance que notre jeune auteur a dû la haute estime, l'amitié & la protection, dont le Lord Kames n'a cessé de l'honorer. Après avoir pris son grade, le Dr. Bell étoit venu s'établir d'abord à Berwick, & ensuite à Manchester, où il pratiquoit avec distinction depuis plusieurs années, lorsqu'une mort prématurée l'enleva à la science & aux lettres. La Société, dont il n'étoit pas un des membres les moins actifs, témoigna ses regrets, en insérant dans le 2d. volume de ses mémoires son Eloge Historique, & une traduction de sa dissertation sur la physiologie des plantes; à laquelle son ami le Dr. James Currie, de Liverpool, auteur de l'un & de l'autre, a ajouté de savantes notes. C'est de cette dissertation dont nous allons présenter un Extrait à nos lecteurs.

Quand on coupe transversalement un arbre, on y distingue trois parties, l'écorce, le bois & la moëlle.

1°. Il y a deux parties à considérer dans l'écorce, l'épiderme, & l'écorce proprement dite.

L'épiderme est composé de plusieurs couches, aisément séparables l'une de l'autre, & dont les fibres sont circulaires (1). Il recouvre toutes les parties de la plante, & même les semences qui sont dans le centre des fruits, ce qui prouve que la formation n'est point due, comme l'a cru le Dr. Hill, à l'endurcissement de la vraie écorce par l'action de l'air. L'écorce proprement dite est entièrement composée d'un tissu cellulaire ou parenchyme dont les cellules communiquent les unes avec les autres, & qui sont traversées par deux sortes d'organes, les vaisseaux propres de la plante, & les fibres longitudinales.

2°. Le bois situé au-dessous de l'écorce, est comme celle-ci, composé de cellules, mais beaucoup plus denses & plus rapprochées les unes des autres. Elles sont aussi traversées non-seulement par les vaisseaux propres de la plante, & par des fibres longitudinales, mais encore par de grands tubes ou canaux dont l'enveloppe est contournée en spirale & qui s'étendent d'un bout de l'arbre jusqu'à l'autre. On les appelle *Trachées*, ou vaisseaux aériens. Entre le bois & la moëlle on trouve une substance verte, à laquelle le Dr. Hill, qui est le premier qui l'ait

(1) Cela est vrai des arbres dont l'épiderme s'enlève par bandes circulaires, tels que les cerisiers, pruniers &c, mais cela n'est pas prouvé pour les autres plantes. (R.)

bien décrite a donné le nom de *couronne*. Il prétend qu'elle contient toutes les parties de la plante en embryon.

3°. Au centre de l'arbre est la 'moëlle, d'autant plus abondante que l'arbre est plus jeune; car à mesure qu'il grandit, grossit & approche de sa maturité, elle se sèche & diminue, tellement que dans les vieux arbres, elle est entièrement oblitérée (1). Sa structure est entièrement cellulaire, & le Dr. Hill assure qu'elle est uniformément la même dans toutes les plantes.

Telles sont les parties solides. Quant aux fluides, il y en a de deux sortes; l'un qui est exactement de la même nature dans toutes les plantes, qui diffère très-peu de l'eau commune (2), & que l'on obtient abondamment de plusieurs plantes, telles que la vigne ou le hêtre, par une incision faite au printemps, s'appelle la *seve* ou le suc commun; l'autre qui varie suivant les différentes plantes dans lesquelles il se trouve

(1.) Cela n'est pas vrai de tous les arbres. Le fureau, par exemple quoique vieux, conserve toujours une assez grande quantité de moëlle. (R)

(2.) On a cru que la seve de certains arbres, comme l'érable contenoit un principe sucré, que celles d'autres arbres contenoit un acide &c. le Dr. Bell s'est assuré par plusieurs expériences qu'il n'y a rien de semblable. C'est pourquoi il supposoit que lorsqu'on a cru trouver dans la seve de pareils principes, c'est qu'il s'y étoit mêlé accidentellement du suc propre de la plante.

& duquel dépendent leurs qualités sensibles & leurs propriétés s'appellent le *suc propre*. Ces deux sucs ne se mêlent jamais dans l'arbre, & le dernier ne se trouve que dans les vaisseaux propres.

On n'a point encore déterminé si la sève se transmet d'une partie de la plante à une autre par des vaisseaux ou par la substance cellulaire seulement. On a essayé de décider cette question par des injections. Elles ont pénétré à une certaine hauteur dans la plante, mais toujours avec de telles irrégularités qu'on n'a rien pu en conclure en faveur de l'une ou de l'autre opinion. Chacune a eu ses partisans. Notre auteur penche pour la première, 1°. à cause de l'analogie des vaisseaux propres & des vaisseaux aériens qui contiennent certainement les uns le suc propre des plantes, & les autres l'air qu'elles renferment. Pourquoi la sève n'auroit-elle pas comme eux, les vaisseaux déferens. 2°. Parce qu'on n'a point d'exemple de sécrétion, fonction dont les plantes jouissent certainement aussi bien que les animaux, sans l'intervention des vaisseaux particuliers; 3°. parce que le Dr. Hales ayant inventé un instrument au moyen duquel il mesuroit exactement le diamètre d'une branche de vigne, à $\frac{1}{100}$ de pouce près, trouva que sa grosseur étoit exactement la même, soit que la branche fut remplie de sève, ou qu'elle en fut totalement dépourvue.

Les botanistes ont fait un grand nombre d'expériences pour déterminer le cours de la sève, & sa direction. Monte-t-elle des racines dans le tronc, & du tronc dans les branches, ou descend-elle des branches dans le tronc, & du tronc dans les racines ? On a généralement adopté la dernière opinion parce que quand on fait des incisions à un arbre au travers de l'écorce & du bois jusqu'à la moëlle dans la saison où la sève est abondante, c'est-à-dire au printemps, on en voit toujours couler une plus grande quantité des bords supérieurs de la playe que des bords inférieurs, ce qu'on explique par la grande quantité d'humidité que l'arbre absorbe par ses branches.

Notre auteur réfute cette opinion par deux expériences qui le portent à croire que la sève monte & ne descend pas. 1. Après avoir fait plusieurs incisions à différentes hauteurs sur la tige de diverses plantes, il a plongé leurs racines dans une décoction de bois de Brésil. La liqueur colorante est montée des racines dans le tronc à la hauteur de l'incision & guères au-delà ; ce qui n'a pas empêché qu'on ne l'ait toujours vue couler du bord supérieur, & jamais du bord inférieur. 2. Après avoir fait plusieurs incisions profondes sur une branche de vigne, & avoir vu couler la sève en grande abondance par le bord supérieur de la playe, il a renversé cette branche, de manière que

le bord supérieur fut placé par ce renversement au-dessus du bord inférieur, & alors la sève a constamment coulé à l'incision du bord le plus voisin de la racine qui étoit devenu le bord supérieur. C'en'est donc que par l'effet de sa pesanteur & non en conséquence de son éloignement des racines que la sève coule d'un bord de l'incision plutôt que de l'autre (1).

D'autres observations tendent encore à prouver qu'au printemps la sève monte & ne descend pas. 1. Le Dr. Hope a fait sur la fin de l'hiver & avant l'apparence de la sève plusieurs incisions sur un hêtre à différentes hauteurs. Quand la sève a commencé à se manifester, elle a constamment coulé par le bord supérieur de l'incision; & jamais par le bord inférieur; mais toujours elle a commencé à couler d'abord à la première incision, celle qui étoit le plus près de terre, ensuite à la seconde, puis à la troisième, & ainsi de suite en remontant constamment dans le tronc des racines jusqu'aux branches 2. Si au commencement de la saison pendant laquelle la vigne pleure, c'est-à-dire donne une grande quantité de sève, mais avant que cette sève se soit manifestée dans le tronc ou dans les branches, on fait une incision profonde sur ses racines, il en découle toujours une grande quantité de sève; 3 l'abon-

(1) Pourquoi donc le suc propre découle-t-il des deux bords de l'incision? (R)

La sève de la fève est toujours proportionnée à l'humidité du terrain. La fève monte donc des racines dans les branches, & elle ne descend pas de celles-ci dans le tronc.

Le suc propre des plantes paroît suivre une direction contraire. Car notre auteur ayant fait une incision profonde sur un pin, trouva que quoiqu'au premier moment le suc coulât en grande abondance des deux bords de la playe, au bout de quelques instans il ne coula plus que du bord supérieur, c'est-à-dire, du bord le plus éloigné des racines, & cette direction ne changea point, comme on l'avoit observé à l'égard de la fève, lorsque la branche sur laquelle on avoit fait l'incision fut placée horizontalement ou même renversée. Dans l'une & l'autre de ces deux positions, le suc coula toujours comme dans la position verticale du bord de l'incision le plus éloigné des racines. Ce n'est donc pas le poids du suc, mais son éloignement des racines, qui détermine son écoulement par l'un des bords de l'incision plutôt que par l'autre.

Il n'est pas aussi aisé de déterminer la direction de l'air dans les vaisseaux aériens. On trouve ces vaisseaux dans le bois, dans les feuilles, dans les pétales; mais on n'en trouve ni dans l'écorce, ni dans les plantes herbacées (1). Ils

(1) Il seroit bien extraordinaire que les plantes herbacées qui ont tant de rapport avec les arbres fussent privées d'un organe qui paroît si général & si

sont composés de plusieurs petites filaments contournés en spirale, de manière à former un canal dans le centre. On leur a donné le nom de vaisseaux aériens parce qu'ils ne contiennent jamais aucun liquide (1), & que comme le bois dans lequel on les trouve en grande abondance, renferme beaucoup d'air, sans aucun autre organe propre à le contenir, on présume que c'est dans ces vaisseaux qu'il est contenu. On les regarde donc comme analogues aux poumons dans les animaux, comme les principaux organes de la respiration dans les plantes.

Mais comment se fait cette respiration ? Comment l'air pénètre-t-il dans les plantes ? Quelques auteurs ont imaginé qu'il y entre par les racines sous une forme non élastique, & qu'en les traversant, il recouvre graduellement son élasticité. Mais 1°. on trouve un grand nombre de vaisseaux aériens dans les racines mêmes, où les sucs n'ont point encore circulé, & où par conséquent il ne peut pas encore s'être développé d'air ; 2°. la situation des racines, enterrées comme elles le sont, & souvent à une

essentiel à la végétation. Aussi a-t-on trouvé dans ces plantes, comme dans les autres, un grand nombre de vaisseaux aériens ou de trachées. Ils forment la plus grande partie, ou la totalité des filets ligneux qui les parcourent. (R).--

(1) On verra plus bas que c'est une erreur & que ces vaisseaux sont au contraire souvent remplis de liquides. (R).

grande profondeur, ne permet gueres de supposer qu'elles absorbent un fluide aussi peu à leur portée que l'air.

D'autres ont cru que l'air pénètre dans les plantes par les feuilles. Mais si delà, il descend dans le tronc & dans les racines, ne gênera-t-il pas le mouvement de la sève ascendante ? Cette objection nous paroît faible, d'autant plus qu'elle milite également contre toutes les théories, & en particulier contre celle qu'adopte notre auteur, d'après le Dr. Hill.

Cet ingénieux botaniste, considérant que l'épiderme des plantes est évidemment vasculaire, que dans les arbres & les arbrisseaux, qui sont les seules plantes dans lesquelles on découvre des vaisseaux aériens, les vaisseaux de l'épiderme ont un orifice externe, tandis qu'ils n'en ont point dans les plantes herbacées, & qu'enfin si l'on place une branche d'arbre sous le récipient de la machine pneumatique, on n'en voit sortir l'air que par le bois, suppose que les vaisseaux de l'épiderme sont les véritables organes de la respiration dans les plantes. (1).

(1) Il est difficile d'imaginer qu'une écorce entièrement morte comme celle qui recouvre les grands arbres contienne les organes de la respiration des plantes. Puisque les plantes herbacées ont aussi leurs trachées, elles devroient avoir aussi des orifices externes à l'épiderme. Le fait est qu'on ne les voit pas mieux dans les arbres que dans les autres plantes. (R)

ceux par lesquels , lorsque la douce température du printemps commence à dilater leurs orifices contractés par le froid de l'hiver , l'air pénètre dans les vaisseaux aériens , & par ceux-ci jusqu'aux racines , qu'il ranime & vivifie , de la même manière qu'il produit cet effet sur les muscles des animaux ; peut-être même assiste-t-il par son élasticité le mouvement d'ascension de la sève ; ces mouvements intérieurs des fluides dans la plante développent une nouvelle quantité d'air qui circule avec eux , & s'échappe enfin par les feuilles.

A l'appui de cette théorie , le Dr. Bell rapporte une expérience qui prouve en même temps , le grand besoin d'air qu'ont les plantes ainsi que les animaux. Il vernit plusieurs jeunes arbres au milieu de l'hiver & les enveloppa d'une toile citée , en ne laissant que le sommet des branches exposé à l'air. Ils demeurèrent tous dans cette situation jusqu'à l'été. Le résultat de cette expérience fut que tous les arbres qui avoient été exactement garantis de l'air périrent. Les autres languirent & n'eurent que peu de feuilles. C'est sans doute par cette raison que les arbres qui sont surchargés de mousse à leur surface ne poussent que peu de feuilles , de foibles rejetons , & point de fruits. Aussi les jardiniers ont-ils grand soin de dépouiller l'écorce de leurs arbres de cette mousse qui les étouffe & leur ôte le bénéfice de l'air extérieur (1).

(1) Il n'est pas décidé chez les agriculteurs si la

On a supposé que l'air après avoir pénétré dans les plantes y demeure susceptible de dilatation & de contraction suivant les changements de température de l'atmosphère, & que c'est principalement à ces oscillations de l'air interne qu'est dû le mouvement ascendant & descendant des fluides. Notre auteur réfute cette opinion, en faisant voir, 1. que les vaisseaux aériens des racines sont trop profondément situés pour pouvoir participer aux variations de chaleur dans l'atmosphère; 2. que la sève monte & que le suc propre descend, quelle que soit la température de l'air extérieur; 3. que si les vaisseaux qui contiennent les suc des plantes sont pourvus de valvules, ces suc ne sont pas susceptibles d'un mouvement rétrograde, & que s'ils n'en ont point, la compression qu'exerceront sur eux les vaisseaux aériens gênera encore plus leur mouvement qu'elle ne le favorisera.

Quelles sont donc les forces qui font mouvoir ces suc? seroit-ce, comme on l'a cru généralement, l'attraction capillaire rendue permanente par l'évaporation qui se fait par les feuilles? mais l'attraction capillaire ne peut avoir lieu que lorsque la résistance à l'une des extrémités du tube est diminuée. Elle expliquerait

moins qui vient sur les arbres nuit réellement à leur végétation ou bien si elle ne s'attache qu'à ceux qui sont déjà vieux & languissans. Au moins est-il certain qu'on ne l'aperçoit que rarement sur les autres, (R)

tout au plus le mouvement d'ascension de la sève ; lorsque la chaleur de l'atmosphère est plus grande que celle de la terre. Elle ne sauroit expliquer le mouvement descendant du suc propre , ni celui de la sève dans la même direction , si comme cela est assez probable , il a quelquefois lieu. Comment concevoir d'ailleurs que les vaisseaux des plantes soient d'un diamètre assez petit pour pouvoir élever leurs sucs par la seule force d'attraction capillaire depuis les racines d'un grand arbre jusqu'au sommet de ses branches ? Comment expliquer dans cette supposition l'écoulement abondant de la sève par les incisions faites sur les tiges ou sur les branches de la vigne au printemps , tandis que celles qu'on fait en été ne produisent point cet effet ? Les vaisseaux ne sont-ils pas les mêmes ? Enfin on a beau rompre des tuyaux capillaires remplis d'une liqueur ; elle n'en sort point ; au lieu que comme l'a démontré le Dr. Hales , il suffit de couper transversalement une tige de vigne pour obtenir un écoulement abondant de fluides.

Il faut donc avoir recours à une autre force motrice , & celle qu'adopte notre auteur est le principe vital , dont il suppose , avec tous les botanistes modernes , que les plantes sont douées , ainsi que les animaux. Il est un grand nombre de plantes qui se montrent sensibles à l'action des stimulans & dans lesquelles quand on les

les touche on remarque des mouvemens extraordinaires. L'action seule de la lumière suffit pour donner à leurs tiges une direction différente, ou pour redresser leurs feuilles, que l'obscurité couche au contraire les unes sur les autres, quelle que soit la température de l'air. C'est cette influence de l'obscurité qu'on a appelée avec assez de justice *le somnail des plantes*, & que tous les observateurs ont remarquée. Puis donc que les plantes sont évidemment douées d'un principe d'irritabilité, rien n'empêche qu'on n'explique par ce principe leurs mouvemens, & ceux de leurs sucres, de la même manière que tout le monde s'accorde à lui attribuer ceux des animaux. L'auteur parle à cette occasion de diverses expériences qu'il avoit faites pour déterminer l'influence de différens gaz, de la lumière & de quelques solutions salines sur l'accroissement & les qualités des végétaux (1). Il en supprime le détail, parce qu'il

(1) Dans une dissertation inaugurale sur l'irritabilité des plantes, publiée à Edimbourg, en juil. 1797 par notre compatriote le Dr. Jean Pechier, on trouve plusieurs expériences faites dans le but de déterminer l'effet des acides, des alkalis, des corps odorans, tels que le musc, le camphre & l'éther, de l'oxygène, de la lumière, de la chaleur & du froid, sur les contractions de la sensitive, de l'épinevinette, & d'autres plantes irritables. En général, les vapeurs acides & alkalis ont agi sur ces plantes comme stimulans, & les ont évidemment mises en contraction. Les corps

Sciences & Arts, Vol. 9, N°. 1, an VI, (1798. v. st.) H

se proposoit de les répéter sur un plan plus vaste. Mais leur résultat général fut que l'accroissement des plantes peut être augmenté par l'action de certains stimulans, dont l'effet ne permet pas de douter de l'existence du principe vital qui les anime.

Les plantes transpirent comme les animaux. Mais d'après les expériences du Dr. Hales (Statique des végétaux, vol. I. p. 49) & celles de Guettard (Mémoires de l'Académie des Sciences 1748) l'humidité qu'elles exhalent ne paroît différer que très-peu de l'eau pure, si ce n'est qu'elle est plus susceptible de putréfaction. Sa quantité est d'autant plus grande que la surface de la plante est plus augmentée par un grand nombre de feuilles, que l'air extérieur est plus chaud & plus sec, que la plante est exposée à une plus vive lumière, & qu'elle est dans un plus grand état de vigueur & de santé.

D'un autre côté les plantes absorbent aussi de l'humidité; & ce sont encore les feuilles qui sont le principal organe de cette absorption, comme elles sont celui de la transpiration. Mais il paroît que c'est par leur surface supérieure

qu'elles ont eu peu d'effet sur elles. Le camphre a diminué leur irritabilité. L'auteur n'a pas observé que la présence de l'oxigène ou de la lumière eût aucune influence marquée sur leurs mouvemens. La chaleur d'un fer rouge, le froid de la neige n'en ont gueres eu davantage. (R)

qu'elles exhalent l'humidité ; & par leur surface inférieure qu'elles la pompent. Si de deux feuilles semblables, on enduit de vernis la surface supérieure de l'une & la surface inférieure de l'autre, la première se trouve au bout d'un temps donné n'avoir point diminué de poids, & la seconde beaucoup. De même si on laisse flotter sur l'eau des feuilles parfaitement semblables ; les unes avec leur surface supérieure, les autres avec leur surface inférieure en contact avec l'eau, les premières n'augmentent point de poids, & meurent en peu de jours ; les autres deviennent bientôt plus pesantes, & conservent leur fraîcheur pendant plusieurs mois. Les organes de la transpiration ne sont donc pas les mêmes que ceux de l'absorption (1). Il est probable que ces organes ont une structure particulière, & que leur action tient au principe de vie. Car les feuilles séchées n'absorbent point ; & si l'on coupe un bout de racine d'un

(1) Cette remarque ne peut gueres s'appliquer qu'aux feuilles des arbres dont la surface supérieure est réellement différente de l'inférieure. Dans les plantes herbacées les deux surfaces sont presque toujours semblables, & par conséquent leurs fonctions ne peuvent pas être fort différentes. Pourquoi dans toutes les recherches de ce genre n'a-t-on presque considéré que les grands végétaux ? Les autres auroient peut-être été plus utiles pour la recherche de ces vérités qui sont encore si profondément cachées. (2)

oignon de jacinthe poussant dans l'eau, l'absorption ne se fait plus, toute la racine périt & tombe, & de nouvelles racines ayant leur extrémité adaptée à la fonction d'absorption à laquelle elles sont destinées, sortent de l'oignon, pour remplacer celle qui est devenue inutile par la section de son extrémité.

Il est vraisemblable aussi qu'une grande partie de la matière exhalée se réabsorbe dès qu'elle est parvenue à la surface. Elle seroit de véhicule aux matières nuisibles dont l'expulsion étoit nécessaire à la vie de la plante; & si ces matières n'avoient pas été délayées dans une grande quantité d'humidité, elles auroient pu par leur concentration nuire aux organes qu'elles traversent, mais quand ces matières nuisibles sont arrivées à la surface & rejetées hors du corps de la plante, rien n'empêche que l'humidité dont elle a un besoin continuel ne soit de nouveau repompée, de la même manière qu'on voit dans les animaux des urines trop acres pour que les reins eussent pu sans danger être exposés à nud à leur action concentrée, être délayées & enveloppées dans un grand volume de sérosité, qui lorsque ces urines sont, sous sa sauve-garde, arrivées à la vessie sans endommager les organes tendres & délicats qu'elles ont du traverser avant d'y être déposées, est de nouveau en grande partie repompée & rentre dans la masse des fluides.

Puis donc que les plantes exhaleut & absorbent en même temps de l'humidité, on ne peut jamais juger exactement de la quantité qu'elles en perdent par l'exhalation, ou gagnent par l'absorption. On ne peut connoître que l'excès de l'une sur l'autre. Qu'un tournesol par exemple perde dans l'espace d'un jour 20 onces de son poids, on ne pourra pas en conclure que la quantité d'humidité exhalée dans les 24 heures par cette plante est de 20 onces, mais qu'elle surpasse de 20 onces celle qui a été repompée. Qu'au lieu de perdre, il gagne en poids 10 onces; on n'en conclura autre chose si ce n'est que l'absorption a surpassé de 10 onces l'exhalation. Qu'il conserve exactement le même poids, on en conclura que l'exhalation est exactement compensée par l'absorption.

Les plantes ont le pouvoir de former leurs différentes parties; & ce pouvoir elles l'exercent par voie de sécrétion. Nous pouvons jusqu'à un certain point en deviner les agens, mais nous ignorons leur maniere d'opérer. Il y a lieu de croire cependant que le principe vital n'est pas assez actif dans les plantes pour s'acquitter seul de cette fonction. Il a besoin d'être fécondé par la fermentation (1), par l'absorption, &

(1) La fermentation peut concourir à l'élaboration des sucs de la plante; mais on ne comprend pas comment elle pourroit servir à la formation des parties solides. Le germe préexiste dans le noyau avec

par la distribution particulière des vaisseaux. Lorsqu'il est question par exemple de former une partie dure, comme les noyaux des fruits, les vaisseaux font diverses circonvolutions, avant d'arriver à l'organe qui en dépose les matériaux, afin de ralentir le cours des suc, & de leur donner le temps de fermenter & de s'épaissir. Le suc propre paroît ne se former qu'après que la sève est montée jusqu'aux feuilles, & pendant qu'elle descend des feuilles aux racines. Il en est de même du bois : car lorsqu'on fait une ligature autour du tronc, le bois se gonfle & s'épaissit beaucoup, mais seulement au-dessus de la ligature, & non pas au-dessous.

Quant aux élémens qui servent de nourriture aux plantes, l'auteur présume que ce sont principalement l'eau & la lumière (1). Il avoit

son organisation propre ; & cette organisation seule peut suffire pour y fixer celles des molécules nutritives qui sont nécessaires à son développement. (R)

(1) Le calorique doit aussi contribuer à leur développement. C'est un fait connu, il est vrai, que des plantes qui s'étioient à l'obscurité, se fortifient & se colorent à l'air. Mais il est également vrai que le même individu renfermé dans une serre chaude s'y colore beaucoup plus fortement que lorsqu'il est exposé en plein air, & que les plantes des pays chauds, après s'être décolorées à un air froid, ont reverdi dans toutes leurs parties, lorsqu'elles ont été placées dans l'intérieur des couches. Or dans ces couches

fait quelques expériences qui l'acheminoient à cette conclusion ; mais il ne les a pas publiées.

La sève & les autres succs végétaux circulent-ils dans les plantes, comme le sang circule dans les animaux ? Cette question a partagé les botanistes. L'expérience de la ligature dont nous venons de parler a fait croire aux uns que la sève monte le long du bois, & descend le long de l'écorce. D'un autre côté on a essayé d'écortcher un arbre, d'enlever une section entière du bois & de remettre l'écorce en place. Cette opération n'a point empêché l'arbre de croître. On en a conclu que la sève monte le long de l'écorce. Tout cela est encore fort obscur. La sève montant certainement des racines dans le tronc, & du tronc dans les branches, & le suc propre suivant une direction contraire, on ne peut se refuser à croire qu'il y a dans les plantes une sorte de circulation. Mais les vaisseaux par lesquels elle se fait sont-ils, comme dans les animaux, placés les uns à côté des autres, ou sont-ils les uns dans le bois & les autres dans l'écorce, c'est ce qu'on n'a point encore éclairci. (I)

il y a plus de chaleur, mais il n'y a pas plus de lumière, (R)

(I) Il n'est pas probable que la partie ligneuse, soit d'une grande utilité dans l'acte de la végétation, puisque plusieurs arbres, tels que les saules, dépouillés de cette partie ligneuse, n'en vivent pas moins. (R)

Quoiqu'il en soit, on a tout lieu de croire que le principe de vie a la plus grande part à toutes les fonctions des plantes, à leur formation, à leur accroissement, à leurs sécrétions &c. Ce principe semble être le même que celui de l'organisation. Partout où l'on voit un arrangement particulier d'organes, on doit soupçonner de la vitalité, & réciproquement partout où il y a vie, il y a une organisation particulière. Il est vrai que la nature n'a pas prodigué ce principe avec la même libéralité à tous les êtres organisés. En thèse générale, les animaux en sont plus richement pourvus que les plantes; mais il y a des nuances infinies entr'eux, des gradations d'intelligence & de sensibilité, telles que les limites entre le regne animal & le regne végétal sont fort éloignées d'être bien distinctes. Les coraux & plusieurs espèces de polypes adhèrent aux rochers comme les plantes à la terre, & comme elles, ils meurent si on les détache du lieu où ils ont pris leur accroissement. D'un autre côté, il y a des plantes dont les mouvemens ressemblent beaucoup à ceux des animaux. Les feuilles du *Barrum Chundalli* (1) ont un mouvement con-

(1) Cette plante originaire du Bengale y a été découverte par Mylady Monson, & a été rangée par Linné fils dans le genre des fainfoins sous le nom d'*Hedysarum gyrans*. Elle a les feuilles ternées, & la foliole intermédiaire beaucoup plus grande que les

tinuel & en apparence spontanée qui annonce un principe de vie fort étergique. Il en est de même de la sensitive & de la *Dianda muscipula* qui montrent l'une & l'autre une admirable activité dans leurs feuilles à la plus légère impression, au point d'enfermer & d'étouffer par leurs contractions les mouches & les autres insectes qui viennent se poser sur elles. Certainement il y a des animaux qui semblent en vitalité fort au-dessous de ces plantes & de plusieurs autres ; & « je ne fais » ajoute l'auteur, « si » nous n'avons pas tort d'attribuer exclusive-
 » ment au regne animal la faculté d'éprouver
 » tour-à-tour le plaisir & la douleur. Il me sem-
 » ble que les fleurs dont brillent nos parterres
 » auroient plus de beauté, les arbres qui dé-
 » corent nos forêts plus de dignité, & l'étude
 » de la botanique plus d'attraits, si nous con-
 » sentions à envisager les plantes comme des
 » êtres sensibles. »

deux autres. Cette foliole n'a aucun mouvement pendant le jour. Dans la nuit, elle se recourbe & vient s'appliquer sur les branches. Mais les folioles latérales sont toujours en mouvement. Elles se portent alternativement vers le haut & vers le bas ; & ce mouvement continue depuis que la plante naît jusqu'au moment où elle cesse de fleurir. Elle est cultivée dans nos serres, où elle fleurit assez communément. Voyez sa description dans le Journal de Physique pour le mois de mai 1787. (R.)

On voit assez d'après la dissertation de Mr. Bell combien nos connoissances sur la physiologie des plantes sont foibles & incertaines. Nous savons que l'intérieur des végétaux est composé de plusieurs parties distinctes, telles que la moëlle, le bois, &c. qu'il contient deux espèces de vaisseaux faciles à distinguer, les vaisseaux propres, & les trachées, que les feuilles sont des organes propres à la respiration, & à l'inspiration, que l'air ainsi que la lumière contribuent à leur accroissement : mais nous ne savons encore rien de précis, sur la manière dont circulent les fluides, dont s'opèrent les sécrétions, &c. nous ignorons également l'usage des diverses parties qui composent le végétal, du bois, par exemple, de la moëlle, du parenchyme, &c. — Et si de ces objets qui ne sont que la base de la physiologie nous passons à d'autres qui en dépendent & qui sont plus relevées, si nous nous demandons par exemple en vertu de quel mécanisme les plantes exécutent ces mouvemens nombreux qui leur sont propres, comment elles s'avancent vers la lumière, par quelle force leurs feuilles se retournent & leurs fleurs s'épanouissent ou se ferment à des heures déterminées, quelle est la raison pour laquelle leurs radicules se dirigent toujours vers la terre & leurs tiges vers le ciel, & en général quelles sont les causes de tant de phénomènes curieux que l'on observe

dans presque tous les genres des végétaux, nous avouerons que nous n'avons pas même des conjectures à présenter pour expliquer le plus grand nombre de ces faits, & que l'étude de la physiologie est encore au berceau. Depuis quelques années on s'est accoutumé à considérer les trachées comme des vaisseaux qui au lieu d'être destinés à l'air seul, charioient encore d'autres fluides & particulièrement la sève. Hedwig ce grand observateur assure les avoir vu remplis de ce dernier fluide, & il les considère comme revêtus à l'intérieur d'une membrane fine & transparente qui sert à le contenir. Il va même plus loin, & il croit que la substance du bois, est toute entière formée par des trachées endurcies & qui ont perdu leur élasticité.

Par rapport au mouvement de la sève, voici de toutes les explications celle qui nous paroît la plus conforme à la marche de la nature, & qui est le plus à l'abri des objections, on la doit à notre illustre compatriote Desfaussure & elle est extraite de la physiologie végétale de l'Encyclopédie Méthodique, où elle a été pour la première fois publiée.

« Supposez dis-il, un tube flexible dans une situation verticale & rempli de sève ou de tout autre liquide depuis le bas jusqu'à la moitié de sa hauteur; supposez ce tube ouvert par ses deux extrémités & plongé dans

» l'eau par en bas, le fluide qu'il contient
 » va s'écouler & se mêler à l'eau; mais s'il se
 » forme un étranglement dans la partie infé-
 » rieure, cet étranglement empêchera l'écoule-
 » ment & le fluide demeurera renfermé dans
 » le tube : qu'immédiatement au-dessus de cet
 » étranglement, le tube se resserre encore, le
 » fluide sera chassé vers le haut, & si de proche
 » en proche le tube continue à se resserer,
 » le fluide sera progressivement chassé vers le
 » haut du tube : Qu'après que le fluide a été
 » ainsi chassé à une certaine hauteur l'orifice
 » inférieur du tube se rouvre, tandis que la
 » partie moyenne demeure resserrée, l'eau dans
 » laquelle plonge le tube, sollicitée ou par la
 » pression de l'air intérieur, ou par la suction
 » capillaire, entrera dans le vide qui vient de
 » se former & l'on conçoit distinctement com-
 » ment la répétition des mêmes alternatives de
 » contraction & de dilatation peut chasser conti-
 » nuellement dans le même sens un fluide ren-
 » fermé dans un tube élastique. »

» Si la contraction avoit commencé par le
 » haut du tube, le fluide auroit été chassé vers
 » la terre : si dans un fluide horizontal, la
 » contraction commence à droite, le fluide mar-
 » chera à gauche & réciproquement, &c. »

» On voit en même temps comment par un
 » simple changement dans l'ordre des contrac-
 » tions les mêmes vaisseaux peuvent faire mar-

» cher la sève dans une direction opposée à la
 » première. Il est indispensable d'expliquer ce
 » fait, puisque dans l'arbre qu'on plante à l'en-
 » vers, la sève prend une direction contraire
 » à celle qu'elle avoit d'abord : & il est im-
 » possible de l'expliquer dans l'hypothèse des
 » valvules ou des soupapes. »

» Je fais bien que ce mouvement alternatif
 » n'a point été constaté par des observations
 » immédiates ; mais si on l'avoit observé ce ne
 » seroit pas une hypothèse, ce seroit un fait.
 » — Il est évident que soit sa lenteur, soit la
 » ténuité des vaisseaux dans lesquels on le sup-
 » pose, peuvent le dérober à nos yeux, c'est
 » ainsi qu'on ne peut point observer la pulsa-
 » tion des artères dans leurs dernières rami-
 » fications, quoique personne n'osât affirmer que
 » ce mouvement cesse dès le terme où l'on cesse
 » de l'appercevoir. »

» La cause de ce mouvement seroit sans
 » doute l'irritabilité. Il faut supposer que les
 » vaisseaux dans lesquels se meuvent les sucs
 » des plantes sont irrités par le passage de ces
 » sucs, & que cette irritation excite dans ces
 » vaisseaux une contraction progressive, & quel
 » genre de mouvement paroît plus adapté aux
 » plantes que celui qui suffit seul à expliquer
 » toutes leurs fonctions vitales & qui possède
 » la simplicité & l'uniformité qui constituent
 » le caractère de cette classe d'êtres organisés. »

94 CORRESPONDANCE.

Il ne reste donc plus qu'à découvrir cette irritabilité, sur laquelle notre illustre Professeur a déjà fait des expériences assez satisfaisantes & alors le grand problème de la circulation de la sève sera enfin résolu.

CORRESPONDANCE.

AUX CITOYENS RÉDACTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE BRITANNIQUE.

Paris 17 Fructidor an 6.

Citoyens,

DANS la partie des essais du Comte de RUMFORD, que vous venez de publier dans votre intéressant Recueil, j'ai vu avec plaisir la note (pag. 103) dans laquelle vous rappelez quelques phénomènes qui démontrent une attraction *évidemment Elective*, &c. qui semblent par conséquent se refuser à l'explication que propose ce Savant de tous les effets apparens d'affinité chimique, par la seule combinaison des effets de la chaleur avec ceux des changemens de pesanteur spécifique, sans avoir recours à l'action d'une attraction particulière.

Les adhésions de l'eau aux corps qu'elle mouille ; du mercure à l'or, à l'étain, &c. sont bien certainement, comme vous l'observez des exemples de ces attractions électives, & il ne paroît pas que le feu influe dans cette espèce d'affinité, puis qu'on ne remarque point de changement dans la température des corps entre lesquels elle s'exerce.

Mais il s'en faut bien, à mon avis, que vous donniez à cet argument toute la force dont il est susceptible; j'oserais même dire que vous me paraissez en détruire les conséquences les plus directes & les plus importantes lorsque vous mettez en opposition les corps gras comme ne s'attachant pas à l'eau, le fer comme ne s'attachant pas au mercure; lorsque vous supposez surtout *répulsion* entre ces substances.

J'ai publié, il y a vingt-cinq ans, dans le Journal Physique (T. I. pag. 172 & 468) & depuis dans les Elémens de chimie de Dijon, dans le Dictionnaire de chimie de l'Encyclopédie méthodique, article *adhésion*, des expériences qui prouvent non-seulement qu'il n'y a pas répulsion entre l'eau & l'huile, entre le mercure & le fer; mais encore qu'il y a par le seul contact de ces substances une force attractive que l'on peut déterminer par des poids. Cette attraction est assez puissante pour produire l'ascension de l'eau entre deux lames de suif rapprochées parallèlement à une petite distance. J'ai fait voir que l'adhésion ne dépendoit pas, comme on l'avoit soupçonné, de la pression de l'air, puisqu'elle varioit suivant les différens corps, les surfaces exposées à la pression étant semblables; puisqu'elle avoit lieu sous le récipient de la machine pneumatique comme dans l'air. Il résulte enfin de ces expériences que l'ordre des adhésions du mercure aux métaux qu'il dissout, est d'accord avec l'ordre de ses affinités déterminé par les précipitations de ces métaux les uns par les autres.

Je suis bien éloigné de contester au Comte de Rumford, l'influence, si manifeste en tant de circonstances, des changemens de température & de pesanteur spécifique sur les combinaisons chimiques; mais les phénomènes les plus familiers des dissolutions, & particulièrement les faits que je viens de rappeler me

semblent résister à ce que l'on considère ces changemens comme cause unique. Ce ne sont réellement que des forces, adjuvantes ou perturbatrices. La rupture d'équilibre, les compositions nouvelles, les échanges de principes s'opèrent toujours en vertu de l'attraction universelle, dont les effets sont naturellement modifiés par la figure des molécules & la distance qu'elle engendre; qui est souvent contrebalancée efficacement par la force d'aggrégation ou de cohésion; qui s'accroît à raison de la quantité des points de contact, ou pour parler plus exactement, des surfaces susceptibles d'entrer dans la sphère de son activité; qui, à un certain degré d'accroissement, produit des adhésions plus ou moins fortes, mais superficielles & sans dissolution; qui, dans les degrés ultérieurs, détermine des affinités plus ou moins puissantes.

Si vous jugez de quelque importance de ramener l'attention de vos Lecteurs sur ce sujet, vous pouvez, Citoyens, faire de cette Lettre l'usage qu'il vous plaira.

Recevez l'assurance de la haute estime & des sentimens fraternels avec lesquels je suis

Votre Concitoyen

L. B. GUYTON.

A S T R O N O M I E.

ON THE DISCOVERY, &c. Découverte de quatre nouveaux Satellites au *Georgium sidus* (la planète d'Herschel). Annonce du mouvement retrograde de ceux déjà découverts ; & explication de la cause qui les fait paroître à certaines distances de la Planète. Par W. HERSCHEL, &c. (Tiré des *Trans. Phil.* pour 1798. Part. I.)

ON croiroit , aux découvertes nombreuses & belles qui ont illustré le nom d'HERSCHEL , que cet Astronome , indépendamment des talens qui le distinguent comme observateur , jouit d'un ciel pur & d'un climat favorable : on seroit dans l'erreur. La Nature , qui lui donna beaucoup , mais qui ne cumule jamais ses dons sans mesure , lui a refusé ce dernier bienfait. Nous tenons de lui-même , que déduction faite des nuits d'été , des crépuscules plus ou moins longs , des clairs de lune , & de toutes les chances atmosphériques , il ne lui reste qu'environ quatre-vingt-dix heures d'observation proprement dite sur une année : comment fait-il donc pour employer un temps aussi court avec tant de profit pour la science ? Voici son secret.

Sciences & Arts, Vol. 9, N°. 2, an VII,

G

Il épie avec une vigilance soutenue tous les instans favorables ; & ses instrumens étant très-variés , il choisit dans chaque occasion , ceux qui conviennent plus particulièrement à la circonstance atmosphérique dans laquelle il se rencontre. Il arrive à son télescope l'imagination calme ; il réunit en quelque sorte , tous ses sens , toutes ses forces , dans ses yeux seuls ; il cherche uniquement à *voir* , à *décrire* exactement ce qu'il voit. Il dicte à mesure ; Caroline Herschel sa sœur écrit fidèlement sous sa dictée ; elle enrégistre les apparences , certaines , douteuses , & jusqu'aux soupçons vagues. Les instrumens , l'observateur , le secrétaire ne forment pour ainsi dire , pendant toute la durée d'une belle nuit , qu'une seule machine à perceptions , à laquelle rien n'échappe , & qui peut tout retracer.

Nous avons vu ces registres : ils forment des volumes , des trésors de faits qu'aucun préjugé , aucune prédilection n'a influencés , & sur lesquels le génie peut méditer ensuite dans les heures tranquilles : là reposent les germes des découvertes , jusqu'à ce que d'heureux rapprochemens leur donnent l'existence ; là , lorsqu'Herschel ne sera plus , lorsque le temps aura détruit ses instrumens admirables , les Astronomes en possession de ces recueils pourroient voir encore avec ses yeux , se former à son école , & faire , par des combinaisons qui

Déc. DE 4 NOUV. SATEL. D'HERSCHEL. 179

lui avoient échappé de son vivant, comme des *découvertes posthumes*, qui honoreroient encore sa mémoire. — Mais écoutons l'exposé qu'il fait lui-même de celles que nous venons d'annoncer.

« Occupé, comme je l'ai été depuis quelque temps, dit-il, à perfectionner mes tables des mouvemens des satellites du *Georgium sidus*, je fus dans le cas de calculer de nouveau toutes les observations que j'en avois faites. En parcourant la série entière de ces observations depuis l'année où ils furent découverts (1787) jusqu'au temps présent, je les trouvai tellement étendues, surtout dans une classe particulière, que je résolus de faire de celle-ci l'objet d'un examen attentif. »

« Ces observations ont rapport à la découverte de quatre nouveaux satellites; à des soupçons sur l'existence d'un grand & d'un petit anneau appartenant à cette planète & situés à angles droits l'une de l'autre; au degré de lumière & à la grosseur de ces satellites; enfin à leur disparition lorsqu'ils se trouvent à une certaine distance de la planète. »

« Je fus fort aidé dans ce travail par une suite de théorèmes faciles, que j'avois imaginés pour calculer toutes les particularités relatives aux mouvemens des satellites; comme, par exemple; étant donné l'angle de position, trouver la longitude du satellite, ou *vice versa*; étant donnés l'angle de position & la longi-

tude, trouver l'inclinaison de l'orbite, l'apogée, la plus grande élongation, &c. J'avois encore calculé des tables de réduction de la position du point de la plus grande élongation, & de la distance de l'apogée, ou de l'ouverture de l'ellipse : j'avois aussi trouvé moyen d'employer ce globe ordinaire d'une manière expéditive pour contrôler les calculs de ce genre. Je fis disparaître par ces procédés beaucoup de difficultés qui m'avoient précédemment embarrassé.

» J'étois en état, au moyen de ces tables & de ces théorèmes, d'examiner les observations qui pouvoient se rapporter à de nouveaux satellites; d'après la supposition que leurs orbites étoient dans le même plan, que celles des deux satellites déjà connus, & que la direction de leur mouvement étoit aussi la même. »

» Je dois annoncer à cette occasion, que le mouvement des satellites du *Georgium sidus*, est rétrograde. »

» C'est ici un exemple remarquable de la grande variété qui existe dans les mouvemens des corps célestes. On avoit remarqué jusques à présent; que toutes les planètes & tous les satellites du système solaire se mouvoient dans le même sens & selon l'ordre des signes : les rotations même, soit les mouvemens diurnes tant des planètes principales, que du soleil & de six des planètes secondaires, s'exécutent dans la même direction; mais voici deux corps cé-

DÉC. DE 4 NOUV. SATEL. D'HERSCHEL. 101
lestes assez considérables, qui se meuvent dans un
sens retrograde. »

» Je reviens à l'examen des observations mê-
lées, dont le résultat est assez important &
fera l'objet de ce mémoire. Elles prouveront
l'existence de quatre satellites additionnels à
notre nouvelle planète. Les observations qui
tendent à établir l'existence d'anneaux autour
de son disque ne paroissant pas assez positives,
il faudra, ou rejeter en entier les soupçons con-
çus à cet égard, ou chercher seulement à les
vérifier, lorsqu'on aura en main des instrumens
plus puissans. On verra aussi le phénomène
remarquable de la disparition des satellites, &
la cause de cette disparition sera indiquée. »

» Je rapporterai d'abord les observations qui
appuient ces conclusions ; j'y joindrai quelques
courts argumens qui montreront que mes ré-
sultats découlent immédiatement des faits
observés. »

» Pour être plus clair, je classerai les obser-
vations sous trois différens chefs : je commen-
cerai par celles qui se rapportent à la découverte
des nouveaux satellites. »

» Je ne ferai que rapporter un grand nom-
bre d'observations sur de prétendus satellites
que je trouvois ensuite être des étoiles, ou
dont je ne pouvois déterminer l'espece, faute
d'un temps assez clair : car, entrer dans la des-
cription détaillée de chacune de ces apparen-

ces, ou retracer les figures destinées à les faire reconnoître, ce seroit perdre du temps sans utilité pour l'objet qui nous occupe maintenant. Je dois avertir cependant qu'à l'égard des observations qui sont ici simplement *rapportées*, on a pris à-peu-près les mêmes précautions que dans celles dont on lira le détail extrait en nature du journal lui-même. Les premières seront données sous le titre de *Rapports*, les dernières sous celui d'*Observations*.

RECHERCHE DE NOUVEAUX SATELLITES.

Rapport.

Sans entrer ici dans les détails que renferme le mémoire, nous dirons seulement que le premier de ces *Rapports* date du 6 février 1782. Le Dr. Herschel commença ce jour-là à soupçonner qu'une très-petite étoile voisine de la planète étoit un satellite; mais cette étoile ayant conservé sa position le 7 & le 8 février le soupçon fut détruit. Après avoir donné d'autres *Rapports* analogues, jusques à la date du 1 novembre 1784, l'auteur nous dit que son télescope (alors sous la forme newtonienne) ne lui paroissant pas assez puissant pour ce genre de recherches, il les abandonna en partie. Mais il ajoute que le gain de lumière qu'il fit en introduisant sa méthode particulière d'observer, dans laquelle il a supprimé le second mi-

DÉC. DE 4 NOUV. SATEL. D'HERSCHEL. 103
roir, (1) lui donna bientôt les moyens de
le reprendre avec plus de succès. Voici le *Rap-
port* du 14 janvier 1787.

» Janvier 11. 1787. On a observé trois sa-
tellites supposés ; un premier, un second &
un troisième. — Janvier 12, le premier & le
second ne se sont plus retrouvés dans l'endroit
où j'avois marqué leur place ; mais le troisième
y étoit encore & c'est, par conséquent, une
étoile fixe. »

Ces deux satellites étoient ceux-là même dont
la découverte fut plus positivement constatée
par des observations postérieures.

Tous les *Rapports* des années 1787—1789,
au nombre de 16, ne renferment que des soup-
çons de l'existence d'un troisième & quatrième
satellite ; soupçons détruits à mesure, par les
observations subséquentes.

Nous avons transcrit un *Rapport*, nous allons
donner une *Observation*, tirée de celles que ren-
ferme le mémoire ; on jugera de la méthode
de l'observateur.

» Mars 26, 1794. 9 heures 35' (temps
fidéral (2) avec l'oculaire qui grossit 480 fois,

(1) Voyez la description du Télescope d'Herschel,
T. I, *Sc. & Arts.* (R)

(2) Les astronomes Anglais employent pour l'ordi-
naire le temps fidéral ; c'est celui qui est indiqué par
la révolution diurne de la Terre rapportée, non au
Soleil, mais aux Etoiles fixes. Une horloge réglée sur

Je vois beaucoup mieux le premier satellite qu'avec l'oculaire 320. Je soupçonnois, avec celui-ci, un troisième satellite précisément au nord de la planète, un peu plus loin d'elle que le premier, & l'oculaire 480 vérifie presque mon soupçon (voyez fig. 5). »

» 9 heures 44'. Avec l'oculaire qui grossit 600 fois je conserve le même soupçon, mais je ne puis me satisfaire sur la réalité. »

» 11 h. 32'. Je vois actuellement très-bien le troisième satellite supposé. Il est beaucoup plus petit que le premier & sur la même ligne que celui-ci & la planète; en sorte que c'est probablement une étoile fixe, puisque lorsque je l'ai vu la première fois, il précédoit le premier d'une quantité plus considérable que celle que le mouvement plus rapide du premier satellite pourroit expliquer. Si c'est une étoile fixe, elle forme avec q & r un triangle presque rectangle, dont le petit côté est $3r$; ou bien elle se trouve presque sur la même ligne avec q & n . »

» NB. Les lignes sont indiquées plus juste dans la description qu'elles ne le sont dans la figure; celle-ci n'est destinée qu'à désigner les étoiles dont il est question. »

le temps sidéral indique toujours la même heure lorsque la même étoile passe au méridien; & marque 12 heures lorsque l'un ou l'autre équinoxe y arrive. Elle avance tous les jours d'environ 3'. 56", sur le temps solaire moyen, (R)

DÉC. DE 4 NOUV. SATEL. D'HERSCHEL. 705

» Mars 27. 8 heures 37' oculaire 320. La même petite étoile que j'ai observée la nuit dernière à 11 heures 32' a disparu de la place où je l'avois vue. D'après la lumière qu'elle avoit alors, comparée à *r* qui est, ce soir, très-voisine de la planète & à peine visible, je suis certain qu'elle devoit être assez brillante pour être apperçue immédiatement si elle étoit dans le lieu désigné par ma description. »

» 10 heures 20': La planète est fort éloignée de l'étoile *r*. »

» 11 h. 41'. J'ai entrevu plusieurs petites étoiles, ou satellites supposés: l'un d'eux dans un lieu qui s'accorde avec le troisième satellite de la nuit dernière (en supposant qu'il eût fait route avec la planète) c'est-à-dire qu'il est un peu plus éloigné, & après le premier: un autre en avant du premier mais plus près: quelques autres au sud, à une bonne distance. Mais je n'ai pu en voir aucune d'une manière suivie; j'entrevois seulement par intervalles des points lucides. »

Après avoir donné textuellement celles d'entre les pièces tirées de ses registres qui peuvent, par leurs rapprochemens, faire découvrir ce qu'il cherche, l'auteur les discute, & voici comment il raisonne.

» D'après la comparaison des *Rapports* d'un grand nombre de satellites supposés, avec les *Observations* choisies & transcrites dans leur

entier, on doit voir avec évidence que la méthode de chercher les objets difficiles à apercevoir & de les désigner par des lignes & des angles, en y ajoutant toutes les circonstances particulières qui pourront les faire retrouver, que cette méthode, dis-je, a été pratiquée dans toute son étendue. Ainsi en garde contre les illusions, nous devons convenir que l'action d'entrevoir seulement une très-petite étoile, est déjà un argument assez fort en faveur de son existence. Ce que j'appelle ensuite *vérifier un soupçon*, (ce que je fais d'ordinaire en employant un oculaire plus fort que celui avec lequel le soupçon a pris naissance) c'est obtenir une perception plus durable de l'objet en question; c'est-à-dire, le voir de manière à pouvoir fixer l'œil sur l'objet, le comparer à d'autres objets environnans, & établir ainsi d'une manière précise & satisfaisante sa position relative. »

En discutant, d'après ces principes, les observations dont il a donné les détails, l'auteur établit l'existence 1°. d'un satellite *intérieur*, c'est-à-dire plus voisin de la planète principale que ne le sont l'un ou l'autre des deux satellites qu'il avoit découverts en 1787: c'est surtout l'observation du 5 mars 1794 qui lui paroît concluante à cet égard; & celle du 27 du même mois achève de lever tous les doutes. 2°. D'un satellite *intermédiaire*, c'est-à-dire dont l'orbite est placée entre celles des deux anciens

satellitès. 3°. D'un satellite *extérieur* à ceux-ci ;
4°. Enfin d'un satellite le plus éloigné de tous,
découvert le 28 février 1794, & confirmé le
27 mars 1794, & le 28 mars 1797.

» Si j'ai autant tardé, dit le célèbre Astro-
nome, à publier ces observations, ce n'est pas
que j'eusse la moindre incertitude sur l'existence
de ces deux satellites, mais c'étoit seulement
dans l'espérance de pouvoir donner en même
temps quelques détails ultérieurs sur leurs ré-
volutions périodiques. Il n'étoit point satisfai-
sant pour moi d'annoncer un satellite, à moins
que je ne pusse en même temps marquer plus
précisément la place où d'autres astronomes
pourroient le rencontrer ; mais comme il
s'est écoulé maintenant plus de temps que je
ne m'en étois accordé pour terminer la théorie
de ces astres secondaires, j'ai cru devoir ne
pas différer plus long-temps l'annonce de leur
existence. »

» Voici donc la disposition relative des qua-
tre nouveaux & des deux anciens satellites. »

» 1°. Le satellite intérieur. 18 janvier 1790. »

» 2°. Le second (le plus voisin de la pla-
nete entre les deux anciens) 11 janvier 1787. »

» 3°. Le troisième. Intermédiaire. 26 mars
1794. »

» 4°. Le quatrième. Le plus éloigné des deux
anciens. 11 janvier 1787. »

» 5°. Le cinquième. Extérieur ; 9 février 1790. »

» 6°. Le sixième. Le plus éloigné de tous.
28 février 1794. »

La seconde partie du Mémoire que nous avons sous les yeux est intitulée « *Observations & Rapports relatifs à la découverte d'un ou plusieurs anneaux appartenant au *Georgium sidus* & à l'applatiffement de ses régions polaires* » nous choisissons quelques-unes des *Observations*, dans lesquelles on trouvera le pour & le contre.

» Novembre 13. 1782. Téléscope de 7 pieds. oculaire 460. Je ne vois aucun aplattissement vers les régions polaires. »

» Avril 8 1783. Je soupçonne un aplattissement. »

» Février 4. 1787. Téléscope de 20 pieds. oculaire 300. Le disque bien terminé. Aucune apparence d'anneau. Crépuscule très-fort. »

» Mars. 4. Je commence à soupçonner que la planète n'est pas ronde. Lorsque je la vois le plus distinctement elle paroît avoir deux pointes doubles & opposées. Peut-être un double anneau, c'est-à-dire deux anneaux à angles droits. » &c.

» Après avoir revu fréquemment cette apparence, ou quelque chose d'analogue, l'auteur découvre enfin le 26 février 1792 qu'elle est due à une illusion optique provenant d'une cause extérieure. Voici son observation finale à cet égard.

» Mars 5. 1792. Je viens d'observer le *Georgium sidus* avec un miroir nouvellement poli &

DÉC. DE 4 NOUV. SÂTEL. D'HERSCHEL. 109
d'une figure excellente. La planète m'a paru bien terminée & sans aucun soupçon d'anneau. Je l'ai vue successivement avec des oculaires de 240, 300, 480, 600, 800, 1200, & 2400, tous ces foyers étoient très-distincts; & je suis assez convaincu que le disque est aplati. La lune étoit assez voisine de la planète. »

Il termine la discussion sur cette classe d'observations par les réflexions suivantes.

« Sans entrer plus avant, dit-il, dans un sujet nécessairement enveloppé d'incertitude, j'ajouterai seulement, que l'observation du 26 me paroît très-décisive contre l'existence d'un anneau. Lorsque je formai ce soupçon pour la première fois, je crus convenable de supposer que la position de cet anneau pouvoit être telle qu'il en devint presque invisible, & qu'en conséquence il ne falloit pas abandonner les observations, jusqu'à ce qu'il se fût assez écoulé de temps pour qu'on pût obtenir une position plus favorable à mesure que la planète s'éloigneroit de son nœud. Dix ans d'intervalle ont dû suffire à cet égard; car, quelle qu'eût été la situation de l'anneau, pourvu qu'elle fût demeurée la même, on auroit dû le voir avec plus ou moins d'avantage. Accordant donc une grande confiance à l'observation du 5e. mars 1792 confirmée par celles que j'ai faites depuis, j'ose affirmer que la planète n'a aucun anneau qui ressemble le moins du monde à celui, ou plutôt à ceux de Saturne. »

» L'aplatissement de la planète vers ses pôles paroît suffisamment prouvé par plusieurs observations. Le télescope de 7 pieds, celui de 10 pieds & celui de 20 pieds le confirment également; & la direction désignée dans l'observation du 26 février 1794 paroît s'accorder avec ce qu'on pourroit conclure par analogie tirée de la position de l'équateur de Saturne & de celui de Jupiter. »

» Si l'on admet cet aplatissement, on peut en inférer sans hésiter, que le *Georgium sidus* a aussi une rotation sur son axe & que cette rotation est très-rapide. »

La troisième partie du Mémoire porte le titre de « *Rapports & Observations sur la lumière & la grosseur relative des satellites du Georgium sidus & sur leur disparition à certaines distances de la planète.* »

Il résulte effectivement de ces extraits du Journal des Observations, que ces satellites sont tantôt visibles & tantôt invisibles, abstraction faite des circonstances atmosphériques qui peuvent avoir à cet égard de l'influence. Voici quelques-unes des réflexions de l'auteur sur ce sujet.

« On a vu d'après un grand nombre d'observations que toutes les étoiles très-petites perdent beaucoup de leur lustre lorsqu'elles se trouvent dans le voisinage de la planète. — On fait bien en général qu'une lumière plus forte

DEC. DE 4. NOUV. SATEL. D'HERSCHEL. 111
semble éteindre une lumière plus foible. Mais il y a certaines circonstances qui accompagnent l'action de la lumière sur l'organe de la vue lorsque les objets sont à peine perceptibles; ces circonstances sont si remarquables qu'on ne doit point les passer sous silence. »

• Après m'être accoutumé à suivre les satellites de Saturne & de Jupiter jusques au bord même de leur planète, jusqu'au point de mesurer le diamètre apparent de l'un des satellites de Jupiter par son entrée sur le disque (1), j'espérois qu'une occasion semblable se présenteroit pour le *Georgium sidus*, non pas, à la vérité, pour mesurer les satellites; mais la planète elle-même, au moyen du passage du satellite sur son disque. Je me flattois aussi d'établir les époques des satellites, d'après leurs conjonctions & leurs oppositions, avec plus d'exactitude que je n'avois pu le faire en les observant dans d'autres points de leurs orbites; la cause qui m'a empêché de réussir à ces divers égards mérite d'être approfondie. »

• Nous pouvons remarquer que les satellites disparaissent régulièrement lorsqu'après leur plus grande élongation ils se trouvent à une certaine distance de la planète. »

• Ici l'auteur discute quelques-unes de ses observations pour rechercher quelle est la distance

(1) Phil. Trans. pour 1797. Part. II. p. 335.

à laquelle cette disparition a lieu , & il trouve que le premier satellite ne s'apperçoit plus , pour l'ordinaire , lorsqu'il se trouve à 18" de distance apparente de la planète ; & le second , à la distance d'environ 20 secondes. Dans des nuits très-belles & très-rares , le premier a été apperçu une fois à la distance de 13",8 & le second à 17",3. Mais dans aucun temps on ne les a vus plus près.

Pour expliquer ce fait , l'auteur rejete d'abord la supposition qui l'attribueroit à l'effet de quelque atmosphère dense qui appartiendrait à la planète & intercepteroit la lumière des satellites ; car cette lumière paroît se perdre également lorsque le satellite est dans la portion antérieure de son orbite , ou en deçà de cette prétendue atmosphère. Voici comment il raisonne ensuite sur ce qu'il croit être la véritable cause de la disparition.

« La lumière de Jupiter ou de Saturne , dit-il , à raison de son éclat , est répandue d'une manière presque uniforme dans un espace de plusieurs minutes autour de ces planètes. Leurs satellites aussi , ayant une lumière assez brillante & se mouvant dans une sphère assez complètement illuminée , ne peuvent pas être fort affectés par leurs diverses distances de leur planète principale. Ils ont beaucoup de lumière à perdre & n'en perdent comparativement que peu. »

» Mais , au contraire , le *Georgium sidus* est très-

très-peu lumineux, & l'influence de sa foible lumière ne peut s'étendre autour de cette planète avec une certaine égalité. Cette circonstance nous permet de voir les objets les moins lumineux lors même qu'ils ne sont qu'à une minute ou deux de distance de la planète. Ses satellites sont à-peu-près les objets les moins lumineux qu'on puisse appercevoir dans la voute céleste, en sorte qu'ils ne peuvent supporter aucune diminution notable de leur lumière par l'effet du contraste avec un objet plus lumineux, sans disparaître. Si donc la sphere d'illumination de notre nouvelle planète est limitée à 18 ou 20'', nous pouvons très-bien expliquer pourquoi les satellites disparaissent lorsqu'ils arrivent à cette distance, car ils ont très-peu de lumière à perdre & ils la perdent d'une manière assez soudaine. »

» On peut se prévaloir des observations faites sur la distance à laquelle disparaissent les divers satellites, pour déterminer leur lumière respective. Le second satellite paroît, en général, plus brillant que le premier; mais comme le premier de ces deux disparoit d'ordinaire plus loin de la planète que ne le fait l'autre, nous pouvons admettre que le premier satellite est réellement plus brillant que le second. On ne verra gueres le premier des nouveaux satellites que vers les plus grandes élongations. Il ne paroît pas être fort inférieur en lustre aux deux

autres; & s'il existoit quelques autres satellites intérieurs on ne les verroit probablement pas; par la même raison pour laquelle les habitans du *Georgium fidus* ne découvriront peut-être jamais l'existence de notre Terre, de Vénus & de Mercure. »

» Le second des nouveaux satellites, celui qu'on a nommé intermédiaire, est beaucoup plus petit que l'un ou l'autre des anciens satellites. Les deux extérieurs, soit le 5^e. & le 6^e. sont les plus petits de tous, & on doit les chercher surtout dans leurs plus grandes éloignations. »

L'auteur termine son Mémoire par une indication approximative des révolutions périodiques de tous les satellites. Elle est tirée des rapports observés entre leurs distances apparentes à la planète dans leurs plus grandes éloignations. Il avertit soigneusement que ces déterminations ne sont encore que des *à-peu-près*, jusqu'à ce que les observations aient été multipliées. Voici ces périodes.

	Jours	heur.	min.
Le nouveau Satellite intérieur aux deux anciens.	5.	21.	25.
intermédiaire.	10.	23.	4.
extérieur le moins éloigné.	38.	1.	49.
le plus éloigné de tous.	107.	16.	40.

P H Y S I Q U E.

AN ACCOUNT OF CERTAIN MOTIONS, &c.

Description de certains mouvemens que de petites mèches allumées & nageant dans un bassin d'huile acquierent spontanément. Observations sur les phénomènes qui tendent à expliquer les principes desquels dépendent ces mouvemens, par P. WILSON, Professeur d'Astron. à Glasgow, membre de la Société Royale d'Edimbourg. (Tiré des *Transactions de cette Société* Tom. IV.)

IL y a ceci de particulier dans les observations de Physique, c'est qu'on ne peut apprécier chacune d'elles, ni prévoir son influence, au moment où elle se présente : les plus brillants résultats sont souvent cachés sous des faits en apparence minutieux. Il y a loin sans doute de l'attraction d'un morceau de fer par une pierre, à la découverte d'un monde nouveau ; de la chute d'une pomme dans un verger, aux grandes loix qui régissent le système planétaire ; du mouvement d'un brin de paille, aux appareils qui commandent le tonnerre ; de l'effervescence d'un acide versé sur un métal, à ces superbes aérostats qui transportent l'homme dans les airs ;

cependant ces découvertes si disparates étoient intimément associées; elles formoient , deux à deux , les extrémités d'une série qui n'eût pas existé si son premier & presque'imperceptible chaînon n'eût pas existé lui-même. Ainsi un fait nouveau est , pour un Physicien , comme un billet dans une loterie où il joue à coup sûr , & où les lots deviennent des billets à leur tour ; car une découverte conduit à une autre , par les rapports innombrables qui lient tout l'ensemble des événemens naturels.

Qui sait donc où nous conduira peut-être la petite lampe flottante du Dr. WILSON ? Il communique cette découverte dans une lettre à John PLAYFAIR son collègue dans la Société Royale d'Edimbourg , le même dont nous avons analysé le beau travail sur l'Astronomie des Brahmines. Nous allons donner cette lettre à - peu - près textuellement.

« Les phénomènes dont je vais parler , dit l'auteur , m'étoient entièrement nouveaux il y a quelques mois , & je ne crois pas que personne y ait jamais fait attention , ou les ait décrits. Ce que j'appelle la *lampe hydrostatique* , n'est autre chose qu'une petite rondelle de papier ordinaire à écrire , d'environ $\frac{3}{4}$ de pouce de diamètre , portant au centre une mèche de coton filé , d'environ un quart de pouce de long : cette mèche est enfilée dans un trou pratiqué au centre du papier. Ce petit appareil acquiert ,

lorsque la mèche est allumée & qu'il surnage dans de la très-bonne huile, certains mouvemens dont j'ai cherché à étudier la nature & la cause. »

» Un bassin de verre peu profond & cylindrique est commode pour faire ces expériences. A l'instant où la lampe est allumée, elle se meut assez rapidement dans une direction quelconque jusqu'à ce qu'elle rencontre les parois du vase; elle prend ensuite un mouvement circulaire, en s'appuyant toujours contre ces parois, & elle fait ainsi un grand nombre de révolutions. »

» Quelquefois cette circulation se fait de droite à gauche, d'autrefois dans la direction opposée, selon que le point de la circonférence du papier qui a toujours été à l'avant dans la navigation libre & directe, se trouve un peu à la droite ou à la gauche du point de cette même circonférence qui est en contact avec les parois du vase. On peut observer cette tendance dans ce que j'appellerois volontiers le *point directeur* de la base, en remarquant la rotation partielle de la lampe autour de la mèche comme sur un axe, dès qu'elle arrive contre les bords du vase. Quelquefois, mais rarement, le point directeur lui-même s'attache aux parois, & forme là comme un *lien* par l'effet bien connu de l'attraction capillaire qui agit en élevant le liquide à la fois contre la lampe & contre les côtés du vase : lorsque ce lien correspond ainsi au point

directeur, la lampe cesse de se mouvoir & paroît n'avoir plus aucune tendance à circuler. »

» Lorsque la petite mèche est placée un peu excentriquement sur sa base, la lampe se meut de manière que la partie de la base qui se trouve la plus voisine de la mèche devient l'arrière ; & si la base est coupée de forme ovale & que la mèche, soit placée excentriquement sur le grand axe, l'extrémité de la base qui est la plus voisine de la mèche est postérieure aussi, lorsque la lampe traverse spontanément le bassin. De même, si la base est un triangle équilatéral & que la mèche, soit placée dans la perpendiculaire abaissée d'un angle sur le côté opposé, le sommet de cet angle ou la base seront en arrière selon que la mèche sera placée auprès de l'un ou de l'autre. Les lampes ainsi disposées circulent aussi à leur arrivée contre les bords du vase, quand le point directeur est situé à l'opposite, ainsi que cela arrive d'ordinaire. »

» Quelle que soit la cause qui fait mouvoir la lampe droit en avant, la circulation perpétuelle qui a lieu dès qu'elle atteint les parois, semble provenir de la force qui avoit mis l'appareil en mouvement, & qui continue à agir, mais dans une direction inclinée à celle de l'attraction capillaire qui forme le *lien* : & il est évident que cette inclinaison sera plus grande ou moindre, selon que le point directeur sera plus ou moins éloigné du vase. Lorsque le point

directeur & le lien coïncident , il sembleroit que ces deux forces devroient pousser la lampe dans une direction perpendiculaire au côté du vase , & dans ce cas, elle doit devenir immobile. C'est ce qu'on observe effectivement. »

» J'ai eu l'occasion de remarquer ensuite que lorsque la lampe prend son mouvement rectiligne , il paroît y avoir une répulsion très-active entre sa partie postérieure & l'huile qui lui est contigue. Cet effet est très-visible lorsqu'on a préalablement répandu un peu de poussière de charbon sur la surface de l'huile. A mesure que la lampe chemine , elle laisse une plage derrière elle entièrement dégagée de poussière , parce que les particules sont chassées en arrière & latéralement avec un mouvement plus rapide que celui qui résulteroit du simple déplacement du mobile. »

» Je desirois éprouver comment se feroit la dispersion de la poudre de charbon , dans le cas où la lampe seroit stationnaire. Je construisis , dans ce but , une lampe avec une oublie à cacheter très-mince ; j'y adaptai une mèche excentrique faite d'un fil de coton doublé ; & pour empêcher que mon appareil ne prit feu , je garnis d'une feuille d'or sa surface supérieure. Lorsqu'on maintenoit cette lampe d'une manière fixe à la surface de l'huile , la poussière se retiroit dans toutes les directions & laissoit l'espace autour de la lampe parfaitement nettoyé. Mais

on pouvoit observer que cette dispersion de la poussière par l'effet de la répulsion apparente de la base de la lampe, étoit beaucoup plus rapide du côté le plus voisin de la mèche qu'elle ne l'étoit partout ailleurs, & surtout, du côté diamétralement opposé à celui-là. »

» Les circonstances dont on vient de faire mention paroissent expliquer suffisamment & le mouvement progressif de la lampe, & la loi générale de ce mouvement telle qu'on l'a décrite tout-à-l'heure. Car en considérant cette dispersion de la poussière seulement sous un point de vue général, & comme étant l'effet de quelque répulsion entre la base & l'huile qui la touche, les faits qu'on vient de rapporter indiquent clairement que, dans tous les cas, cette répulsion est la plus forte dans cette partie de la base qui est la plus voisine de la mèche ou de la flamme. Et comme l'action & la réaction sont toujours égales, & en sens opposé, la lampe doit être poussée dans la direction d'une ligne tirée au travers de la mèche vers la partie de la base qui en est la plus éloignée & où la réaction est la moindre. »

» Mais pour obtenir une connoissance plus complète de la cause physique de ces mouvements, il me sembloit nécessaire de faire quelques recherches plus particulières sur cette répulsion apparente qui s'exerce entre la base de la lampe & l'huile environnante, telle qu'elle

est annoncée par la dispersion de la poussière dont on a parlé : & ici les considérations suivantes vinrent s'offrir. »

» L'huile , tranquille dans un bassin , & d'une température uniforme , a toutes ses parties dans un état d'équilibre & de repos. Lorsqu'on allume la lampe , il est évident qu'on introduit une cause très-active qui tend à détruire cet équilibre : cette cause est la flamme qui s'alimente d'une partie de l'huile , & qui n'en est séparée que par une feuille de papier ou un pain à cacheter. L'huile , dans ces circonstances , à raison de la chaleur violente qu'elle éprouve doit se dilater subitement , & sa pesanteur spécifique se trouvant ainsi diminuée elle doit être soulevée par une force suffisante pour élever une partie de ce liquide au-dessus du niveau du reste. Mais cette portion chauffée , rencontrera , dans son effort pour se soulever , une résistance égale au poids de la lampe qui repose dessus , ce qui la forcera à s'échapper en glissant de dessous la base sous la forme d'un courant superficiel très-mince ; il paroît suivre de-là avec une égale certitude , que ce courant constant coulera le plus volontiers & le plus abondamment vers le côté de la base de la lampe où la résistance est la moindre , ou là où il y a le moins de chemin à faire pour pousser en avant ; c'est-à-dire depuis la mèche ou la flamme vers le bord de la base

qui se trouve le plus voisin , & c'est effectivement ce qui a lieu. Mais , d'après les lois du mouvement , il est certain que la réaction de ce courant d'huile raréfiée , sortant ainsi avec rapidité & abondance d'un côté particulier de la base doit pousser la lampe dans la direction contraire & la faire mouvoir dans celle qu'on lui la vu prendre. On peut encore remarquer que l'huile échauffée , en se retirant ainsi de dessous la flamme & cherchant à s'élever au-dessus du niveau commun , à raison de la diminution de sa pesanteur spécifique , peut soulever plus ou moins le côté de la base le plus voisin de la mèche , & aider à la réaction du courant qui recule en faisant voguer la lampe dans une direction opposée & pour ainsi dire le long d'un plan incliné. »

» Les faits suivans paroissent prouver d'une manière indubitable que l'huile raréfiée sous la base a réellement une tendance constante à s'élever au-dessus du niveau commun : savoir , 1°. lorsqu'une des lampes a brûlé pendant quelque temps & que sa base est bien garnie d'huile , si on éteint sa flamme , elle s'enfonce incontinent. 2°. Une lampe dont la base est faite d'une lame mince de talc vogue très-bien malgré sa pesanteur spécifique jusqu'à-ce que sa flamme soit éteinte : alors elle s'enfonce immédiatement. »

» En confirmation de l'explication que j'ai

tenté de donner , je trouvai que lorsqu'on produisoit à la surface de l'huile avec chaleur locale en approchant très-près de cette surface l'extrémité d'un fer obscurément rougi , on ne tar-
doit pas à voir une effluence qui rayonnoit de tous côtés en s'écartant du fer ; la poussière de charbon étoit chassée sous la forme d'un cercle qui s'étendoit de plus en plus jusqu'à ce qu'enfin toutes ses particules se trouvoient réunies contre les bords du bassin. »

» Lorsque l'huile , dans cette expérience étoit peu profonde , en mêlant à ce liquide des feuilles d'or réduites en paillettes , on pouvoit observer un courant inférieur qui se mouvoit dans un sens opposé au précédent , c'est-à-dire en se rapprochant du fer rouge dans toutes les directions , & en s'élevant ensuite. Mais cette tendance générale par laquelle toutes les parties du fluide se meuvent pour chercher l'équilibre , se prouve d'une manière assez récréative par l'expérience suivante. On prend une tasse ordinaire qu'on remplit , à-peu-près , d'eau pure on verse sur cette eau une petite cuillerée de bonne huile très-claire dans laquelle on a mêlé des paillettes d'or. Si l'eau est froide , l'huile versée lentement & de suite sur le centre du vase s'étend sur sa surface sous la forme d'une lentille & n'atteint pas les parois. Si l'on met sur cette lentille une petite lampe allumée , elle vogue en circulant comme elle le fait dans un plus grand

bassin. Si on la fixe un moment, on voit les paillettes continuellement chassées de la lampe vers les bords de la lentille, puis revenant ensuite par le fond jusques sous la lampe, où elles montent, puis sont entraînées de nouveau rapidement par le courant divergent supérieur, jusqu'à ce qu'arrivées à une certaine distance elles s'enfoncent & reviennent vers le centre (1).

» Lorsqu'une rondelle de papier, ou une oublie, ou un corps léger quelconque surnage à l'huile du bassin, si l'on en approche la pointe d'un fer chaud, ce corps quitte à l'instant sa place, & s'enfuit comme s'il éprouvoit une répulsion; mais, en réalité, par l'effet du courant divergent produit à la surface de l'huile par la chaleur qui lui est communiquée. »

» De même, si l'on jette sur de l'huile de térébentine, sur de l'éther, de l'alcool, ou l'un quelconque des fluides inflammables & légers, une oublie fort échauffée, elle se mettra tout de suite en mouvement jusqu'à ce qu'elle

(1) Cette expérience confirme la théorie par laquelle nous avons essayé d'expliquer un fait singulier observé par le Comte de Rumford; savoir, que lorsqu'on fait fondre du suif en plaçant un peu au-dessus de sa surface, un boulet rouge, le bassin de suif solide qui renferme la partie liquide, au lieu d'être de forme concave, est convexe au milieu. Voyez T. VIII. Sc. & Arts, p. 228 (R)

soit refroidie ; alors , le courant qui paroissoit sortir de l'oubli en abondance , cesse d'exister. D'autres liquides , tels que le rum , le suif fondu , la cire d'abeilles & la résine font aussi paroître une effluence continuelle à leur surface , par l'application locale de la chaleur , & on y observe les mêmes phénomènes qu'offrent les petites lampes allumées & nageant sur l'huile. Il est à remarquer cependant , que cette propriété semble appartenir à tous les fluides de nature inflammable , & qu'elle ne se manifeste point dans l'eau lorsqu'on applique une chaleur locale à sa surface. »

» Car si l'on approche un fer rouge vers la surface de l'eau d'un bassin , couverte de poussière de charbon , ces molécules ne fuient point comme elles le font lorsqu'elles surnagent à l'huile , mais elles paroissent seulement acquérir un mouvement circulaire lent & irrégulier qui s'étend peu-à-peu , tandis que ces mêmes molécules conservent à-peu-près leurs places relatives. La même chose arrive lors même qu'on fait arriver la pointe du fer jusqu'à l'eau , qu'on entend frémir au moment de l'immersion. »

» Je ne sais trop comment expliquer ce fait , à moins qu'il ne soit la conséquence de la moindre expansibilité de l'eau par la chaleur , comparée à celle des liquides inflammables ; sa dilatation peut être assez peu considérable pour ne point rompre l'équilibre & ne produire au-

cun mouvement dans le liquide sous le solide chaud qu'on approche. Il se pourroit encore , que les particules d'eau transmissent à leurs voisines l'excédent de chaleur qu'elles reçoivent, plus rapidement que ne le font les particules des fluides inflammables en pareilles circonstances , & qu'elles résistassent ainsi à acquérir la haute température nécessaire au degré d'expansion qui rompt l'équilibre & produiroit un courant divergent. Il n'est pas besoin de dire que le maximum de cette température ne peut dans aucun cas (sous la pression atmosphérique ordinaire) dépasser le terme de l'eau bouillante , soit le 212° degré du thermomètre de Fahrenheit. »

» Je ne pus douter cependant , que l'équilibre entre les molécules de l'eau ne fût troublé par l'application locale de la chaleur ; mais dans un degré beaucoup moindre qu'on ne l'observe dans les liquides inflammables : voici l'expérience qui me conduisit à ce résultat. Je fis nager sur l'eau une petite tasse, formant une lampe garnie d'huile , & dont la mèche étoit placée en dedans , un peu au-dessous du bord de la tasse , & de niveau avec l'eau extérieure. Cet appareil ainsi disposé acquéroit spontanément un mouvement , peu rapide il est vrai , mais dans lequel la partie de la lampe dont la flamme étoit la plus voisine , formoit toujours l'avant de la petite flottaison. La même tasse ,

MOUV. SPONT. DES MÈCHES ALLUM. 127

fortie de l'eau & mise à voguer dans un bassin rempli de fort rum , se mouvoit beaucoup plus vite , & selon la même loi. »

J'ai l'honneur d'être , &c.

PAT. WILSON.

P. S. « Si vous aviez l'intention de répéter quelques-unes des expériences, il faudroit donner quelqu'attention aux observations suivantes. Le fil de coton que j'employois pour les mèches étoit de cette espece fine & flexible dont on se sert pour broder la mouffeline. Après avoir percé la base de la lampe on passe dans le trou un bout de ce fil , on le coupe fort court par dessous & on force avec une épingle la bavure de la carte contre le coton pour qu'il se maintienne en place. On coupe ensuite le fil au-dessus , en laissant à la mèche une longueur d'environ un quart de pouce ; & la lampe est construite. On la pose doucement sur l'huile , en la tenant par la mèche , pour que la base de papier ne soit point tourmentée & conserve sa forme plane ; on touche la mèche avec une goutte d'huile & la lampe est prête à être allumée. Un bout de ficelle qu'on a préalablement trempée dans l'huile , est très-commode pour allumer & ne laisse rien tomber sur la surface comme le feroit une chandelle ou une bougie. »

» Pour que la lampe prenne un mouvement

de rotation bien décidé , il faut que l'huile soit très-pure , & en plein contact avec les parois du vase. L'huile & le bassin qui le renferme doivent être à la même température , entre 55 à 60 de Fahrenheit (11 & 12 $\frac{1}{2}$ R.) Car si une partie du bord du vase est de beaucoup plus chaude que le reste , la lampe , en y arrivant , abandonnera cet endroit , poussée par le courant qui semblera partir du lieu le plus échauffé. »

» Quelquefois la lampe en voguant dévie un peu de sa direction ordinaire , parce que la forte chaleur de la flamme fait voiler le papier , & changeant ainsi sa forme , rend le courant plus abondant dans certains endroits que dans d'autres. »

» On peut observer quelquefois dans le suif fondu qui environne la mèche d'une chandelle ordinaire , des atômes que les mouchettes y ont laissé & qui se meuvent continuellement en s'éloignant & se rapprochant de la flamme. Quelques Physiciens ont considéré ces mouvemens comme étant l'effet d'attractions & répulsions électriques. Il sembleroit plutôt qu'on doit les attribuer à des courans opposés qui ont lieu , dans la graisse fondue , à sa surface & immédiatement au - dessous ; ainsi qu'on l'a expliqué précédemment. »

O P T I Q U E.

AN OPTICAL PROBLEM, PROPOSED BY MR. HOPKINSON &c. Problème d'optique proposé par Mr. HOPKINSON, & résolu par Mr. RITTENHOUSE. (Tiré des *Transact. de la Société Américaine de Philadelphie* T. II.)

Nous avons occupé dernièrement nos lecteurs, des découvertes du Dr. Blair sur les propriétés de divers *milieux transparens* pour changer la direction de la lumière, & pour séparer les rayons diversement colorés. Cet auteur n'a touché qu'en passant à une faculté, qu'ont les *corps solides*, de fléchir & de décomposer aussi la lumière lorsqu'elle passe très-près de leur surface. Nous trouvons dans les *Transactions Américaines* un article assez curieux sur ce sujet : c'est la solution d'un problème d'optique suggéré par une expérience que chacun peut répéter & varier à volonté. Cette solution repose sur la propriété dont nous venons de parler, sur l'*inflexion* de la lumière ; & Mr. RITTENHOUSE, à qui l'on doit les développemens qu'on va lire, pouvoit aller de pair, par l'étendue & la profondeur de ses connoissances, avec les premiers savans d'Europe : la mort, qui l'a enlevé

Sciences & Arts, Vol. 9, N°. 2, an VII, I

il n'y a pas long-temps à l'Amérique, a causé à cette contrée une perte qui n'y sera peut-être pas réparée dans le cours d'un siècle.

LETTRE DE MR. HOPKINSON À MR.
RITTENHOUSE.

Mon cher Mr.

Je prends la liberté de vous demander de vouloir bien donner votre attention au problème d'optique suivant. Je le crois entièrement nouveau; sa solution pourra vous intéresser, & elle m'instruira sûrement.

J'étois sur la porte de ma maison, dans une soirée de l'été dernier. Je sortis de ma poche un mouchoir de soie, & après en avoir étendu une partie entre mes deux mains, je le tins verticalement devant mes yeux, en regardant, au travers du tissu, l'une des lampes de la rue, à la distance d'environ 100 verges. Je m'attendois à voir les fils de la trame du mouchoir fort grossis en apparence. Effectivement ils me parurent tels, & me sembloient être autant de gros fils d'archal; mais je fus très-surpris de trouver que, lors même que je faisois mouvoir le mouchoir à droite & à gauche, les petits barreaux noirs que représentoient ces fils ne se mouvoient point, mais demeuroient parfaitement fixes devant mes yeux. Si ces barreaux étoient l'effet de l'interposition des fils grossis,

SOLUTION D'UN PROBLÈME D'OPTIQUE. 131
entre l'œil & la lumière de la lampe, il sem-
ble qu'ils auroient dû se mouvoir & se succéder
l'un à l'autre à mesure que les fils eux-mêmes
passoient devant l'œil, mais il en arrivoit tout
autrement.

L'explication de ce phénomène surpasse mes
connoissances en optique. Veuillez répéter l'essai,
& s'il vous réussit, comme je n'en doute point,
vous m'obligerez fort en me donnant une so-
lution de ce problème, fondée sur des prin-
cipes physiques.

J'ai l'honneur d'être, &c.

RÉPONSE DE Mr. RITTENHOUSE.

Mon cher Mr.

L'EXPÉRIENCE dont vous parlez, faite avec
un mouchoir de soye & la flamme d'une lampe
éloignée, est beaucoup plus curieuse qu'on ne l'i-
magineroit d'abord. Car l'objet que nous voyons
n'est point le tissu du mouchoir, grossi en ap-
parence; mais c'est un objet très-différent,
ainsi qu'on peut l'inférer des considérations
suivantes.

1°. Des rayons paralleles ou à-peu-près, tels
que ceux qui viennent d'un objet distant, ne
peuvent former l'image distincte d'un objet
placé fort près de l'œil; car tous ces rayons,
passant par l'ouverture de la pupille se rassem-
bleront au fond de l'œil, & là, forment l'i-
mage du point lumineux. Les fils du mouchoir

n'ont d'autre effet que celui d'intercepter une partie des rayons , & de rendre l'image moins brillante.

2°. Si ces barreaux croisés que nous voyons étoient les images des fils de foye , ils devroient passer sur la rétine à mesure que les fils eux-mêmes passent devant la pupille ; mais cela n'arrive point , ainsi que vous l'avez observé ; car ils demeurent stationnaires.


3°. Si l'image sur la rétine étoit une peinture de l'objet placé au-devant de l'œil , cette image seroit plus ou moins fine ou grossière , à raison des changemens du tissu lui-même ; mais ni lorsqu'on employe un tissu plus ou moins grossier , ni lorsqu'on l'éloigne plus ou moins de l'œil , on ne produit aucun changement dans les apparences ; & le nombre des fils paroît le même soit qu'il en passe 10 , 20 , ou 30 devant la pupille dans le même temps. Il faut donc que l'image que nous voyons soit formée d'une manière très-différente ; elle doit être l'effet de cette *inflexion* qu'éprouve la lumière en passant près des surfaces des corps , & dont nous devons la découverte à Newton.

On démontre fort bien en optique que les différens points d'un objet placé à une certaine distance de l'œil , envoient à l'organe des rayons disposés en forme de pinceaux , inclinés les uns aux autres sous des angles sensibles , & qui rendus ensuite convergens par la force

SOLUTION D'UN PROBLÈME D'OPTIQ. 133

réfringente de l'organe se réunissent au fond sur la rétine & y forment l'image de l'objet. L'effet des lunettes d'approche consiste à augmenter ces angles régulièrement dans un certain rapport, & à faire en sorte que les rayons qui étoient parallèles avant d'entrer dans la lunette, le soient encore après l'avoir traversée. L'image agrandie que nous voyons dans cette expérience, doit donc être produite par des pinceaux de rayons qui, avant d'entrer dans l'œil, étoient considérablement inclinés l'un à l'autre. Mais comme ces rayons venoient de la flamme d'une petite lampe placée à une distance assez considérable, ils étoient à peu-près parallèles en arrivant sur le mouchoir de soye; c'étoient donc les fils de ce mouchoir qui leur donnoient des directions si différentes.

Avant que le tissu soit placé devant l'œil, les rayons de lumière parallèles formeront une seule tache brillante, comme en A, dans la figure ci-jointe; & une tache semblable sera



produite par ceux d'entre les rayons qui, passant par les intervalles du tissu, n'éprouveront point d'action de la part des fils qui le com-

posent. Mais supposons que les fils verticaux de ce tissu, par leur influence sur les rayons en fléchissent quelques-uns, d'un degré vers la droite & vers la gauche, & en fléchissent d'autres de deux degrés, il y aura alors quatre nouvelles images formées, savoir, deux de chaque côté de l'image primitive en A. Par une influence semblable de la part des fils horizontaux, cette ligne, composée de cinq points lumineux sera partagée en cinq autres lignes, savoir, deux au-dessus & deux au-dessous, ce qui formera un quarré de 25 taches brillantes séparées par quatre lignes obscures verticales & autant d'horizontales. Ces taches brillantes & ces lignes obscures ne changeront point de place lorsqu'on fera mouvoir le tissu devant l'œil, dans une direction parallèle à l'un de ces fils. Car le point de la rétine où tombera l'image, est déterminé par l'incidence des rayons relativement à l'axe de la vision, avant leur entrée dans l'œil, & non par la partie de la pupille qu'ils traversent.

Pour faire sur ce sujet des expériences plus exactes, je préparai un quarré d'environ $\frac{4}{2}$ pouce de côté, garni de cheveux tendus parallèlement les uns aux autres. Pour obtenir ce parallélisme je fis tarauder par un horloger deux fils de métal en vis à pas très-fins; il y en avoit 106 dans un pouce. Je mettois 50 à 60 cheveux dans chaque pas de la vis. Je regardois au travers

SOLUTION D'UN PROBLÈME D'OPTIQUE. 135

de cet appareil, une petite ouverture de $\frac{1}{20}$ de pouce de large & de 3 pouces de long, faite au volet d'une chambre obscure, en tenant les cheveux parallèlement à l'ouverture : je voyois trois lignes parallèles presqu'également lumineuses, & de chaque côté, quatre ou cinq autres lignes de plus en plus foibles, colorées & indistinctes, à mesure qu'elles s'éloignoient d'avantage de la ligne du milieu, que je savois être formée par les rayons qui passaient entre les cheveux sans éprouver leur influence. Ne trouvant pas mon appareil aussi parfait que je l'aurois désiré, j'enlevai les cheveux & j'en substituai d'autres un peu plus gros ; 190 faisoient un pouce, & par conséquent les intervalles entr'eux avoient environ $\frac{1}{250}$ de pouce de largeur. Les trois lignes lumineuses du milieu, n'étoient plus aussi brillantes qu'auparavant, mais les autres étoient plus fortes & plus distinctes, & j'en pouvois compter six de chaque côté de la ligne centrale, également distantes les unes des autres, en estimant ces distances depuis le centre de chacune au centre de sa voisine. La ligne du milieu étoit toujours bien terminée & sans couleur ; les deux suivantes étoient encore assez bien terminées mais un peu plus larges ; leurs bords intérieurs étoient colorés en bleu & les bords extérieurs en rouge. Les autres étoient moins distinctes & montraient chacune & dans le même ordre, les couleurs

prismatiques, qui en s'étendant de plus en plus, paroissent se toucher réciproquement vers la cinquième ou sixième ligne; mais celles qui étoient plus voisines du centre, étoient séparées les unes des autres par des lignes très-obscurès, beaucoup plus larges que ne l'étoient les lignes brillantes.

Trouvant que le rayon de lumière qui venoit du volet étoit ainsi divisé en un si grand nombre de pinceaux distincts, je voulus essayer de déterminer les angles que ces pinceaux faisoient entre eux. J'employai dans ce but, une petite lunette prismatique & un micrometre, que me prêta le Dr. Franklin. Je fixai mon cadre de cheveux parallèles, devant l'objectif, de manière à ce qu'il en occupât toute l'ouverture. Ensuite, en regardant dans la lunette, je mesurai l'espace entre les deux premières lignes de chaque côté, & je trouvai que la distance angulaire entre leurs bords intérieurs étoit de $13', 15''$. Et du milieu de l'une au milieu de l'autre, $15', 30''$; enfin l'angle entre leurs bords extérieurs étoit de $17', 45''$. Dans le premier cas, j'appercevois une trace légère colorée en bleu au milieu de l'objet, & dans le dernier, une ligne rouge. Les autres lignes étoient trop foibles, même vues au travers de la lunette, pour qu'on pût mesurer avec précision les angles qu'elles soutendoient; mais d'après quelques essais, il me parut, qu'en comptant de la seconde

ligne d'un côté, à la seconde du côté opposé, & ainsi de suite, ces angles étoient doubles, triples, quadruples, &c. des premiers.

On peut conclure de ces apparences, qu'une portion très-considérable du faisceau de rayons, passoit entre les cheveux sans éprouver de leur part aucune influence : qu'une autre portion moins considérable étoit fléchie d'environ $7' 45''$ de part & d'autre ; les rayons rouges un peu plus, & les rayons bleus un peu moins. Une autre portion encore moindre, se fléchissoit de $15' 40''$; une autre, de $23' 15''$; & ainsi de suite ; mais aucune portion sensible de lumière ne se fléchissoit sous un angle moindre de $6'$; ni aucun rayon de couleur particulière ne se dirigeoit sous un angle intermédiaire entre ceux produits par le doublement, le triplement, &c. de l'angle de flexion qui avoit lieu dans les premières lignes latérales.

J'observai avec surprise, que les rayons rouges fussent le plus détournés de leur direction primitive, & que les rayons bleus éprouvassent la moindre inflexion. Ce phénomène est contraire à ce qui a lieu dans la réfraction qu'éprouvent les rayons en passant obliquement d'un milieu dans un autre. Mais mon observation s'accorde avec celles qu'a faites Sir Isaac Newton, sur les franges qui bordent les ombres des cheveux & d'autres corps solides. Voici ses expressions. « Et, par conséquent, le cheveu, en produi-

fant ces franges agissoit de même & sur les rayons rouges ou les moins réfrangibles , à une plus grande distance ; & sur les rayons violets , ou les plus réfrangibles , à une distance moindre : & par ces influences il disperse le rayon rouge en franges plus larges & le rayon violet en franges plus étroites ».

En suivant ces expériences , il est probable qu'on feroit des découvertes intéressantes sur les propriétés de cette substance si étonnante , la lumière , qui anime toute la nature dans les yeux de l'homme , & qui le dispose peut-être plus qu'aucun autre bienfait à reconnoître la bonté de l'Etre qui l'a créé. Mais le défaut du loisir nécessaire me force à quitter le sujet.

Je suis mon cher Mr. &c.

D. RITTENHOUSE.

MATHÉMATIQUES.

OBSERVATIONS ON THE TRIGONOMETRICAL TABLES OF THE BRAHMINS. Observations sur les tables Trigonométriques des Brahmines, Par le Dr. PLAYFAIR, Prof. de Mathématiques à l'Université d'Edimbourg. Extrait des *Transactions de la Société Royale d'Edimbourg*, pour 1795.

LA Trigonométrie est une des parties des mathématiques qui a le plus contribué à leur perfection. Sans elle, l'arpenteur, réduit à se fier à l'adresse de ses mains & à la justesse de ses instrumens, ne pourroit exécuter que des opérations très-limitées. Sans elle, la géographie seroit encore remplie d'incertitudes & d'erreurs, la grandeur & la figure de notre globe seroient encore ignorées; le navigateur, privé des secours qui justifient son audace, ne sauroit se hasarder sans témérité à perdre les côtes de vue. Sans elle, l'astronomie seroit encore au berceau : & nous ne connoîtrions ni les espaces qui séparent de nous les corps planétaires, ni leurs distances respectives. Sans elle en un mot, presque toutes les parties des mathématiques, ou seroient encore à naître, ou seroient réduites à leurs premiers élémens.

Nous devons donc être bien moins surpris de trouver des traces de cette partie de la géométrie dans les annales les plus reculées des peuples qui ont cultivé les sciences exactes, & même dans leurs temps fabuleux, que nous ne devons l'être de voir son origine remonter chez les Grecs seulement, à un siècle environ avant l'ère-chrétienne.

Le Dr. PLAYFAIR, un des Professeurs les plus distingués de la célèbre Université d'Edimbourg, ayant médité le bel ouvrage de l'ingénieux & infortuné auteur de l'astronomie Indienne, s'étoit convaincu de la solidité des preuves qu'il donne de l'antiquité de cette science dans l'orient, & de l'étendue qu'elle y avoit acquise ; il les avoit rapprochées dans un beau mémoire lu en 1789 à la Société dont il est un des Membres les plus actifs. Ce travail lui fournit l'occasion d'étendre ses recherches sur les progrès des Indiens dans les mathématiques pures, & il a donné naissance au mémoire que nous avons sous les yeux. Nous espérons qu'il sera suivi d'autres dissertations, non moins intéressantes, & non moins propres à nous éclairer sur cette partie peu connue de l'histoire des sciences.

Le *Surya siddhanta* que le Dr. Davis vient de faire connoître dans les recherches sur l'Asie, est un des livres sacrés des Indiens produits par l'inspiration divine. Il en font remonter l'origine à leur âge d'or : savoir à trois ou

TRIGONOMÉTRIE DES BRAHMINES. 141

quatre millions d'années. Parmi les fictions dont est rempli cet ouvrage remarquable, il contient un système raisonné de calculs astronomiques, & les règles de la trigonométrie; science qui paroît bien éloignée des fictions de la fable, & des charmes de l'imagination poétique.

La division de la circonférence admise par les Indiens, est la même que la nôtre, & elle est aussi celle qui étoit en usage chez les Grecs. A l'avantage qu'à le nombre 360 d'admettre un grand nombre de diviseurs, & en particulier d'être divisible par les trois nombres premiers 2, 3, 5; se joint celui que le mouvement journalier & apparent du soleil s'éloigne peu d'être une 360^{me}. partie de la circonférence; peut-être même cette correspondance approchée a-t-elle donné lieu à notre division. Les Chinois, ayant plus d'égard à cette correspondance qu'à la facilité des calculs, ont divisé la circonférence en $365\frac{1}{4}$ parties égales dont chacune approche beaucoup de répondre au mouvement diurne. On fait que les avantages de la numération décimale, ont engagé les mathématiciens Français à l'introduire dans la division du cercle, & que déjà des tables sont construites d'après la division du quart de la circonférence en cent parties égales.

La construction des tables Indiennes les distingue d'une manière bien remarquable des tables

des Grecs & de celles des modernes. Les Grecs ont divisé le rayon en 60 parties égales, sans s'occuper de son rapport avec la circonférence. Delà, les cordes se trouvent exprimées en 60^{mes}. parties du rayon. Les modernes ont pris le rayon pour l'unité ou l'ont divisé en parties égales dont le nombre est exprimé par quelque puissance de 10. Dans les tables Indiennes, le rayon est exprimé en parties de la circonférence, de sorte que cette dernière étant divisée en 21600 minutes, le rayon se trouve exprimé par 3438. En partant des rapports approchés de la circonférence au diamètre, on trouve que le rayon vaut à-peu-près 3437 minutes & trois quarts, auquel nombre fractionnaire les calculateurs des tables Indiennes ont substitué le nombre entier le plus voisin 3438. Ce degré d'exactitude est le plus grand qu'on puisse obtenir, en poussant la division de la circonférence seulement jusqu'aux minutes. En particulier, il est plus grand que celui qu'on obtient par le rapport approché du diamètre à la circonférence, de 7 à 22, assigné par Archimede; & il approche beaucoup de celui de 113 à 355 assigné par Adrien Métius. On peut juger par ce rapport des progrès qu'avoient fait les Indiens dans la géométrie & dans le calcul.

Les tables Indiennes sont des tables de Sinus, elles different à cet égard d'une manière bien

TRIGONOMÉTRIE DES BRAHMINES. 143

essentielle des tables grecques qui contenoient les cordes. La substitution des Sinus aux cordes, a été jusqu'à présent attribuée aux Arabes : nous ignorons s'ils en sont les auteurs, ou s'ils n'ont fait que nous transmettre ce qu'ils tenoient des peuples orientaux.

Les tables Indiennes ne contiennent pas les tangentes & les secantes, dont l'introduction en Europe ne remonte qu'au milieu du seizième siècle. D'un autre côté : il est remarquable qu'elles comprennent les Sinus versés, dont on ne trouve aucune mention ni chez les Grecs ni chez les Arabes. Cet avantage au reste doit être regardé comme peu important ; vu la facilité avec laquelle se calcule le Sinus versé au moyen du cosinus.

L'étendue des tables Indiennes est bien moindre que celle des tables modernes. Le plus petit arc qu'elles comprennent est celui de $3^{\circ} 45'$ soit $225''$ qui est la vingt-quatrième partie du quart de la circonférence. Elles comprennent seulement les multiples de cet arc jusqu'à 90° . Leur étendue est donc limitée à 24 arcs qui croissent comme les nombres naturels : tandis que nos tables comprennent les Sinus des arcs au moins de minute en minute, & qu'il est aisé d'obtenir ceux des arcs intermédiaires, exprimés en secondes au moyen des tables proportionnelles.

Dans les tables Indiennes chaque Sinus est

exprimé, ainsi que le rayon, dans les minutes de la circonférence; savoir dans le nombre entier de minutes le plus voisin de la vraie valeur du Sinus. Cette exactitude n'est pas comparable à celle de nos tables usuelles, qui la pouffent au moins jusqu'à une dix-millionième du rayon. Elle pourroit même donner des préventions contre l'habileté des mathématiciens Indiens: mais elles sont détruites par l'exposition des deux principes sur lesquels est fondée la construction de leurs tables. L'un de ces principes se trouve dans le *Surya Siddhanta* lui-même; & l'autre dans un commentaire sur cet ouvrage.

Par le premier de ces principes: connoissant le sinus, & partant, le cosinus d'un arc, on connoît le sinus de sa moitié. Ce principe est précisément une des propositions fondamentales de notre trigonométrie: *le double du carré du sinus de la moitié d'un arc est égal au produit du rayon par le Sinus versé de cet arc.* On fait que ce théorème est une suite immédiate du théorème de Pythagore. Par son moyen, connoissant le sinus de 30° (qui est la moitié du rayon), on connoît successivement les Sinus de 11° , $7^\circ 30'$, $3^\circ 45'$, qui est le plus petit arc des tables Indiennes. On trouve que le sinus de $3^\circ 45'$ soit $225'$ vaut environ $224' 44''$; d'où il suit que cet arc & son Sinus diffèrent l'un de l'autre, environ d'un quart de minute seulement; & puisque l'exactitude des tables Indiennes

Indiennes se borne aux minutes ; cet arc & son sinus sont pris pour égaux entr'eux.

Ayant ainsi obtenu le sinus de $3^{\circ} 45'$, on calcule par le second principe, les sinus de ses multiples jusqu'à 90° . La règle à suivre pour cela est énoncée dans l'ouvrage Indien d'une manière particulière, que notre auteur généralise comme il suit. Les sinus de deux arcs successifs étant connus : divisez le plus grand d'entr'eux par $225'$, prenez le quotient entier le plus voisin du vrai (si ce quotient exact n'est pas entier). Soustrayez ce quotient approché de la différence entre les deux sinus. Le reste est la différence entre le premier sinus & celui de l'arc qui suit immédiatement. La démonstration de cette règle n'est pas donnée dans la partie de l'ouvrage Indien que le Dr. Davis fait conoître. Peut-être l'auteur, conservant le ton de l'inspiration, croit-il devoir exercer la foi de ses disciples, plutôt que les éclairer. Le Dr. Playfair montre son accord avec le Théorème suivant, bien connu des mathématiciens modernes : soient 3 arcs en proportion arithmétique : Le sinus de l'arc moyen, est à la somme des sinus des arcs extrêmes, comme le sinus de la différence de deux arcs qui se suivent, est au sinus du double de cette différence (qui est la différence des arcs extrêmes). Comme dans les tables Indiennes, le sinus de la différence de deux arcs successifs est $225'$;

& que le sinus du double de cette différence est 449 ; on a la proportion 225, est à 449, comme le sinus de l'arc moyen est à la somme des sinus des extrêmes. Delà : le sinus du troisieme arc, est l'excès des $\frac{449}{225}$ du sinus du second arc, sur le sinus du premier.

Par ce théorème, le calcul des sinus est ramené à la doctrine des suites récurrentes dont les modernes se sont occupés avec tant de fruit & de profondeur ; & dont on ne s'attendoit pas à trouver une trace dans les fastes de la plus haute antiquité. Cette propriété des tables des sinus, si propre à en faciliter la construction, n'a été remarquée par les mathématiciens d'Europe que depuis deux cens ans environ. Cependant il est aisé de la ramener à la 97^{me}. prop. des *Données* d'EUCLEIDE (ouvrage trop peu connu des mathématiciens du Continent). PROLÉMÉE qui vivoit environ 400 ans après Euclide, & qui sans doute connoissoit cet ouvrage, n'a pas vu l'application de cette proposition au calcul des tables des cordes ; non plus que la multitude des mathématiciens qui l'ont suivi. Lorsque Viète, à la fin du 16^{me}. siècle, fit connoître ce théorème, il passa pour en être l'auteur ; honneur que le Dr. Playfair attribuerait plutôt à son ingénieux compatriote Anderson d'Aberdeen.

Ce qui vient d'être dit sur les connoissances Trigonométriques des Indiens, & en particu-

lier sur les principes de la construction de leurs Tables, suffiroit pour faire juger des progrès qu'ils avoient fait dans les sciences exactes; & cela en remontant à la plus haute antiquité. Leurs connoissances astronomiques (que ce n'est pas ici le lieu de rappeler), prouvent qu'on ne sauroit rapprocher la date du *Surya Siddhanta*, de moins que 2000 ans avant l'ère-Chrétienne. L'application heureuse de l'arithmétique à la géométrie, & la réduction en Tables des rapports des côtés des triangles d'après la connoissance de leurs angles, supposent dans l'une & l'autre de ces sciences un degré de perfection qui ne peut être que le fruit de leur culture pendant plusieurs siècles antérieurs. On peut donc, avec l'ingénieux & infortuné Bailly, faire remonter au moins à trois mille ans avant J. C. l'époque où les sciences mathématiques & en particulier l'astronomie, (dont la trigonométrie est une base indispensable), étoient en vigueur chez les Indiens; tandis que les observations astronomiques des Grecs, les plus anciennes, ne remontent gueres au-delà de 1200 ans avant l'ère-Chrétienne.

C H I M I E.

ACCOUNT OF A VIOLENT EXPLOSION , &c.

Détails sur une explosion violente qui eut lieu dans un magasin de farines à Turin , le 14 décembre 1785 , auquel on a joint quelques observations sur les inflammations spontanées , par le Comte MOROZZO. (Tiré du *Repertory des Arts & Manufactures.*)

L'ACADÉMIE de Turin , ayant exprimé son desir d'avoir un détail particulier de l'explosion dont je lui parlai peu de jours après cet accident , je me suis empressé de remplir son vœu , en recherchant avec la plus grande attention toutes les circonstances du fait , de manière à pouvoir le raconter avec exactitude. »

Je prendrai la liberté d'ajouter à ces détails quelques notices abrégées sur les différentes inflammations spontanées qui ont eu lieu dans diverses substances & qui ont occasionné de très-grands malheurs. Quoique ces phénomènes soient déjà , pour la plupart , connus des Physiciens , je me persuade qu'on me saura quelque gré de les avoir réunis dans ce Mémoire ; car on ne sauroit donner trop de notoriété à des faits qui ont des rapports si immédiats avec le bien public. »

» Le 14 décembre 1785, vers six heures du soir, il y eut dans la maison de Mr. Giacomelli, boulanger de cette ville, une explosion qui jeta dans la rue les croisées de sa boutique; le bruit fut aussi fort que celui d'une pièce d'artillerie & on l'entendit à une distance considérable. Au moment de l'explosion on aperçut dans la boutique, une flamme très-brillante qui ne dura que quelques secondes, & l'on observa immédiatement, que l'inflammation provenoit du magasin de farines, situé dans l'arrière-boutique, & où un enfant étoit occupé à en remuer une certaine quantité, à la lumière d'une lampe. Cet enfant eut le visage & les bras échaudés par l'explosion; ses cheveux furent brûlés, & il se passa plus de quinze jours avant que les brûlures de la peau ne fussent guéries. Il ne fut pas la seule victime de cet accident; un autre enfant qui se trouva monté sur une espèce d'échaffaud dans une petite chambre, de l'autre côté du magasin, voyant la flamme qui s'étoit fait chemin de ce côté, & croyant que la maison étoit en feu, se précipita de son échaffaud, & se cassa la jambe. »

» Pour découvrir comment cet événement avoit eu lieu, j'examinai avec beaucoup d'attention le magasin & ses dépendances; & c'est d'après cet examen & les détails que m'ont fourni les témoins oculaires, que j'ai tâché de rassembler toutes les circonstances dont je vais faire part. »

» Le magasin de farine , qui est situé au-dessus de l'arrière-boutique est haut de six pieds , large d'autant , & long d'environ huit pieds. Il est divisé en deux parties par une muraille ; l'une & l'autre sont plafonnées en voute , & le pavé d'un côté est plus élevé d'environ deux pieds que celui de l'autre. Au milieu du mur qui forme ces deux partitions , est une ouverture de deux pieds & demi de large & de trois pieds de haut , par laquelle on fait passer la farine de la division supérieure dans l'inférieure. »

» Le jeune garçon occupé dans la chambre inférieure à ramasser de la farine pour fournir au blutoir placé au-dessous , creusa vers les côtés de l'ouverture , dans le but de faire tomber la farine de la chambre supérieure dans celle dans laquelle il étoit ; & tandis qu'il creusoit assez profondément , il y eut une sorte d'avalanche de farine , suivie d'un nuage épais qui s'enflamma tout-à-coup à la lampe qui étoit suspendue à la muraille , & causa l'explosion violente dont on a parlé. »

» La flamme se montra dans deux directions , elle pénétra par une petite ouverture de la chambre supérieure du magasin dans une très-petite chambre située au-dessus , & dont la porte & les fenêtres étoient fortes & bien fermées ; elle ne produisit là aucune explosion : c'est-là où le pauvre garçon dont on a parlé se cassa

la jambe. La plus grande inflammation au contraire eut lieu dans la plus petite chambre, & prenant la direction d'un escalier étroit qui mène dans l'arrière-boutique, elle produisit là une explosion violente qui poussa, ainsi qu'on l'a dit, toutes les fenêtres dans la rue. Le boulanger lui-même, qui se trouvoit alors dans sa boutique, vit la chambre tout en feu quelques instans avant que de sentir la secousse de l'explosion. »

» Le magasin contenoit à l'époque de cet accident, environ trois cent sacs de farine. »

» Je soupçonnois que cette farine avoit été mise humide dans le magasin; & je cherchai à vérifier cette conjecture. L'examen que je fis m'apprit qu'elle étoit parfaitement sèche, & qu'il n'y avoit dans sa masse aucune apparence de fermentation, ni dégagement de chaleur sensible.

» Le boulanger me dit qu'il n'avoit jamais eu de la farine aussi sèche que celle de cette année, qui fut effectivement une année de grande sécheresse, car il ne plut pas en Piémont pendant cinq à six mois. Il attribuoit l'accident arrivé dans son magasin à la sécheresse extraordinaire du grain. »

» Ce phénomène, tout frappant qu'il étoit à l'époque où il eut lieu, n'étoit pas entièrement nouveau pour le boulanger. Il m'apprit que dans sa jeunesse il avoit été témoin d'une in-

inflammation semblable ; elle avoit eu lieu dans un magasin de farine où l'on versoit cette substance par un conduit de bois assez long dans un blutoir, tandis qu'il y avoit tout auprès, une lampe allumée. Mais dans ce cas, l'inflammation ne fut pas accompagnée d'une explosion. »

» Il me fit part de plusieurs autres circonstances, que je crus devoir examiner de plus près. Dans l'un de ces cas, chez la veuve Ricciardi, boulangere de cette ville, dont le magasin de farine étoit contigu à la forge d'un ferrurier, la farine s'échauffa à un tel degré, qu'un jeune homme qui entra dans le magasin n'y put demeurer à cause de la chaleur qui brûloit ses pieds ; cette farine étoit devenue d'un brun foncé, & tandis qu'on l'examinoit on commença à appercevoir des étincelles & le feu se mit au tas sans produire aucune flamme, à la maniere des pyrophores (1). »

» Il m'apprit aussi qu'une inflammation du même genre que celle dont j'ai parlé, avoit eu lieu

(1) Je désirois fort essayer s'il seroit possible d'amener la farine seule à l'état de pyrophore ; mais quoique je la calcinasse par une forte chaleur dans une petite retorte, avec les mêmes précautions qu'on emploie pour faire les autres pyrophores, je ne pus jamais réussir à lui faire prendre feu par l'exposition à l'air. En y joignant l'alun, j'obtins un vrai pyrophore ainsi que l'avoit fait Lémery. (A)

EXPLOSION ET INFLAMMAT. SPONTAN. 153

chez un boulanger de cette ville nommé Joseph Lambert; elle fut occasionnée par l'action de secouer auprès d'une lampe allumée, de grands sacs qui avoient été remplis de farine; mais la flamme quoiqu'assez vive, ne fit de mal à personne (1). »

» Il me paroît, d'après les détails qui précèdent, qu'il n'est pas difficile d'expliquer le phénomène en question. Voici l'idée que j'en ai conçue. A mesure que la farine tomboit, une grande quantité d'air inflammable qui avoit été confiné dans ses interstices, se mettoit en liberté; cet air en s'élevant s'allumoit par le contact de la lumière, & se mêlant immédiatement avec une quantité suffisante d'air atmosphérique, l'explosion eut lieu du côté où il y avoit le moins de résistance. Quant à la brûlure des cheveux & de la peau du jeune homme qui étoit dans le magasin, il faut l'attribuer à l'inflammation des fines molécules de farine qui, flottant dans l'atmosphère s'allumoient par l'intermède de l'air inflammable, comme la poussière des étamines de certains végétaux (en particulier du sapin & de quelques mousses) lorsqu'on la jete en l'air, s'allume si l'on en

(2) Ne seroit-ce point, dans ce cas, le nuage de farine qui auroit pris feu? Cette matière séchée & pulvérulente peut dans certains cas s'allumer & faire un éclair à la manière du Lycopode: l'auteur admet ensuite cette explication dans un cas différent. (R)

approche la flamme d'une chandelle. »

» Mais on peut objecter que comme la farine n'étoit pas du tout humide, & qu'elle n'avoit aucun degré sensible de chaleur, il ne pouvoit y avoir dans son intérieur aucune sorte de fermentation ; & qu'en conséquence il ne pouvoit pas s'en dégager de l'air inflammable : à cela je répons. »

1°. « Que la farine n'est jamais entièrement exempte d'humidité, ainsi que le prouve évidemment la distillation. »

2°. Que quoique le degré de chaleur ne fût pas assez considérable pour dégager l'air inflammable par la fermentation, une quantité suffisante de ce fluide se trouvoit libérée par, ce que je pourrois appeler un moyen mécanique, pour s'enflammer au contact de la lumière ; & pour dégager, en même temps, tout celui qui communiquoit avec l'air atmosphérique (1). »

3°. Il faut se rappeler que la farine donne aussi de l'air inflammable alkalin, qui est produit par sa partie végétó-animale, ou son *gluten*. Et nous savons que cette espèce d'air inflammable est très-susceptible d'inflammation.

(1) Mais comment s'étoit *produit* cet air inflammable qui se dégageoit ainsi mécaniquement. Nous ne voyons pas que l'eau se décompose, & donne son hydrogene, par l'intermede des matieres végétales ou animales, sans une fermentation préalable, ou sans une haute température. (R)

EXPLOSION ET INFLAMMAT. SPONTAN. 155

» Après avoir décrit cet événement singulier je demande la permission de rassembler ici tous les faits qui ont rapport à des inflammations spontanées & qui sont parvenus à ma connoissance. Les membres de l'administration doivent prendre un intérêt particulier aux détails circonstanciés de ces phénomènes, non-seulement parce que cela peut les conduire à prévenir les malheureux accidens qui en résultent, mais aussi parce que des innocens peuvent être soupçonnés d'avoir contribué à des événemens qui feroient l'effet de causes naturelles, & être injustement persécutés par suite de ces soupçons. »

» Je ne parlerai pas des inflammations causées par la foudre, par les feux souterrains, & par d'autres météores ; ces phénomènes ne sont pas de la même nature que ceux dont je vais entretenir l'Académie ; mais je ne dois pas passer sous silence les combustions spontanées qui ont eu lieu quelquefois dans le corps humain. Quoique les accidens de ce genre soient très-rares, nous en trouvons quelques exemples dans les Transactions Philosophiques & dans les Mémoires de l'Académie de Paris & de Copenhague. On y raconte qu'une Dame Italienne, (la Comtesse Cornelia-Bandi) fut entièrement réduite en cendres les jambes seules exceptées : qu'une femme Anglaise, nommée Grace Pitt, fut presque entièrement consumée par une inflammation qui eut lieu dans ses en-

trailles ; & enfin , qu'un Prêtre de Bergame fut consumé de la même manière. On a attribué ces accidens à l'abus des liqueurs spiritueuses , mais les personnes qui en furent les objets n'appartenoient pas à la classe des victimes de l'intempérance , quelque nombreuse qu'elle soit d'ailleurs. »

» Les inflammations spontanées des huiles essentielles , & celles de quelques huiles grasses lorsqu'on les mêle à l'acide nitreux , sont bien connues des Physiciens ; on connoit aussi l'inflammation du charbon pulvérisé mêlé à froid avec cet acide ; (découverte de Mr. Proust). On connoit la combustion du phosphore , du pyrophore , & de l'or fulminant. On ne trouve ordinairement ces substances que dans les laboratoires des chimistes , qui connoissent très-bien les précautions nécessaires pour prévenir les malheureux accidens qu'elles peuvent occasionner. »

» L'incendie d'une frégate appartenant à l'Impératrice de Russie dans le port de Cronstadt , bâtiment sur lequel on étoit sûr qu'il n'y avoit point eu de feu allumé , montre que le noir de fumée imprégné d'huile de chenevis peut s'enflammer spontanément ; ceci a été prouvé par les expériences que l'Académie de Pétersbourg fit faire à cette occasion par ordre de l'Impératrice ; & quoique les Académiciens ne pussent réussir , à faire allumer du chanvre ou

des cordages en les imprégnant de la même huile, il est encore très-probable que le terrible incendie qui eut lieu dans le grand magasin des cordages à Pétersbourg, fut l'effet de l'inflammation spontanée de ces substances; ainsi que l'événement du même genre qui eut lieu à Rochefort en 1756. »

» L'incendie d'un magasin de voiles qui eut lieu à Brest en 1757, fut causé par l'inflammation spontanée de quelques toiles cirées qui après avoir été peintes, d'un côté & mises sécher au soleil, furent entassées encore chaudes. On prouva que cela avoit eu lieu ainsi, par des expériences subséquentes (1). »

» Les végétaux, qu'on a fait bouillir dans l'huile ou la graisse, & qu'on laisse ensuite entas, s'enflamment en plein air. Cette inflammation arrive toujours lorsque les végétaux ont conservé un certain degré d'humidité; si l'on les dessèche bien complètement au préalable, ils se réduisent en cendres sans aucune apparence de flamme. Nous devons ces observations à Mrs. Saladin & Carette. » (*Journal de Physique* 1784.)

» Les monceaux de chiffons qu'on entasse dans les papeteries, & dont on accélère la préparation en les laissant fermenter, s'allument quelquefois si l'on n'y prend garde. »

(1) Voy. Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris 1760.
(A). Voyez aussi ce Journal T. II, Sc. & Arts, p. 180. (R)

» On connoît depuis bien des siècles l'inflammation spontanée du foin ; elle a souvent réduit en cendres des granges & des habitations rustiques. Elle est surtout à craindre lorsque le foin est entassé encore humide , parce que la fermentation est alors très-considérable. Cet accident arrive rarement au premier foin (selon l'observation de Mr. de Bomare) ; mais il est beaucoup plus fréquent dans les regains entassés ; & si par inattention , on laisse un morceau de fer dans une meule de foin en fermentation , elle s'enflamme presque infailliblement. On peut consulter à ce sujet , un excellent Mémoire de Mr. Senebier , (*Journal de Physique* 1781). Le blé entassé a aussi produit quelquefois des inflammations de ce genre. Vaniere dit dans son *Pradium rusticum* :

*Quæ vero (gramina) nondum satis insolata recondens
Imprudens , subitis pariunt incendia flammis.*

» Le fumier aussi s'enflamme spontanément , dans certaines circonstances. »

» Nous avons encore des exemples d'inflammations spontanées dans les produits du regne animal. Des pièces d'étoffe de laine qui n'avoient pas été dégraissées , ont pris feu dans un magasin. La même chose est arrivée à des tas de laine filée ; on a vu des pièces d'étoffe s'enflammer tandis qu'on les charrioit au foulon ; ces inflammations arrivent toujours quand les

EXPLOSION ET INFLAMMAT. SPONTAN. 159

matieres entassées conservent un certain degré d'humidité, qui est nécessaire pour exciter une fermentation; la chaleur qui s'en dégage dessèche les huiles & les dispose insensiblement à l'ignition, & la qualité de l'huile plus ou moins seccative peut y contribuer puissamment (1). »

On trouve aussi dans les substances appartenantes au regne minéral, des exemples d'inflammations spontanées. Les Pyrites entassées, si on les humecte & qu'on les expose à l'air prennent feu. La houille aussi, mise en monceaux, s'enflamme spontanément dans certaines circonstances. Mr. Duhamel raconte deux inflammations de ce genre qui ont eu lieu dans les magasins de Brest en 1751 & 1757. » (*Mém. acad. des Sciences.*)

» Des bateaux chargés de chaux vive ont pris feu, chemin faisant, & la chaux mouillée, a souvent mis le feu à des substances qui se trouvoient dans son voisinage. »

» Des tournures de fer qu'on avoit laissées dans l'eau & qu'on exposa ensuite en plein air donnerent des étincelles & allumoient les combustibles voisins. C'est à Mr. Charpentier que nous devons cette observation. »

(1) Nous croirions plus volontiers que ces inflammations sont l'effet de l'hydrogene dégagé de l'eau par l'action des matieres en fermentation, & élevées à une haute température par la chaleur sensible qui se dégage aussi dans ce procédé naturel. (R)

» L'explosion d'un moulin à poudre en 1784, dans la manufacture royale de Turin, explosion dont on ne put point découvrir la cause, pourroit peut-être avoir été occasionnée par l'inflammation spontanée des ingrédients dont est composée la poudre, ainsi que le soupçonna le comte de Saluces. Je ne nie cependant pas la possibilité qu'il y a que cette inflammation eût été causée par le météore auquel on l'attribua. Car il sort continuellement de ces ingrédients une espece d'air hépatique, lorsqu'ils sont humectés, & la flamme la plus légère peut allumer cette vapeur aëriiforme. »

» Il est très-évident, d'après les faits que j'ai rapportés, que les inflammations spontanées étant très-fréquentes, & leurs causes très-variées, on ne peut mettre trop d'attention & de vigilance à prévenir leurs funestes effets. On doit donc surveiller avec le plus grand soin les magasins publics, surtout ceux qui appartiennent à l'artillerie, ou ceux dans lesquels on renferme du chanvre, des cordages, du noir de fumée, de la poix, du goudron, des toiles cirées &c. substances qu'on ne doit jamais entasser, surtout si elles ont conservé de l'humidité. Pour prévenir les accidens il faudroit les examiner fréquemment, & si l'on appercevoit qu'il s'y développât quelque chaleur, il faudroit y pourvoir sans retard. Il faut faire cet examen de jour, car il y a des inconvé-
niens

ntens à porter de la lumière dans les magasins, à raison des vapeurs qui s'exhalent de la fermentation, & qui sont souvent inflammables : l'approche d'une lampe allumée peut, dans ces cas là, occasionner une explosion subite. »

» Il arrive souvent, que les substances en fermentation ne peuvent pas s'allumer d'elles mêmes ; mais le simple contact de la flamme suffit pour les mettre très-promptement en feu. On pourroit, en quelque sorte, faire une classe séparée, des substances dans lesquelles l'inflammation ne peut pas naître spontanément, mais qui s'allument à l'approche de la flamme ; l'accident qui a donné lieu aux rapprochemens que nous venons de faire, étoit dû à des substances de ce genre. »

» L'ignorance des circonstances mentionnées ci-dessus, & une coupable négligence dans les précautions qu'on auroit dû prendre, ont souvent causé plus de pertes & de malheurs, que ne l'auroit pu faire la malice la plus ingénieuse. Il est donc très-important de faire connoître ces faits, pour que le public puisse en tirer avantage.

Les rédacteurs de l'ouvrage périodique duquel nous avons tiré l'article qui précède, ajoutent, qu'il faut faire une observation, que l'auteur paroît avoir ignorée ; savoir, que le noir de fumée qui occasionna l'incendie de la frégate *Russe* mentionnée dans ce mémoire,

étoit de nature végétale , préparé avec la fumée de sapin ou d'autres arbres résineux. Il a paru par des expériences qui ont été faites à Londres, qu'un mélange d'huile & de noir de fumée animal , tel qu'on l'employe communément dans cette ville , ne pouvoit s'allumer spontanément ; tandis qu'un mélange semblable fait avec du noir de fumée végétal , venant de Russie , & qu'on s'étoit procuré pour en faire l'essai , ne manquoit jamais de s'enflammer & de brûler avec beaucoup de violence.

On pourroit aussi comparer avec ce qui précède , les détails que nous avons donnés (T. II. Sc. & Arts p. 180) sur une combustion spontanée qui eut lieu dans l'un des arsenaux de la Compagnie Anglaise dans l'Inde.

HISTOIRE NATURELLE.

AN ACCOUNT OF THE PEAT-MOSSES , &c.
Détails sur les tourbes de Kincardine & Flanders , en Perthshire. Par W. CHRISTOPHER TAIT, Pasteur de Kincardine. (*Transactions de la Société d'Edinburgh*).

LES tourbes de Kincardine & Flanders sont situées dans la grande plaine de *Carse* qui commence à Borrowstounness au midi du Firth de

DÉT. SUR LES TOURBES DE KINCARDINE. 163

Forth, & un peu au-dessus de Kincardine de l'ouest, du côté du nord. Cette plaine s'étend sur les deux bords du Frith, & ensuite de la rivière Forth jusqu'à Cardross, à vingt-deux milles à l'ouest du point où elle commence. La largeur de cette plaine, vis-à-vis de Falkirk, où elle est la plus considérable, est d'environ sept milles, en y comprenant l'espace occupé par le Frith. A Stirling, la plaine n'a qu'un quart de mille, & sa largeur moyenne, depuis là jusqu'à Cardross, est de trois milles. Le sol est une glaise bleue dont on n'a jamais sondé la profondeur. Un banc de gravier, cependant, se montre près de la surface & occupe l'espace d'un mille, entre Blair Drummond & Ochertyre, en s'enfonçant du côté du Forth, à raison d'un pied sur cent. Presque toute cette étendue est une plaine unie : il n'y a de hauteurs que celles d'Airth, de Dunmore, de Craigforth, & de Dript, qui sont peu considérables. On ne voit de roc que sur ces éminences, & dans deux endroits de la rivière, savoir à Dript, & à Craigforth : ce dernier forme une obstruction considérable dans le courant, qui empêche la marée de remonter plus haut. Dans tout le reste de la plaine, on ne voit pas une seule pierre dans le sol. Des bancs de coquilles, surtout des huîtres, se montrent dans plusieurs endroits, comme dans des fossés qu'on a creusés à une certaine profondeur, & sur les bords du Forth

ou de ses branches. On voit un lit très épais de ces coquilles auprès du pont de la Goody, petite riviere qui coule dans le Forth. On en voit encore un autre au Sud de la route de Polmouth à Borrowstounneff. Lorsque le Forth rongé ses bords, il découvre des troncs d'arbres très-gros, enterrés à diverses profondeurs dans la glaise.

Quant à la riviere, il faut remarquer que la marée remonte jusqu'au banc de rochers de Craigforth, à 300 verges au-dessous de la réunion du Teith & du Forth. Au-dessus de ce point, la surface de la riviere est de quatre pieds & demi plus haut qu'elle n'est au-dessous, même dans les hautes marées du printemps. L'autre chute de la riviere, jusqu'à Cardross, se trouve à Frew, à huit milles environ de la premiere: elle est de trois pieds.

Pour donner une idée du niveau presque horizontal de cet espace de terrain, je dirai que dans une reconnaissance que l'on a faite de la riviere, avec le projet de la rendre navigable, il a été reconnu qu'une digue de quatre pieds, élevée à la pointe de Craigforth accroîtroit la profondeur de la riviere de plus de trois pieds jusqu'au bacq de Frew; & qu'une digue de cinq pieds, élevée à Frew, augmenteroit aussi la profondeur de trois pieds, au moins, jusqu'à Cardross. Donc, la différence de hauteur de la surface de l'eau à Cardross, & des hau-

DÉT. SUR LES TOURBES DE KINCARDINE. 165

tes marées à Craigforth , est de moins de dix pieds , & cela dans une distance de 40 milles , si l'on suit les sinuosités de la rivière , ou de 18 milles en ligne directe. La surface de la rivière est d'environ 21 pieds au-dessous du niveau de la glaise de part & d'autre , & cependant le pays est souvent recouvert par les eaux , dans les inondations , jusqu'à une grande distance.

Une partie du pays est couverte de marais tourbeux , ou plaines de tourbe. La première de ces plaines du côté de l'est est celle de Kincardine , qui occupe l'angle entre le Forth & le Teith , & s'étend à l'ouest jusqu'à Burnbank. La plaine est ensuite exempt de tourbes dans un espace de deux milles & demi. Le marais tourbeux de Flanders vient ensuite , & regne jusqu'à Cardross , en occupant des deux côtés du Forth une grande partie de la plaine. Le marais de Kincardine occupoit , il y a 25 ans , 1800 acres : les opérations dont je parlerai tout-à-l'heure l'ont réduit à 1500.

Ces deux espaces tourbeux sont précisément de la même nature. Les marais de Froth , Dunmore , & Kinnaird leur ressemblent également. La longueur de tous ces espaces tourbeux pris ensemble , depuis Cardross à Kinnaird , en déduisant les intervalles non tourbeux , est de 15 milles , & j'estime leur surface totale à 9000 acres. La plus grande épaisseur

de la tourbe au-dessus de la glaise est de quatorze pieds & demi.

A une certaine distance, toute la surface des espaces tourbeux semble couverte de bruyeres, mais dans le fait il n'y en a que quelques buissons épars & séparés par des plantes qui croissent naturellement dans la mousse. Il y a aussi de place en place des espaces marécageux, où l'on enfonce, & où il ne croit pas un brin d'herbe.

Lorsqu'on creuse dans la tourbe, on trouve les débris des mêmes plantes qui croissent à sa surface; lesquels débris sont plus ou moins pourris, selon la profondeur, l'humidité, & la pression qu'ils ont éprouvée. Au fond de la tourbe, & à la surface de la glaise sur laquelle elle repose, on trouve une couche de morceaux de bois pourri, & de temps en temps un peu de terre & un peu de bruyere : celle-ci est beaucoup mieux conservée que celle qu'on trouve dans les couches supérieures de la tourbe. On voit également sur la surface de la glaise, ou au fond de la tourbe, un nombre infini de troncs d'arbres renversés auprès de leurs racines, lesquelles sont encore dans la glaise & situées comme elles l'étoient pendant la végétation. Les racines des buissons de bruyere sont également fixées dans la glaise, & semblent avoir végété autrefois dans cette terre, avant que la tourbe la recouvrit.

DÉT. SUR LES TOURBES DE KINCARDINE. 167

Dans le marais de Kincardine, on voit un espace considérable que l'on nomme *tourbe fluide* (flow-moss.) La surface de cet espace est unie, & avant un dessèchement qui a eu lieu récemment, cette partie étoit si saturée d'eau, à cause de la situation élevée du terrain environnant, qu'en effet la tourbe y étoit presque fluide. Dans les autres espaces, la tourbe a la consistance nécessaire pour pouvoir être coupée en morceaux; du moins vers le fond de la couche, car dans les parties supérieures de la masse tourbeuse, la putréfaction n'est pas suffisamment avancée, ou la compression n'est pas assez grande pour que l'on puisse la couper en morceaux solides.

On s'y est pris de diverses manières pour rendre ces marais productifs. Dans quelques endroits, après avoir enlevé la tourbe pour la brûler, on a réduit en cendres les débris pour la mêler ensuite à la glaise inférieure, avec la charrue. Dans les endroits où la tourbe a une grande épaisseur, & où ce mode d'amélioration ne pouvoit pas avoir lieu, on a brûlé la surface pour labourer ensuite dans la tourbe même, ou bien l'on a rapporté des terres sur la surface de la tourbe pour mêler ensemble les deux substances à la charrue. Les progrès que l'on a faits avec ces méthodes, pour la culture de la tourbe, n'ont, au reste, pas été bien considérables; & l'usage de se débarrasser

par les eaux de toute la masse de la tourbe, à quelques pouces près au-dessus de la glaise, a généralement prévalu aujourd'hui. Le sol qu'on a ainsi débarrassé de la tourbe qui le recouvrait, passe pour très-bon, & s'affirme aisément à raison de 15 shellings l'acre. Cette opération de flotter la tourbe est facile, parce que la glaise est de niveau avec le pays environnant, & que la masse de tourbe a été superposée à la glaise.

On dit que dès le commencement de ce siècle, on s'est servi de cette méthode entre Forth & Carron pour rendre ces terrains à la culture. On calcule qu'environ 600 acres y ont été ainsi débarrassés de la tourbe, au moyen de l'eau rassemblée dans l'enceinte du marais seulement, & sans le secours d'aucun ruisseau tiré des hauteurs voisines. On avoit fait des essais partiels sur les marais de Kincardine & Flanders, mais sans les rapporter à un plan général; mais en 1770 Lord Kames propriétaire de 1500 acres dans le marais de Kincardine & d'une grande partie de celui de Flanders, adopta cette méthode, & la perfectionna beaucoup. Aujourd'hui elle est généralement suivie : en voici le détail.

Sur le bord de la masse tourbeuse dont on veut se débarrasser, on creuse un fossé de deux pieds de profond, & de dix-huit pouces de large. On y fait entrer un ruisseau d'un pied

de profondeur environ. L'ouvrier enleve ensuite avec une pèle de bois, une bande de six pieds de large, & d'un pied de haut; le long du fossé, & la jette dans l'eau, par morceaux, à mesure qu'il travaille. Si la pente est suffisante; l'eau en emmene autant que six hommes peuvent en couper. Lorsque l'ouvrier est arrivé à l'extrémité de la bande qu'il veut enlever, il reprend une seconde couche d'un pied, & ainsi de suite, jusqu'à-ce qu'il ne reste que six pouces de tourbe sur la glaise. Cette couche de six pouces séchée au soleil, s'enleve, se brûle, s'enterre à la charrue, & le terrain se trouve prêt pour une récolte d'avoine.

Au fond de la masse de tourbe, ainsi enlevée, on trouve un nombre infini de troncs d'arbres & de racines qui ne laissent aucun doute que ces lieux n'aient été autrefois occupés par des forêts. Il n'est pas rare, je le fais, de trouver des arbres dans la tourbe, mais il n'est pas commun de les trouver en si grande abondance. Il y sont aussi nombreux que l'on peut supposer possible qu'ils aient été nourris par le sol; &, ce qui est bien remarquable, les racines se trouvent fixées dans la glaise, avec la direction naturelle qu'elles avoient pendant l'époque de la végétation, & sont en nombre, en force, & en espece proportionnés aux troncs d'arbres couchés tout auprès.

Les arbres sont des chênes, des bouleaux,

des noisetiers , des aulnes , & des saules. Dans quelques endroits il y a des sapins. Le chêne y est le bois le plus abondant , surtout dans la partie occidentale des marais. On y a trouvé dernièrement quarante gros chênes couchés à côté de leurs racines , aussi près les uns des autres que l'on peut supposer qu'ils aient pu croître. Un de ces chênes avoit 50 pieds de long & plus de trois pieds de diametre : on compta dans une des fanches trois cent quatorze cercles concentriques, c'est-à-dire autant d'années de croissance. Dans une autre partie du marais , on a trouvé un tronc de chêne de quatre pieds de diametre ; & l'on m'a assuré que l'on découvrit à Ross , il y a quelques années , dans la partie méridionale du marais , une racine qui avoit 15 pieds de diametre à la surface de la glaise. L'arbre de cette racine avoit 22 pieds de long & 4 pieds huit pouces de diametre à la partie où il avoit été coupé , c'est-à-dire à 3 pieds du sol.

Le chêne est noir , & encore sain , surtout dans la partie qui touche à la glaise. Il est propre à beaucoup de choses , & seroit probablement plus utile encore si les gens entre les mains desquels il tombe avoient la précaution de le faire sécher convenablement. Comme on le sèche trop brusquement , il se fend , de manière qu'on n'en peut pas faire des planches. Les racines tiennent à la glaise dans leur

DÉT. SUR LES TOURBES DE KINCARDINE. 177
position naturelle, & les fouches dépassent la terre d'environ trois pieds. Elles sont très-peu pourries, & il faut beaucoup de travail pour les enlever.

Les autres arbres sont en général plus détruits : il est plus difficile de faire, à leur égard, des observations satisfaisantes. Leurs racines sont également fixées en terre, mais les fouches ne dépassent la glaise que d'un pied & demi, à-peu-près.

Les faits que je viens d'exposer peuvent indiquer eux-mêmes la cause qui a produit la disposition régulière des arbres & des racines, ainsi que le temps où cette disposition s'est réalisée. Car, d'abord, ces faits ne sauroient s'accorder avec la supposition que les arbres soient tombés de vétusté : parce que dans ce cas ils se trouveroient rompus à diverses hauteurs ; & les troncs, comme les racines, auroient eu le temps de se pourrir avant que la tourbe eût pu les recouvrir : on ne les trouveroit pas sains aujourd'hui.

Les faits ne sauroient non plus se concilier avec la supposition que les vents ont renversé ces forêts, car dans ce cas, les arbres auroient été rompus à différentes hauteurs, & plusieurs d'entr'eux auroient été arrachés dans leur chute. Je n'ai pas vu une seule exception qui pût conduire à cette hypothèse. On dit néanmoins que dans quelques endroits des marais, on a trouvé

des racines arrachées ; mais ce qu'il y a de singulier c'est qu'alors on n'y a point trouvé le tronc adhérent aux racines.

On ne peut pas observer à l'appui de la supposition de l'effet des vents, que les arbres sont plus généralement couchés sur le sol dans la direction du Sud-ouest au Nord-est ; car, par quelque cause que ces arbres soient tombés, ils doivent être dirigés comme ils le sont, attendu que les vents de Sud-ouest sont les plus fréquens & les plus violens dans ce canton - là.

La situation la plus admissible des difficultés que cette question présente est donc, que les arbres ont été coupés. La hauteur des fouches, qui est généralement de deux pieds au-dessus du sol, favorise cette opinion, parce qu'à cette hauteur un arbre, est ordinairement beaucoup plus mince que vers le sol, & que l'ouvrier peut appliquer toute sa force en employant la hache. L'état sain des troncs & des racines ne peut non plus s'expliquer d'aucune autre manière que par cette supposition.

On observe dans la partie inférieure de quelques-uns de ces troncs, les traces de la hache, par une entaille de deux pouces & demi. Ce qui explique que ces traces ne soient pas visibles partout, c'est que la hache avoit des dimensions très-peu considérables, & que d'ailleurs le temps pendant lequel ces arbres sont

DÉT. SUR LES TOURBES DE KINCARDINE. 173
restés exposés à l'air avant d'être couverts par
la tourbe, doit avoir été très-long.

Mais, demandera-t-on, dans quel but peut-on avoir entrepris de couper des forêts d'une si grande étendue ? Ce n'étoit pas pour employer les bois, puisqu'on les a laissés sur place ; ce n'étoient pas non plus pour les défrichemens que l'on avoit en vue, sans quoi l'on auroit débarrassé la surface du sol. Mais en considérant la situation locale de ces tourbes, & en nous rappelant l'histoire d'Angleterre depuis le regne de Domitien à celui de Caracalla, nous trouverons de fortes raisons d'attribuer aux Romains l'opération qui a été faite sur ces forêts.

C'est un fait bien connu que depuis le moment où César envahit la Grande Bretagne jusqu'au déclin de l'Empire ; les Bretons, incapables de tenir la campagne devant les troupes Romaines, usoient de la ressource de se retirer dans les bois & dans les marais pour inquiéter ensuite les armées Romaines par des excursions. Les généraux Romains, depuis Agricola du moins, employèrent non-seulement leurs soldats, mais une partie des Bretons soumis, à enlever aux Bretons indépendans leurs lieux de refuge, en abattant les bois, en desséchant les marais, qu'en y faisant des routes. Il paroît que c'est à ces avilissans travaux que Galgacus faisoit allusion lorsque, dans son discours aux Calédo-

niens prêts à combattre Agricola, il leur dit :
*« Corpora ipsa ac manus , sylvis ac paludibus
 emuniendis , inter verbera ac contumelias conterunt.*
 (Tacit. in vit. Agric. cap. 31.)

On dit que Sévère employa de la même manière une grande partie de ses troupes , non-seulement pour bâtir la muraille qui porte son nom ; mais aussi à abattre les forêts , dessécher les marais , & jeter des ponts sur les rivières qui s'opposoient à sa marche vers le Nord de l'Angleterre. Mais , quoique dans cette marche il doive avoir passé sur le terrain même qui est occupé par les marais de Kincardine & de Frosk , je suis porté à croire que les forêts qui avoisinoient le Forth ont été détruites par ses prédécesseurs , parce que ceux-ci avoient le projet de faire un mur depuis le frith de Forth à celui de Clyde , pour marquer les limites de l'Empire Romain ; car Sévère retira ses troupes d'entre les deux murailles , & ajouta de nouveaux travaux au mur d'Adrien ou en bâtit un lui-même dans une direction semblable.

Il est certain que les forêts dont il est question devoient embarrasser les Romains plus qu'aucune autre forêt de l'Isle , soit par leur proximité de la province Romaine , soit parce que la seule route par laquelle on pouvoit pénétrer dans la Calédonie traversoit le Carse , c'est-à-dire les marais de Kincardine & de Frosk.

Le marais de Kinnaird qui sans doute étoit

DÉT. SUR LES TOURBES DE KINCARDINE. 175
autrefois réuni à celui de Frosk, n'est qu'à un mille & demi de la rivière de Carron, laquelle rivière semble avoir été la borne de la province Romaine, dans l'endroit où elle cesse d'être navigable, c'est-à-dire où elle entre dans la plaine du Carse. Le marais de Kincardine n'est distant que de douze milles de la station de Camelon. Les forêts situées comme celles-là l'étoient, fournissoient donc aux Calédoniens un abri très-avantageux, soit pour faire des incursions dans la province Romaine, soit pour inquiéter les armées qui tentoient de pénétrer vers le Nord.

Il y a un fait qui démontre qu'il a existé dans cette partie de l'Isle un peuple plus avancé dans la civilisation que ne l'étoient les anciens Calédoniens, & cela à une époque plus reculée que celle de la formation des tourbes de Kincardine. Ce fait est la découverte d'une chaussée pratiquée à la surface de la glaise, & au-dessous d'une masse de tourbe de l'épaisseur de huit pieds. La partie de la route déjà déblayée & reconnue a soixante-dix verges de long; sa largeur est de quatre verges. Elle est construite avec des arbres de neuf à douze pouces de diamètre, disposés en longueur, dans la direction de la route. D'autres arbres, de moitié moins gros, ont été disposés à angle droit des premiers; & le tout avoit été recouvert de fascines. L'épaisseur qu'occupent les matériaux de cette route varie selon les lieux. Les arbres

qui sont dans le sens de la route sont en général , à la surface de la glaise ; mais dans les parties humides & basses , on les trouve enfoncés d'environ deux pieds dans l'argile.

Cette route traverse une piece de terre qui est plus basse que le terrain environnant. Sa direction est depuis le Forth vers la partie la plus étroite du marais , du côté d'une autre route que l'on croit Romaine , & qui passe entre la riviere Teith & le marais. Les traces de cette derniere route ont été reconnues & suivies depuis Camelon jusqu'à quatre milles au Nord-ouest du pont de Dript , où il y avoit autrefois un bacq. Cette route Romaine est faite avec une épaisseur d'un pied de gravier , sous lequel il y a , dans quelques endroits , une couche de pierres. Elle paroît avoir 20 pieds de large , ce dont on ne peut pas s'assurer exactement , parce que le terrain a été soumis à la charrue. Sa direction au-delà du Forth , à Dript , est au Nord - ouest en ligne droite , vers le passage de Leny , qui est la voie naturelle pour communiquer aux montagnes , & par lequel passe aujourd'hui le chemin qui conduit au fort William. Il est donc très-probable que cette route étoit destinée aux troupes que les Romains employoient contre les Calédonniens ; elle conduisoit aussi , vraisemblablement , aux autres routes qui pénétroient plus loin vers le Nord par Dumblane , & la station bien connue

DÉT. SUR LES TOURBES DE KINCARDINE. 177

connue d'Ardoch. On doit également présumer que cette route tenoit à celle qu'on a découverte au fond de la tourbe, & que celle-ci est également un ouvrage des Romains.

Voici les conséquences que l'on peut déduire des faits & des raisonnemens ci-dessus. Il paroît qu'avant Agricola (le premier d'entre les généraux Romains qui ait couvert les frontières du Nord par une chaîne de postes) la plus grande partie du plat pays étoit occupée par des forêts; qu'à-peu-près dans ce temps-là, une grande partie de ces forêts fut abattue par les Romains, parce qu'étant situées sur leur frontière elles fournissoient aux gens du pays des retraites sûres d'où ils venoient sans cesse désoler la province Romaine par des incursions; enfin que les arbres abattus, se pourrissant dans ces terrains marécageux, ont donné lieu à la formation de cette masse énorme de tourbe qui les recouvre aujourd'hui. La production de la tourbe par les débris de la végétation des forêts n'est point une circonstance qui doive embarrasser, dans l'explication de ce phénomène: les observations des naturalistes l'ont mise hors de doute (1), du moins pour les pays froids, & cela sert à expliquer certains phénomènes semblables que l'on observe dans différentes parties de l'Angleterre.

(1) Voy. le Mémoire de Lord Cromarty, sur la tourbe. *Transf. philos.* Vol. XXVII. p. 296. (A)

B O T A N I Q U E.

FLORA RUSTICA *exhibiting*, &c. Flore des champs, accompagnée de figures exactes des plantes qui sont utiles ou nuisibles à l'Agriculture. Par Th. MARTYN, B. D. & F. R. S. &c. Londres, 4 vol. in-8. 144 pl. col.

Article communiqué.

LES Arts sont enfans des sciences : celles-ci doivent donc diriger les opérations des premiers, & c'est en se prêtant un mutuel appui que les uns & les autres s'élevent au degré de perfection dont ils sont susceptibles. Plus un Art est compliqué & plus ceux qui le pratiquent sentent la dépendance où ils sont, & s'empressent de suivre les directions que les savans leur fournissent ; c'est ainsi que l'horloger, le navigateur, l'aéronaute, sont entièrement soumis au géometre, à l'astronome, au physicien ; mais dans les arts qui sont peu compliqués, c'est-à-dire qui altèrent peu les corps naturels, on oublie facilement cette dépendance ; la routine décide uniquement le choix des procédés & des matieres employées par les Artistes, & de là résulte que les arts les plus simples sont les moins perfectionnés ; l'agriculture est un exemple frappant de ce que j'avance ;

elle est la source où tous les arts viennent puiser leurs matériaux ; mais elle est restée en arrière au milieu des progrès de la civilisation , & cela tient en partie à ce que le flambeau des sciences ne l'a pas encore suffisamment éclairée. Ceci est également un reproche aux agriculteurs qui n'ont point cherché à appliquer à la culture les découvertes scientifiques , & aux savans , qui ne se sont point assez rapprochés des premiers. La physique végétale peut rendre à l'agriculture des services éminens , & la botanique elle-même peut lui être fort utile en indiquant de nouvelles plantes à cultiver , en faisant connoître plus précisément celles qui font la richesse de l'agriculteur : cette application de la botanique à l'agriculture a été faite avec plus de soin en Angleterre que sur le continent ; j'en appelle aux ouvrages de Ray , de Stillingfleet , de Miller , de Curtis ; & à l'ouvrage même dont je vais donner une idée.

Je considérerai cet ouvrage sous deux points de vue , 1°. sous le rapport de la botanique. 2°. sous celui de l'agriculture.

La *Flora Rustica* donne la description de 144 plantes choisies parmi toutes celles qui sont les plus communes dans les champs , les prés & les lieux cultivés ; elle n'a point été achevée , comme on le voit par le petit nombre de plantes qu'elle renferme ; à des descriptions exactes & concises , sont jointes des figures qui

n'ont pas un grand degré de perfection. La petitesse du format a forcé le peintre à ne présenter qu'un fragment de la plante trop petit pour en donner une idée toujours suffisante. Les couleurs sont mises le plus souvent avec peu de soin, & dans les plantes à découpures menues, comme les ombellifères, on ne retrouve point dans les figures cette élégance & cette légèreté qui les caractérisent.

Sous le point de vue botanique on trouve de l'exactitude, mais peu de choses nouvelles dans cet ouvrage; le genre des *Trifolium* est celui qui est traité avec le plus de soin; l'auteur en décrit sept espèces qu'il distingue, avec des caractères plus précis qu'on ne l'avoit fait jusques à présent.

1°. Le *Tr. Alpestre* (fig. 1.) a les épis fermés, les corolles presque égales, les stipules setacées divergentes, les folioles lancéolées, les tiges droites, roides & simples.

2°. Le *Tr. medium* a les épis laches, presque globuleux, velus & sessiles, les corolles inégales, les stipules en alène divergentes; les tiges un peu flexueuses, branchues & pubescentes (fig. 2.)

3°. *Tr. pratense* a les épis fermés; les corolles inégales, quatre dents du calice égales, stipules terminées en pointe aigue, tiges courbées au bas. (fig. 3.)

4°. *Tr. rubens* a les tiges droites, les feuilles finement dentées en scie, les épis longs &

villeux, les corolles monopétales. (*fig. 9.*)

5°. *Tr. flexuosum* (*fig. 13.*) a les épis de fleurs laches ; corolles presqu'égales , stipules en aïene , convergentes ; tiges flexueuses branchues , c'est le *Tr. medium* Lin. Suec.

6°. *Tr. lupinaster* (*fig. 16.*) a les têtes de fleurs partagées par le milieu , les feuilles quinées & sessiles , les légumes polyspermes.

7°. Le *Tr. repens* (*fig. 34.*) a les têtes de fleurs en petites ombellés ; les légumes tetraspermes , les tiges étalées.

Comme ces especes excepté la 6°. sont originaires de notre pays , j'ai cru qu'il seroit agréable à ceux qui étudient les végétaux indigenes de trouver ici leurs caracteres ; mais je me hâte d'en venir aux applications de la botanique à l'agriculture.

Parmi les plantes qui nous sont utiles , on place au premier rang la nombreuse famille des graminées ; ces végétaux fournissent notre nourriture la plus essentielle , & celle des bestiaux & des animaux qui nous servent. Mais toutes ne possèdent pas ces qualités au même degré , & il est important de les distinguer : les caracteres de ces plantes peuvent paroître minutieux & inutiles à ceux qui ont peu réfléchi sur ce sujet , mais ils n'en sont pas moins réels , constans , & il seroit à desirer que dans la culture des prairies , on eût moins négligé le choix des gramens qu'on y introduisoit. On ne

mélange pas dans les prairies artificielles le trèfle, la luzerne & le fain-foin, pour quoi donc semer ensemble le *phleum pratense*, la *briza media*, l'*alopecurus pratensis*, &c. qui ont des habitudes tout aussi différentes. Entrons dans quelques détails sur les divers graminés.

L'*anthoxanthum odoratum* (fig. 23.) qui croit dans tous les terrains, paroît plaire aux moutons; il a l'avantage de fleurir de bonne heure, en sorte qu'il peut se ressemer avant qu'on le fauche. Curtis en recommande fortement la culture.

L'*alopecurus pratensis* (fig. 6.) réunit tous les avantages que peut désirer le cultivateur, l'abondance, la bonne qualité, une prompte maturité & des semences faciles à recueillir. L'*alopecurus agrestis* (fig. 22.) qui n'en diffère que par ses glumes glabres & mousses, lui est inférieur en bonté; l'*alopecurus geniculatus* (fig. 97.) est mangé par le bétail; mais les plantes coudées ont le désavantage de perdre un peu de place.

Le *phleum pratense* (fig. 5.) est cultivé depuis 1750 environ, sous le nom de *Timothy-grass* parce que Timothée Flawson l'a mis le premier en usage à New-York; on l'a apporté en Angleterre en 1763; mais sa réputation a été de courte durée, son foin est dur; il ne vient que dans les terrains humides. Haller dans une dissertation sur les plantes à fourrage de la Suisse en 1770, (*Mém. Econ. de Berns*) recommande qu'on le distingue du *phleum nodosum* dont le foin est encore plus maigre.

Le *phalaris canariensis* (fig. 17.) a été naturalisé en Europe dans ce siècle; ce fourrage est cultivé avec succès dans le Comté de Kent près de Sandwich, & dans l'Isle de Thanet, on le sème à la fin de février à la quantité de six gallons par acre; Miller croit que la moitié suffiroit, la largeur de ses feuilles indique l'abondance qu'il doit procurer, & ce seroit une acquisition intéressante pour notre pays. Peut-être la *phalaris aquatica* (fig. 18.) qui est originaire d'Egypte pourroit-elle être utile.

Holcus lanatus (fig. 118.) est vanté par Haller pour les chevres; mais n'est pas estimé en Angleterre, ses tiges servent à faire des cordes de bateaux dans l'Isle de Skye.

Melica nutans (fig. 65.) sert, dit Pennant, dans l'Isle de Rusa en Ecosse, à faire des cordes pour des filets à poissons, qui restent long-temps sans se pourrir; la *Melica uniflora* (fig. 64.) est trop rare pour faire un objet de culture.

Dactylis glomerata (fig. 14.) a une tête si pesante que les fortes pluies l'écrasent; elle est d'ailleurs productive, mais son foin est dur.

Cynosurus cæruleus (fig. 20.) originaire de nos montagnes, est recommandable pour la culture, surtout à cause de la promptitude avec laquelle il fleurit.

Lolium perenne (fig. 44.) est le fameux Ray-grass. Le premier auteur qui parle de cette culture est Plot en 1677, en décrivant le Comté

d'Oxford; on l'a recherché à cause de la facilité avec laquelle il se sème; Haller dit que les brebis le préfèrent à la paille; Curtis dit, au contraire qu'il ne leur convient pas. Il croît dans les terrains forts, argilleux & humides, & vit trois ans.

L'*elymus* & l'*arundo arenaria* ne servent au bord de la mer qu'à retenir les sables.

Parmi les *hordeum*, l'*hordeum pratense* (fig. 108) qui est la var. β de l'*hordeum murinum* de Linné est un bon fourrage, mais peu productif; mais le vrai *hordeum murinum* (fig. 43.) est dangereux pour les chevaux au rapport de Curtis à cause des pointes de ses épis. Les autres ne sont pas utiles dans les prairies.

Le *tritium repens* (fig. 124.) est un fléau des jardins & des terres de labour; on l'extirpe en coupant les racines; ces racines utiles en médecine servent à Naples à nourrir les chevaux. On remplace cette racine en Italie avec celle du *Panicum Dactylon* (fig. 77.)

Les *bromus sterilis*, *asper* & *mollis* (fig. 99, 125, 126.) sont ou inutiles ou dangereux.

Parmi les *festuca*, il faut remarquer la *Festuca pratensis* (fig. 84.) que Curtis recommande comme fourrage à cause de la largeur de ses feuilles, & l'abondance de ses graines, & la *Festuca fluitans* (fig. 113.) dont nos ruisseaux sont garnis; les chevaux, les vaches, & les truies en sont friands. Ses semences qui sont douces & nour-

riffantes sont récoltées en Allemagne & en Pologne, sous le nom de semences de manne; & on les estime dans les soupes & les gruaux, à cause de leur délicatesse; bien plus, ils la réduisent en farine & en font un pain, un peu inférieur à celui de froment. Le son est donné aux chevaux qui ont des vers, en les empêchant de boire pendant quelques heures. Les poules d'eau & les poissons, & en particulier les truites sont plus abondantes dans les ruisseaux où croit cette plante. Schreber dit que la manne se tire aussi du *Panicum sanguinale* qu'on cultive dans ce but en Allemagne. Pourquoi n'imitons-nous pas ces exemples d'industrie & d'économie?

Le *Poa annua* (fig. 98) est, selon la remarque de Curtis, la seule plante annuelle qui pousse des drageons d'où s'élèvent de nouvelles tiges; cette herbe est très-incommode dans les allées de jardins, d'où on a de la peine à l'extirper. Curtis conseille pour cela de les arroser avec de l'eau bouillante. Cette plante peut à ce qui paroît devenir utile; on la cultive dans le Suffolk, & elle y sert aux besoins journaliers des troupeaux, auxquels son feuillage tendre est agréable; elle n'acquiert jamais une grande hauteur; on recueille sa semence dans les mois de mai & de juin & on peut encore la multiplier en éclatant ses racines (1).

(1) On a à la Rochelle des prairies naturelles d'une

Les *Brisa* ne méritent pas d'être cultivés. L'*avena elatior* (fig. 67) qui a été pris à tort pour le ray-grass, & qui est le fromental des Français, est un excellent fourrage. (1) L'*avena flavescens* (fig. 112.) peut devenir un pâturage de brebis.

Telles sont les principales graminées dont on peut tirer parti dans l'agriculture. Presque toutes sont originaires de nos régions, & plusieurs sont totalement négligées; nous allons chercher au loin des végétaux étrangers à notre sol avant d'utiliser ceux qu'il nous a fournis! je n'ai point parlé dans cette rapide énumération des gramens décrits dans la *Flora rustica* qui n'offroient pas d'utilité. Passons maintenant à l'examen abrégé de la 2^e. famille d'où les agriculteurs tirent leurs richesses, je veux parler de la famille des *Légumineuses*.

J'ai déjà eu occasion de parler des trèfles sous le point de vue botanique & je ne trouve rien

espèce de *Poa* qu'on y nomme *Myfote*; il ne semble pas devoir donner un fourrage abondant, vu que ses feuilles sont presque linéaires, & que sa tige courte ne paroît pas taller beaucoup. (R)

(1) Haller dit dans les *Mém. de la Soc. Économiq. de Berne*, que Stanislas fit cultiver le fromental en Lorraine en écartant les troupeaux des champs où il étoit semé; ce fourrage dure 10 ans, se fauche trois fois par an, & produit 18000 livres de foin par arpent; il n'est point cultivé en Suisse quoiqu'il y croisse spontanément. (R)

de particulier sur la culture de ces plantes (1). Le genre des *Medicago* offre plusieurs espèces intéressantes pour les prairies artificielles ; tout le monde connoît la *Medicago sativa* ou Luzerne (fig. 48.) originaire d'Orient d'où elle a été apportée en Grece du temps de la guerre de Darius. Elle n'a été introduite en Angleterre qu'en 1550 : Miller & Tull conseillent de la semer en la jetant avec la main. La *M. lupulina* (fig. 16.) est usitée en Angleterre, ainsi que la *M. Falcate* (fig. 86.) Mais Haller objecte contre elle la dureté de ses tiges. La *M. arborea* (fig. 100) est cultivée en Italie & paroît être le Cítise vanté par Virgile.

L'*Hedysarum onobrychis* ou sain-foin (fig. 47) est originaire des sols calcaires & se trouve surtout sur les éminences ; il étoit déjà cultivé en 1540 en Angleterre & c'est en effet un four-

(1) L'énumération des trèfles cultivés que fait Martyn n'est pas complete ; 1°. le *Tr. hybridum* est cultivé en France au rapport de Haller ; ce fourrage est bon, mais annuel 2°. le *Tr. fragiferum* est cultivé en Irlande où ses tiges s'élevent dit encore Haller jusqu'à sept pieds, 3°. le *Tr. Stellatum* est cultivé aux pieds des Pyrénées sous le nom de faronche ; il est annuel ; on le sème en automne & on le récolte en avril ; dans le même champ, on sème du froment ; ce faronche se sème en le jetant sur le terrain ; son herbe fraîche est aussi bonne pour les chevaux que l'avoine, 4°. le *Tr. melilotus officinalis* est commun dans tous les prés & s'y fait distinguer par son odeur exquise. (R)

rage précieux ; dans le même genre l'*H. coronarium* si remarquable par sa beauté est cultivé en Italie avec un grand succès à cause de son abondance & de la bonté de son herbe (1). Mais il est temps de dire un mot d'une plante dont la culture a été recommandée par tous les Botanistes-Agricoles, mais qui a toujours été négligée ; c'est la *coronilla varia* (fig. 15) ; elle étoit cultivée au milieu du siècle passé au rapport de Parkinson. Pourquoi ne pas remettre cette culture en vigueur ; cette plante est commune le long de nos haies seches ; l'abondance de ses graines promet une semaison facile à l'agriculteur laborieux, & l'abondance de ses feuilles promet de le récompenser de ses soins ; le seul inconvénient de cette plante comme fourrage, est qu'elle est couchée, ce qui la rendroit difficile à faucher, la culture la redresseroit peut-être.

Les *Lathirus latifolius* (fig. 8.) & *pratensis* (fig. 52) sont indiqués par Martyn, & je pense, avec raison, comme de bons fourrages dignes d'être essayés par les agriculteurs qui aiment à enrichir leur pays & la société de nouvelles branches d'industrie. Il indique encore *Vicia cracca* (fig. 117) à cause de l'abondance de ses

(1) N'est ce point le *fulla* du royaume de Naples ? On le sème en octobre dans les chaumes qu'on brûle après, & on le récolte au mois de juin ; Haller conseille encore l'*Hedysarum alpinum* & l'*H. obscurum*. (R)

graines & recommande *Vicia sativa* comme fourragé pour le bétail & les chevaux. Le *Lotus Corniculatus* est égal ou supérieur en bonté au trefle (1).

Outre les graminées & les légumineuses, il est encore quelques autres plantes intéressantes par leurs usages économiques & ruraux; Martyn a fait entrer dans son ouvrage toutes celles qui sont très-communes dans les lieux cultivés; nous ne le suivrons point dans des détails qui n'offriroient aucun intérêt & nous n'en extrairons que quelques mots sur les plantes qui offrent des utilités nouvelles ou peu connues.

Le *Plantago lanceolata* (fig. 67) a été conseillé comme prairie sous le nom de *Rib-grass*. Le grand accroissement qu'il prend dans les

(1) La liste des légumineuses qui peuvent être utiles est plus étendue que celle que donne Martyn, & il l'auroit sans doute augmentée s'il eut fini son utile ouvrage. Bohadsch a conseillé le *robinia pseudo-acacia* pour le fourrage des bestiaux, & il a été cultivé en Allemagne. Haller recommande l'*orobus luteus*, l'*astragalus pilosus*, & *vesicarius*; tout le genre des astragales semble propre à la culture; mais j'y distingue surtout l'astragale à feuilles de réglisse, *a. glycyphyllos*, tout annonce une récolte abondante & un bon fourrage, en cultivant cette plante indigène; elle est vivace; elle pousse des tiges longues, nombreuses & ramenes; ses feuilles sont grandes & nombreuses, ses graines se forment abondamment & seroient faciles à recueillir. Les troupeaux paroissent aimer cette herbe, pourquoi donc la réléguer parmi les plantes inutiles. (R)

terrains humides sembloit indiquer sa culture ; mais l'expérience n'a point eu le succès qu'on avoit annoncé ; Haller vante *l'alchemilla* & lui attribue la bonté des prés alpins ; Dickenfon l'a semée & récoltée , mais aucun animal n'a voulu manger de ce foin.

L'ugrimonia eupatorium (fig. 37) est inutile aux troupeaux ; mais elle est bonne sous forme de thé contre les hemorrhagies & les obstructions ; les Canadiens employent sa racine contre la fièvre brûlante. Hill la conseille pour la jaunisse. Si on la cueille au moment de la floraison elle donne une teinte nankin , & dans le temps de la maturité ce jaune est foncé & de bon teint (1).

Cichorium Intybus (fig. 144) , ou la chicorée sauvage a été introduite dans la culture en 1788 par Arthur Young : en Lombardie elle passe pour augmenter le lait & la chair des troupeaux ; elle offre une récolte abondante , soit qu'on la coupe à mesure que les besoins de la ferme l'exigent , soit qu'on l'établisse en coupe réglée ; elle en fournit 3 pendant 3 ou 4 ans , & ensuite n'en donne plus que 2 ; la culture aggrandit les feuilles de cette plante.

Martyn décrit (fig. 10. 11. 12.) trois variétés du chêne *rouvre* (*Quercus robur*) l'une

(1) Pennant rapporte qu'à Cannai dans les Isles Hébrides on se sert de l'écorce de saule & des racines de tormentille pour tanner , & qu'à Rum , on se sert de cette dernière contre la dysenterie. (R)

à feuilles pétiolées dès leur naissance ; la 2.^e à feuilles aussi pétiolées mais très-printannières , & ayant des feuilles moins épaisses & d'un verd clair ; celle-ci est le vrai *Robur* des anciens. La 3.^e variété a les feuilles sessiles ; l'agriculteur ne doit point négliger ces considérations peu importantes en apparence , puisqu'elles lui fourniront un moyen de reconnoître la qualité du bois ; la variété à feuilles sessiles a le bois meilleur , plus fort & plus compact que les chênes à feuilles pédiculées (1).

Ici je termine cet extrait de la *Flora Rustica* qui comme on a pu en juger par ce que j'en ai dit , est un ouvrage utile à répandre parmi les agriculteurs qui aiment à mettre de la précision dans leurs idées , & qui ne craignent pas de tenter quelques essais pour augmenter la masse de nos richesses réelles. Il est fâcheux que cet ouvrage n'ait pas été achevé , étant aussi avancé qu'il l'étoit.

A. P. DECANDOLLE.

(1) Cette observation coïncide avec celles que j'ai eu occasion de faire sur les chênes de notre pays. Il m'a paru que les chênes à feuilles sessiles sont très-communs dans la plaine , tandis que ceux à feuilles pétiolées le sont sur les montagnes ; j'avois soupçonné que peut-être cette absence de parenchyme dans la partie inférieure de la nervure principale , tenoit à une diminution de la sève dans les terrains pierreux des montagnes ; la circonstance que leur bois est aussi moins compact , semble justifier cette idée. C'est au reste au printemps qu'on observe le plus facilement la différence entre ces variétés de chêne. (R)

A R T S.

SPECIFICATION OF THE PATENT, &c. Patente accordée à James WILSON, Esq. pour une disposition particulière qu'il a inventée dans les armes à feu, au moyen de laquelle la poudre est mise à l'abri des effets du mauvais temps, beaucoup plus sûrement & à moins de frais, que par aucune méthode connue jusqu'à présent.

« **A** tous ceux qui les présentes verront, &c. Moi J. W. déclare que mon invention est décrite comme suit : »

» Son objet est de mettre à l'abri de l'humidité, la poudre dans le bassinet des armes à feu ; d'une manière facile, & à peu de frais. »

« D'abord, pour l'adapter aux platines ordinaires déjà construites, je propose d'appliquer, soit en queue d'hironde, soit par vis ou par soudure, dans le côté de la platine & du bassinet vers le canon de l'arme, une pièce de laiton ou de fer, disposée en forme d'arc, d'environ une ligne de largeur, qui recouvre la lumière & s'élève du côté qui touche le canon, avec un talus en dessus, sous un angle d'environ 60 degrés ; par ce moyen, l'eau qui pourroit s'insinuer entre le canon & la batterie, dans l'en-

droit

-droit où la poudre est la plus exposée, est conduite de part & d'autre de l'arc par la gouttière que forme le biseau ou talus en contact avec le canon. Ce biseau fait tout l'avantage de cette invention, parce qu'il empêche l'eau d'arriver dans le bassinet, attendu qu'elle doit prendre plus volontiers la direction du conduit qui l'invite à descendre de part & d'autre de la batterie, qu'elle ne montera par dessus le biseau. Lorsque le vieux bassinet l'exige, j'en forme un nouveau par une pièce que j'adopte dessus, & qui, dans ce cas, se joint avec l'arc & en élève les côtés d'environ $\frac{1}{2}$ ligne; ce qui approfondit l'espace destiné de part & d'autre, au passage de l'eau; cet espace s'augmente encore en rabattant le devant & le derrière entre le bassinet & son rebord, autant qu'on peut le faire sans nuire à la platine, qui permet souvent assez de profondeur pour la sûreté sans qu'on élève le bassinet. Lorsque cette dernière pièce est construite ordinairement d'après mon principe, il ne faut rien de plus que l'arc & la batterie, car l'élévation du bassinet, ou la créusure d'une gouttière deviennent inutiles puisque l'eau s'écoule immédiatement. De plus, la batterie est excavée ou creusée en dessous, de manière à ressembler le plus qu'il est possible au bassinet inférieur ordinaire, en le supposant d'une profondeur modérée; & elle dépasse entièrement le même bassinet, dont les bords sont

linés en tranchant ; la batterie ferme exactement , mais pas au degré qui l'empêche de joindre lorsqu'il y a la moindre saleté dans les parties frottantes , ainsi que cela arrive dans les batteries à recouvrement. La batterie descend jusques vers le bas du talus contre le canon , avec un rebord creux , ou en chamfrein , de manière à ne pas s'appuyer dans le haut contre le talus de l'arc , pour prévenir les inconvéniens qu'occasionneroit la pression & l'accumulation des saletés lorsqu'on auroit tiré fréquemment. Il est bon d'observer aussi , que les côtés du bassinet étant taillés en tranchant , & se trouvant en contact avec le creux de la batterie , les surfaces opposées l'une à l'autre sont très-peu considérables & favorisent la séparation des saletés , plutôt que de les ramasser , ainsi que cela a lieu dans les surfaces planes. On a reconnu cet avantage après avoir tiré 47 coups sans rien essuyer. Lorsqu'on fait les platines à neuf , il faut préférer le bassinet à jour , & on dispose l'arc ainsi qu'on l'a décrit. On peut ajouter l'arc en talus au canon , au lieu de le mettre à la platine ; & on peut aussi l'y visser , ou l'y insérer à queue d'hironde. Cette disposition a l'avantage de prévenir tous les inconvéniens qui résulteroient de la négligence à visser la platine bien ferrée contre le canon ; & pour éviter qu'il ne reste des doutes sur la jonction entre le canon & l'arc , celui-ci se projette d'environ $\frac{1}{4}$ de ligne en dehors de la platine , & est inséré dans le canon. En foi de quoi , &c.

A N N O N C E S.

AN INQUIRY INTO THE CAUSES AND EFFECTS OF THE VARIOLÆ VACCINÆ, &c. By Edward JENNER, M. D. F. R. S., &c. London 1798. Recherches sur les causes & les effets de la Petite-vérole des vaches, par Edouard JENNER, Dr. Méd. Membre de la Société Royale, &c. Londres 1798.

CET ouvrage contient l'exposé d'une découverte fort singulière, & qui peut jeter un grand jour sur la théorie des maladies susceptibles d'être inoculées; en même temps qu'elle peut devenir fort utile pour en préserver sans danger l'espèce humaine. Nous en donnerons dans un prochain numéro un Extrait détaillé. Nous nous empressons en attendant de faire connoître en peu de mots à nos Lecteurs, en quoi la découverte consiste, & nous les invitons à suspendre leur jugement sur les faits que nous annonçons, jusqu'à-ce qu'ils en aient lu le développement & la preuve.

On fait que les chevaux fatigués sont sujets à une maladie qu'on appelle le javart (*the grease*). C'est une tumeur inflammatoire qui leur vient au bas de la jambe, & qui suppure comme un gros furoncle. Dans les pays de pâturages, où les laiteries occupent tout le monde, hommes, femmes & enfans, il arrive souvent que les mêmes hommes qui soignent les chevaux malades traitent aussi les vaches, & leur communiquent la maladie, qui se manifeste par des pustules irrégulières sur le pis de la vache. Ces pustules sont d'un bleu pâle, un peu livide, & entourées d'un cercle érysipélateux. L'animal devient bientôt malade, & son lait diminue beaucoup. Mais c'est l'affaire de quelques jours. Cependant la maladie se communique pour l'ordinaire aux hommes & aux femmes qui traitent les vaches dans cet

196 PETITE VÉROLE DES VACHES.

état. Elle ressemble alors parfaitement & par sa marche, & par l'apparence de la pustule qui vient dans l'endroit infecté, & par les symptômes fébriles qui l'accompagnent, à une Petite-vérole inoculée dans laquelle il n'y auroit aucune éruption; & c'est cette ressemblance qui lui a fait donner dans le pays le nom de Petite-vérole des vaches (*the Cow-pox*).

Or, le Dr. Edward Jenner de Berkeley, dans le Comté de Gloucester, a démontré par une multitude d'observations & d'expériences très-bien faites que tous ceux qui ont eu cette maladie, pourvu qu'ils l'aient prise, non du cheval malade, ce qui arrive quelquefois, mais d'une vache infectée, sont pour toujours à l'abri de la Petite-vérole ordinaire, & incapables de la prendre, soit par contagion, soit par inoculation.

Et comme la Petite-vérole des vaches n'est jamais accompagnée d'aucun danger; comme elle n'est suivie d'aucune éruption après la fièvre, & que d'un autre côté elle n'est jamais contagieuse que par inoculation, c'est-à-dire par le contact immédiat du pus sur la peau mise à nud, & dépouillée de l'épiderme, il est évident qu'il y auroit un grand avantage à employer ce préservatif contre la Petite-vérole ordinaire, plutôt que l'inoculation de la Petite-vérole même. L'on n'auroit plus à craindre ni les dangers d'une éruption trop abondante, ni l'inconvénient très-grave de répandre la contagion.

Ces considérations ont déterminé le Dr. Jenner & quelques autres Praticiens de l'Angleterre à inoculer de préférence la Petite-vérole des vaches pour préserver de la Petite-vérole ordinaire; & ces inoculations très-nombreuses ont eu le plus grand succès, comme on le verra dans l'ouvrage que nous annonçons, dans lequel on trouvera d'ailleurs des détails de théorie & de pratique fort intéressans & fort inattendus. (O)

E R R A T A.

Page 49 de ce Vol. lig. 6. & à la note (Wolfran), lisez :
Wolfram.

P H Y S I Q U E.

ESSAYS ON THE MICROSCOPE, CONTAINING;
 &c. Essais sur le microscope , contenant
 une description des microscopes les plus
 parfaits; une histoire générale des insectes;
 leurs transformations, leurs habitudes; leur
 économie. Détails sur les diverses especes &
 les propriétés singulieres des hydres, & des
 rotiferes; description de trois cent quatre-
 vingt-trois animaleules différens; & catalo-
 gue d'objets intéressans; exposition de l'or-
 ganisation du bois & des cristallisations salines.
 Par feu G. ADAMS; seconde édition avec
 des additions considérables par F. KANMA-
 CHER, Membre de la Société Linn. In-4.
 grand format, 714 p. avec trente-deux plan-
 ches in-folio. Londres W. & S. Jones,
 Holborn; 1798. prix 1 liv. sterl. 8 shell.
 broché.

Les sciences & les arts ont des rapports nom-
 breux; une dépendance réciproque & intime;
 qui les fera toujours marcher de front vers
 la perfection ou la décadence. Le savant, guide
 & assure les pas de l'artiste; celui-ci multiplie,
 à son tour, les moyens du savant; il fabrique

ses armes ; la conquête de vérités nouvelles est , pour l'ordinaire , le fruit de leurs efforts réunis ; ils partagent alors la gloire du succès , & triomphent ensemble sans jalousie.

Mais la marche est bien plus rapide , elle présente les facultés humaines sous un jour plus brillant , lorsque le même individu peut manier la plume & la lime tour-à-tour ; passer de l'observatoire à l'atelier , ou du cabinet au laboratoire ; quant il fait à la fois inventer , fabriquer , & décrire ; lorsqu'il possède , en un mot , & la tête qui médite , & la main qui exécute. Point de partage alors , point de dépendance réciproque ; l'homme est en possession de sa force toute entière ; il chemine vers le but sans détours inutiles.

George ADAMS , auteur de l'ouvrage que nous avons sous les yeux , réunissoit bien des traits du modèle dont on vient de tracer l'esquisse. Héritier d'une réputation déjà acquise par son père , dans l'art de construire les instrumens d'astronomie & de physique , il l'avoit beaucoup étendue ; & ces appareils divers , construits dans ses ateliers & continuellement perfectionnés sous ses directions , faisoient pour lui l'objet d'un commerce considérable dans les deux mondes. L'ambition de l'artiste devoit sans doute , être satisfaite ; mais entraîné par goût vers la carrière des sciences , animé dans leur culture par un esprit public , une sorte de loyauté

qui ne lui permettoit de jouir qu'à demi des découvertes jusqu'à ce qu'il eût contribué à les répandre, il écrivoit avec facilité & avec un zèle infatigable. Il a publié à diverses époques, sur l'astronomie, la géographie, la géométrie, l'optique, & sur la physique expérimentale, des ouvrages précieux (1), & il en préparoit d'au-

(1) Ces ouvrages, dont on trouve les dernières éditions chez W. & S. Jones, Holborn, forment une collection qui mérite toute l'attention des amateurs; ils portent les titres suivans.

Essais Géométriques & Graphiques; contenant 1°. un choix de *Problèmes géométriques* dont plusieurs n'ont point été publiés. 2°. La description & l'usage des instrumens dont on garnit à l'ordinaire les *Etuis de mathématiques*; on y a joint la description & l'usage de plusieurs instrumens nouveaux, employés dans la Géométrie pratique. 3°. Un système complet d'*Arpentage*, avec le détail de plusieurs perfectionnemens importans introduits dans cet art utile; on y a joint la description des *Théodolites*, *planchettes*, & autres instrumens d'arpentage. 4°. Les méthodes de *Nivellement*, pour la conduite des eaux, avec une description du *Niveau à bulle d'air* perfectionné. 5°. Un Cours de *Géométrie pratique militaire*, telle qu'on l'enseigne aux écoles de Woolwich. 6°. Un Essai abrégé de *Perspective*. 1 vol. 8°. avec 35 planches. — 14 shell. broc.

Essai sur l'Electricité, dans lequel on développe les principes de cette science; on décrit les divers instrumens qui ont été imaginés soit pour en éclaircir la théorie, soit pour en rendre la pratique intéressante. On y a joint une lettre à l'auteur, par Mr.

tres lorsqu'une mort prématurée l'a enlevé ; âgé de 45 ans seulement , aux sciences , aux arts , & à ses nombreux amis. Son frere , qui avoit fait à Genève une partie de ses études , lui a succédé dans la direction de son commerce & de ses ateliers ; & il y porte un talent &

J. Birch , sur l'Electricité médicale. 4^e. édit. 1 vol. 8^o. avec 6 planches. Prix 6 shell. broché.

Essai sur la vision ; dans lequel on décrit en abrégé la construction de l'œil & la nature de la vision ; cet ouvrage est particulièrement destiné aux personnes dont la vue s'est affoiblie , & il leur indique les moyens de la conserver , en désignant les cas dans lesquels il convient de faire usage de bécicles , & les moyens de les choisir sans risquer d'altérer sa vue. 8^o. seconde édit. avec fig. Prix 3 shell. broché.

Essais Astronomiques & Géographiques ; contenant , 1^o. une exposition étendue des principes généraux de l'*astronomie* , avec un détail de toutes les découvertes du Dr. *Herschel*. 2^o. *L'usage des Globes* , avec la solution d'un grand nombre de problèmes arrangés en classes distinctes & accompagnés d'informations curieuses. 3^o. La description & l'usage des *Orrerys & Planetaires*. 4^o. Une introduction à l'*Astronomie pratique* , 3^e. édit. 8^o. avec 16 planches. Prix 10 sh. 6 d. broché. NB. L'introduction à l'*astronomie pratique* où l'usage du *Quart de Cercle & de l'Equatorial* , avec 4 planches , se vend séparément 2 sh. 6 d.

Leçons de Physique théorique & expérimentale , 2^{de}. édit. en 5 vol. 8^o. avec plus de 40 grandes planches.

Essais sur le Microscope , &c. C'est celui dont nous donnons l'analyse.

une activité qui lui promettent des succès constants.

Nous donnerons une idée du genre de l'ouvrage que nous annonçons, par un exposé rapide, tiré de la préface même de l'auteur ; & nous y joindrons quelques morceaux détachés, qui feront connoître sa manière, & apprécier son travail.

Le premier chapitre contient une histoire abrégée de l'invention du microscope, & des perfectionnemens successifs de cet appareil. On y trouve le procédé du P. Della Torre pour faire ses globules de verre qui avoient acquis tant de célébrité. Le second chapitre traite de la vision ; & l'auteur y développe très-nettement la raison de l'avantage optique qu'on obtient dans l'usage des verres lenticulaires pour grossir les objets. Il n'a introduit dans ce chapitre que les connoissances strictement nécessaires à l'exposé des vérités qu'il lui importoit de rendre saillantes.

Dans le troisieme chapitre il décrit les microscopes les plus perfectionnés & quelques autres, qui sont d'un usage assez général. Les avantages respectifs de chacun de ces instrumens sont indiqués, afin que le lecteur puisse choisir ceux qui lui conviendront le mieux dans un cas donné. Les gravures qui représentent ces divers instrumens sont si belles & si nettes qu'on peut suivre les descriptions avec beaucoup de facilité.

Le quatrième chapitre renferme l'indication des méthodes à employer dans la préparation des objets qu'on se propose d'observer, & les précautions à suivre dans l'usage des divers microscopes.

L'auteur, après avoir, dans ces quatre chapitres, familiarisé le lecteur avec la construction & l'usage de tous les appareils microscopiques; & l'avoir, en quelque sorte, muni de tous les moyens d'étude dans ce genre, commence, dès le cinquième, un cours d'observations, dirigées en particulier vers l'entomologie. Ce cours occupe plus des deux tiers de l'ouvrage & voici comment l'auteur explique & justifie cette déviation du plan qu'il avoit d'abord adopté.

» Lorsque j'entrepris, dit-il, les Essais que je publie, je me proposois seulement de réimprimer l'ouvrage de mon pere intitulé, *Micrographia illustrata*; mais je vis bientôt que cet ouvrage & celui de Baker, étoient l'un & l'autre, imparfaits. A l'époque où ces auteurs écrivoient, l'Histoire Naturelle étoit bien éloignée du degré de perfection qu'elle a atteint depuis, & leurs erreurs sont excusables par cette considération. J'ai donc cherché d'abord à rectifier ces erreurs; & après avoir dans mon 5. chapitre, fait quelques réflexions générales sur l'utilité de l'Histoire Naturelle, j'ai traité ce sujet dans un ordre systématique, & en ex-

posant aux amateurs les principes de la classification Linnéenne des insectes, je leur ai fourni le moyen de les distinguer les uns des autres, d'étudier leur organisation, d'éviter les erreurs & de propager les découvertes dans ce genre. »

Comme les transformations de ces animaux constituent l'une des branches principales de leur histoire, & qu'elles fournissent au microscope un grand nombre d'objets curieux, j'en ai donné une description fort étendue. J'y ai été acheminé par la considération des erreurs qu'avoient commises à cet égard plusieurs Naturalistes; pour n'avoir pas étudié ces métamorphoses avec assez d'attention. Je voulois m'en tenir-là; mais entraîné par les charmes de mon sujet, j'ai décrit avec détail les traits saillans de l'organisation de ces petites créatures, & si mes lecteurs éprouvoient, en parcourant cette partie de mon ouvrage, autant de plaisir que j'en ai eu à l'écrire; si ce sentiment leur donnoit quelque prédilection pour cette branche des études naturelles; s'il les décidoit seulement à entreprendre la lecture de l'ouvrage étonnant de l'immortel Swammerdam; un de mes souhaits les plus ardens seroit accompli. »

L'auteur donne dans le chapitre suivant, quelque idée de la structure intérieure des insectes. Il rend justice aux travaux du célèbre Eymont & il emprunte de sa description de la chenille du faule, tous les curieux détails qui, en dé-

veloppant l'organisation singulière de cet insecte ; montrent en même temps jusqu'où peut atteindre l'industrie d'un observateur muni de bons instrumens & doué d'une patience à toute épreuve.

Le chapitre suivant est consacré en entier à l'histoire des polypes d'eau douce. Les propriétés de cette classe d'insectes sont tellement extraordinaires, qu'on les considéra, dans le principe, comme aussi opposées au cours régulier de la nature, qu'elles l'étoient aux opinions reçues sur l'animalité. Que dire, en effet, d'animaux qui multiplient par rejettons & de bouture, comme une plante ; qu'on peut enter comme une branche sur une autre ; qu'on peut retourner comme un gant, & qui ne cessent point de vivre & d'exercer les diverses fonctions auxquelles leur organisation fut appropriée ? Ce chapitre est terminé par quelques détails sur les *vorticelle* dont Linné a donné l'énumération.

On se croiroit ici aux derniers confins de l'animalité, & l'œil humain y trouveroit du moins ses limites, sans le secours du microscope. Cet instrument lui découvre dans les infusions des végétaux un Océan peuplé de myriades d'êtres organisés, de formes bizarres & infiniment variées, qui par leur transparence presque parfaite semblent appartenir encore à demi à l'élément aqueux dans lequel ils nagent.

& qui paroissent, par la vivacité de leurs allures, vouloir se hâter de jouir d'une vie que la nature ne leur prêta que pour de courts instans. L'auteur dans son huitieme chapitre, l'un des plus curieux de l'ouvrage, passe en revue, d'après le système de classification du laborieux Müller, trois cent quatre-vingt-trois especes de ces animalcules; en ajoutant aux descriptions de ce Naturaliste des détails intéressans sur ceux de ces insectes qu'on se procure le plus facilement & qui peuvent par cette raison, se présenter le plus fréquemment aux curieux. Ce chapitre occupe 158 pages.

L'auteur expose dans le neuvieme, l'organisation des végétaux & celle des bois en particulier, telle qu'on l'observe sur leurs tranches minces coupées, soit transversalement, soit dans d'autres sens. Il décrit l'instrument avec lequel on se procure ces tranches; c'est un art nouveau, que Mr. Custance a porté à sa perfection. Cet Artiste prépare des assortimens qui comprennent jusqu'à 72 échantillons de bois différens, & que MM. Kanmacher & Jones, éditeurs de l'ouvrage d'Adams, joignent, pour l'ordinaire, aux grands microscopes qui sortent de leur atelier.

On trouve dans le dixieme chapitre des détails sur la cristallisation des substances salines; les Editeurs y ont ajouté un catalogue raisonné des objets qu'on peut conserver en forme de

collection pour exercer & instruire les amateurs.

Le onzième chapitre renferme dans un ordre systématique la description des coquillages microscopiques, principalement tirée du bel ouvrage publié en 1784 par M. Walker. Les figures représentent chaque individu d'abord dans ses dimensions naturelles, & ensuite tel qu'on le voit au foyer de l'instrument. On y a joint le catalogue descriptif d'un grand nombre de graines, qui, pour la plupart, sont très-curieuses à voir au microscope. Les figures qui les représentent, ainsi grossies, sont d'un fini parfait.

Enfin les Editeurs donnent dans le douzième & dernier chapitre, des instructions fort détaillées & très-claires, sur les moyens de recueillir & de conserver les insectes; ils y ont joint un catalogue fort étendu d'objets microscopiques dont la collection pourroit former un cabinet d'un genre nouveau & très-instructif. Ils y font entrer quelques-uns des produits les plus subtils de l'industrie humaine; & les réflexions que leur suggère la comparaison de ces produits avec ceux de la Nature, terminent l'ouvrage. Nous allons transcrire cette péroraison.

— Quel contraste humiliant ! cherchons-nous la beauté, l'harmonie, la perfection, nous les trouvons sans fin dans les œuvres de la Nature : & les produits de l'art, ceux qui nous paroîs-

sent, à l'œil nu, être, le fruit d'une adresse conformée dans l'ouvrier, & dont la beauté & la délicatesse nous charment; ces chefs-d'œuvres n'offrent, sous le microscope, que la preuve humiliante de l'infériorité des produits humains comparés aux glorieuses productions de la Nature. Les plus beaux tissus, les ouvrages de l'aiguille les plus parfaits, paroissent tellement grossiers, à cette épreuve, que nos belles les dédaigneroient autant qu'elles les admirent, si elles étoient jamais tentées de les examiner avec cet instrument. Mais en revanche, plus nous étudions de près les ouvrages de la Nature & mieux nous y découvrons la main puissante qui les ordonna. Considérez cette fleur; là les fibres qui échappent par leur ténuité à l'organe simple de la vue, se trouvent, à l'aide du microscope, composées d'autres fibres de plus, en plus atténuées, dans une progression dont l'œil le mieux armé n'atteint pas le terme: l'ensemble de cette organisation présente une radiance céleste, une richesse de coloris qui semble destinée aux vêtements d'un ange, car ceux d'un monarque de l'Orient, dans toute sa gloire, sont loin d'en approcher. — Jamais donc, ni dans les œuvres de ses mains, ni dans celles de son génie, l'homme mortel n'atteindra la perfection.

On présume volontiers que des Artistes qui s'expriment ainsi ne doivent pas être facilement

satisfaits sur le mérite de leurs propres ouvrages. Ce sentiment est une sorte de garant en leur faveur. — Reprenons notre exposé ; & passons aux détails que nous avons promis.

On ne peut fixer avec précision l'époque où le microscope fut inventé. Si l'on donne ce nom à une simple lentille ou à une sphérule, il n'est point improbable que les Grecs & les Romains n'en aient connu l'usage. Sénèque disoit *littera quamvis minuta & obscura per vitream pilam aqua plenam majores clarioresque cernuntur*. Nat. Quest. L. 1. C. VII (1). Mais les premiers Artistes qui aient fait des microscopes proprement dits, paroissent être Zacharie Jansens & son fils, qui travailloient avant 1619, année dans laquelle Cornelius Drebbel porta en Angleterre un instrument de ce genre fabriqué par eux. Fontana, qui écrivoit en 1646 disoit, de son côté, avoir fait des microscopes en 1618. C'est donc dans les premières années du dix-septième siècle que cet instrument fut inventé.

Le microscope simple, qui est composé d'une seule lentille, grossit d'autant plus que le foyer de cette lentille est plus court. Il faut beaucoup d'habitude pour savoir s'en servir, à cause de la petitesse du champ & de la difficulté de

(1) » On voit les lettres, même très-petites & obscures plus claires & agrandies au moyen d'une boule de verre pleine d'eau. »

porter sur l'objet, s'il est opaque, une lumière suffisante. C'est cependant cet instrument que Leuwenhoeck, Swammerdam, Lyonnet & Ellis ont employé dans leurs profondes & patientes recherches. Vers l'an 1740 le Dr. Lieberkun le perfectionna beaucoup, en ajustant la lentille au milieu d'un petit miroir concave percé au centre & très-poli : ce miroir réfléchit sur l'objet assez de lumière pour qu'il puisse être vu distinctement, malgré la grande dispersion que cause l'action de la lentille.

Nous décrirons, d'après l'auteur, les microscopes que les découvertes de Leuwenhoeck avoient rendus célèbres dans toute l'Europe.

> Ce n'étoit autre chose, dit-il, qu'une très-petite lentille double convexe, logée dans une monture composée de deux plaques rivées ensemble & percées d'un petit trou. On plaçoit l'objet à l'extrémité d'une aiguille d'argent qu'on pouvoit approcher à volonté pour chercher le point de vue ; on fixoit l'objet, s'il étoit solide, avec un peu de colle ; & s'il étoit fluide on en mettoit une goutte sur une lame très-mince de talc, ou bien de verre soufflé, qu'on colloitoit ensuite à l'aiguille. Les lentilles étoient de forces très-différentes, & adaptées chacune au genre de l'objet à examiner ; mais aucune de celles dont il fit présent à la Société Royale, ne grossissoit autant que les globules de verre qu'on a employés au même usage.

Il dit s'être convaincu par une expérience de quarante ans, que les lentilles les plus avantageuses pour faire des découvertes microscopiques sont celles qui, n'ayant qu'une force moyenne, laissent aux objets beaucoup de lumière & de netteté. Il consacroit toujours une de ses lentilles à un ou deux objets seulement; & il en avoit constamment quelques centaines sous sa main. »

On commença en 1665 à faire usage de petites sphérules de verre solide au lieu de lentilles, dans le microscope simple. Ces globules grossissent prodigieusement & font d'excellens microscopes lorsqu'on fait s'en servir. Mr. Adams décrit en grand détail le procédé du P. Della Torre pour fondre ces globules en sorte qu'ils soient bien transparens & bien sphériques; il faut pour cela une lampe d'émailleur & un attirail assez considérable. On les fait tout aussi bien, & beaucoup plus simplement par la méthode suivante qu'on trouve indiquée dans le Journal de physique de Nicholson (juin 1797) & transcrite à la fin de l'ouvrage d'Adams.

» On prend une lame de verre à vitres, mince, & de moins d'une ligne de largeur. On la tient verticalement suspendue par son extrémité supérieure auprès d'une chandelle, à la distance convenable pour que la pointe de la flamme soufflée latéralement avec un chalumeau, puisse l'atteindre à environ un pouce au-dessus

de l'extrémité inférieure de la lame. Le verre s'amollit & le poids du morceau inférieur le fait filer en bas d'environ deux pieds; le filet de verre se réduit au diamètre d'environ $\frac{1}{500}$ de pouce. On le sépare du morceau qu'il tient suspendu, & sans faire usage du chalumeau, on approche latéralement ce fil si fin vers la flamme bleue qui entoure vers le bas la mèche de la chandelle : aussitôt son extrémité rougit & se fond en un globule qu'on fait grossir successivement en continuant d'avancer l'extrémité du fil vers la flamme, jusqu'à ce qu'il ait atteint la dimension qu'on veut lui donner. On coupe alors le fil excédent, & l'on a un globule bien transparent & parfaitement sphérique.

On peut faire ces globules d'une manière encore plus simple, mais moins durable, en prenant une goutte d'eau à l'extrémité d'une épingle & en la tenant suspendue auprès d'un très petit trou pratiqué dans une lampe de métal. Deux gouttes d'eau, séparées en partie par une lame mince de laiton, mais qui se touchent dans leur axe commun, forment aussi une lentille double-convexe, qui peut servir de microscope simple.

Mais de tous ces moyens extemporanés le plus efficace, lorsqu'il est question d'observer des animacules dans un liquide transparent, c'est de suspendre au bout d'une pointe obtuse de métal une goutte de ce liquide lui-même, en quantité suffisante pour qu'elle forme un peu

plus qu'un hémisphère : les corps étrangers qu'il renferme paroissent énormément grossis lorsqu'on approche ce globule de l'œil ; & on peut surtout les observer avec avantage à la lumière de la chandelle.

Nous transcrivons avec plaisir ces détails d'une pratique facile , & qui tendent à mettre les *moyens* des découvertes à la portée d'un plus grand nombre d'observateurs , ou d'amateurs.

Ceux d'entr'eux qui ne sont pas familiarisés avec les principes de l'optique accueilleront peut-être quelques procédés extrêmement simples pour déterminer la force amplificative des divers microscopes. Nous les tirons du second chapitre.

On a peine à se persuader que la lentille interposée entre l'œil & l'objet qu'elle fait paroître sous de si grandes dimensions , n'a d'autre effet réel que de permettre à l'organe de percevoir *distinctement* un objet qu'il examine à une *très petite distance* ; effet que la structure ordinaire de cet organe n'admet pas à une distance plus rapprochée que celle d'environ huit pouces.

Pour s'assurer de cette vérité , il suffit de placer l'œil fort près d'une lentille de verre , dans le but de regarder au travers , un objet qu'on en approche ou qu'on en éloigne , jusqu'à ce qu'on le voye distinctement & bien terminé : qu'alors , en éloignant la lentille , on lui sub-

stitu

titue une plaque mince de métal percée d'un petit trou, on verra l'objet aussi distinct & sous d'aussi grandes dimensions que lorsqu'on le regardoit au travers de la lentille; seulement il paroitra moins éclairé. Son diametre sera agrandi, dans ce cas, autant de fois que la distance de l'objet à la lentille, ou au trou qui l'a remplacée, est contenue dans la distance à laquelle la vision est distincte à l'œil nu.

Ainsi, par exemple, si l'on a une lentille convexe des deux côtés, dont le foyer, soit d'un demi ponce, elle grossira 16 fois, environ, les dimensions linéaires des objets, parce qu'un demi ponce est contenu 16 fois dans huit ponces, distance ordinaire de la vision distincte. Plus on raccourcira le foyer des lentilles, ou plus on augmentera la courbure de leurs surfaces, & plus il y aura de différence entre ce foyer & la distance constante de huit ponces; par conséquent, plus elles grossiront.

Si au lieu de se servir d'une lentille, on emploie un globule de verre; comme le foyer de ces globules est à la distance de $\frac{3}{4}$ de leur diametre, ce globule grossira autant de fois que cette quantité est contenue dans huit ponces. Ainsi, supposant que ce diametre soit de $\frac{1}{10}$ de ponce (1), les $\frac{3}{4}$ feroient $\frac{3}{10}$ de ponce & le

(1) Environ 25 décimillimètres. Voyez le tableau de réduction des Mesures anglaises aux nouvelles mesures françaises, T. VIII de ce Recueil, p. 286. (R)

diametre réel de l'objet feroit à son diametre apparent, comme $\frac{3}{40}$ à 8 ou comme 3 à 320 ou comme 1 à 106.

Mais comme nous n'avons considéré qu'une dimension dans ce rapport, & que les surfaces augmentent comme les quarrés de leurs côtés semblables, une telle lentille rendroit la surface apparente d'un objet, plus grande qu'elle ne le paroît à l'œil nu, dans le rapport du quarré de 106 à 1; c'est-à-dire, onze mille deux cent trente-six fois.

On est quelquefois dans le cas de calculer l'agrandissement non - seulement de la surface, mais du volume entier ou de la solidité: comme, par exemple, lorsqu'on veut favoir combien d'animalcules sont contenus dans une goutte d'un liquide donné. Alors il faut élever au cube le rapport de l'amplification linéaire, ce qui, dans ce cas, donneroit le rapport de onze cent quatre-vingt onze millions seize mille, à un.

Le microscope *composé* est formé de plusieurs verres convexes disposés de maniere que c'est à l'*image* d'un objet, & non à l'objet lui-même, que s'applique la force amplificative de la lentille. Celui de ces verres qui se trouve le plus près de l'objet & qui forme l'image (qu'il présente renversée) se nomme la lentille objective. Le verre qui la suit est destiné à augmenter le champ de l'instrument ou la quantité de surface qu'on pourra voir à la fois; enfin la lentille

oculaire, qui permet à l'œil de s'approcher beaucoup, & par conséquent de voir l'image fort agrandie, grossit proportionnellement l'objet. Cette dernière lentille est ordinairement composée de deux ou plusieurs verres lenticulaires, combinaison destinée à corriger l'aberration de sphéricité & à augmenter encore le champ de l'instrument.

La méthode la plus simple pour mesurer la force amplificative du microscope composé, est de placer à son foyer une règle qui porte de très-petites divisions & qui déborde de beaucoup ce foyer d'un côté. Alors, en mettant un œil au microscope & tenant l'autre ouvert, on vient facilement à estimer quelle étendue occupe sur la règle, regardée à l'œil nu, l'une de ses divisions vue dans le microscope; & le rapport de cette division à l'étendue apparente qu'elle occupe sur la règle est la mesure de la force amplificative linéaire de l'instrument. On élève ensuite ce rapport au carré, s'il s'agit de surfaces, & au cube s'il est question de volumes; comme nous l'avons indiqué tout-à-l'heure.

Les Editeurs ont joint à ce chapitre un détail sur l'application qu'on a faite au microscope, du micromètre, c'est-à-dire d'un appareil propre à mesurer immédiatement les dimensions réelles des objets qu'on observe. On s'y est pris de plusieurs manières, & on a successive-

ment simplifié les procédés. Déjà depuis plusieurs années Mr. Martin & d'autres opticiens plaçoient au foyer de l'instrument des lames de verre, d'ivoire, ou de corne, qui portoient des divisions très-fines auxquelles on comparoit les objets observés en les mettant sur ces divisions, ou à côté d'elles; mais on remarquoit que l'épaisseur du verre nuisoit à la clarté de la vision, & que l'ivoire & la corne éprouvoient des variations hygrométriques considérables. On doit à Mr. Cavallo l'heureuse idée d'adapter pour micrometres aux lunettes ou télescopes, des lames très-minces de nacre de perles fort exactement divisées (1). On a appliqué cette invention avec le même succès aux microscopes. La nacre de perle est très-propre à cet usage; elle est suffisamment transparente lorsqu'elle est amincie à l'épaisseur d'une feuille de papier; elle a assez de consistance, & les plus fines divisions s'y tracent très-nettement. On donne pour l'ordinaire à ces lames, une vingtième de pouce Anglais (environ treize décimillimètres) de largeur, & les Artistes Anglais ont poussé si loin l'art des divisions, que Mr. Coventry, & d'autres, préparent de ces lames dont les divisions donnent depuis $\frac{1}{100}$ jusques à $\frac{1}{5000}$ de pouce. Mrs. Jones joignent à leurs microscopes un assortiment d'une demi douzaine de micro.

(1) Trans. Phil. 1791.

metres en verre & en ivoire, outre un ou deux en nacre de perles. Ils sont divisés en lignes & en quarrés, depuis $\frac{1}{100}$ jusques à $\frac{1}{1000}$ de pouce. Les plus petites divisions dont on fasse usage commodément avec le micrometre de verre sont les 4000^{mes}. de pouce ; & comme elles peuvent être croisées à angles droits par des lignes semblablement espacées, on a ainsi des quarrés qui paroissent très-distincts sous le microscope, & dont la surface est la *seize millionieme* d'un pouce.

Les micrometres de verre disposés en quarrés, & appliqués au microscope solaire, divisent l'image des objets projetée sur l'écran, d'une maniere très-commode pour les dessiner dans leurs dimensions exactes.

Entre les microscopes de toute espee qui sont décrits dans le troisieme chapitre, on doit distinguer, à ce qu'il nous semble, celui auquel Mr. Adams a donné le nom de *Lucernal* parce qu'on l'employe à l'aide d'une lampe. Voici les principaux avantages qui caractérisent cet instrument, tels que l'auteur les développe.

« Comme la très-grande pluralité des objets qu'on peut se proposer d'observer sont opaques, & qu'il n'y en a qu'un très-petit nombre qui soient assez transparens pour être bien vus dans les microscopes ordinaires, on a long-temps désiré un instrument qui pût se prêter facilement à l'examen des objets opaques. Et même

lorsqu'on observe des objets transparens on perd souvent, dans les courans de lumiere qui les traversent, les parties les plus déliées & les plus curieuses; tandis que d'autres paroissent sous la forme de lignes ou de tâches noires, parce qu'elles ne laissent point passer du tout de lumiere. Le microscope lucernal n'a point ces inconvéniens; on y voit les objets opaques d'une maniere extrêmement nette; leurs couleurs naturelles, loin de rien perdre, sont rehaussées, & conservent toutes leurs teintes; & les parties ou saillantes ou creuses sont rendues avec tout leur effet. »

» Cet instrument a un autre grand avantage, qui lui est particulier : c'est la facilité avec laquelle les objets opaques s'y adaptent. Comme la texture & les parties délicates des plantes ou des animaux s'alterent souvent par les préparations nécessaires pour les soumettre à l'observation lorsqu'on employe les microscopes ordinaires, on peut les examiner d'abord avec le microscope lucernal qui ne les altere nullement, & les étudier ensuite comme objets transparens. »

» Ce microscope ne fatigue nullement la vue; l'objet est représenté absolument au naturel, & offre un spectacle qui satisfait l'esprit. On peut le regarder des deux yeux à la fois sans être obligé d'en cligner un comme on le fait ordinairement. »

» Enfin, au moyen de cet instrument, les

personnes les moins habituées au dessein peuvent tracer elles-mêmes les contours exacts des objets observés ; & les dessinateurs exercés peuvent travailler avec beaucoup plus de précision & de diligence en en faisant usage. La plupart des figures qui accompagnent cet ouvrage ont été dessinées par ce moyen , & j'espère que leur exécution témoignera en sa faveur (1). Sous ce point de vue , cet instrument seroit d'un grand secours à l'anatomiste , au botaniste , à l'entomologiste , &c. en les mettant à portée non-seulement d'étudier avec facilité les objets de leurs recherches , mais d'exécuter eux-mêmes des desseins exacts de ceux qu'ils se proposent de faire connoître. »

Il faudroit un grand développement de figures pour décrire cet instrument : nous en indiquerons seulement la disposition générale. La lumière vive d'une lampe d'Argand est réfléchie , par un miroir concave , sur l'objet mis au foyer du microscope ; & l'image agrandie de cet objet est portée sur une glace dépolie , au-delà de laquelle , & dans l'axe de l'instrument , est placé l'observateur , qui voit l'objet peint sur la glace avec toutes ses couleurs. On peut par une autre disposition , faire de l'instrument une sorte de lanterne magique , lorsqu'il est question d'objets transparens ; enfin on peut encore

(1) On en trouveroit difficilement de plus belles. (R.)

s'en servir à la façon de microscope ordinaire ; c'est donc un instrument universel , dans ce genre. Mrs. Jones l'ont encore , à ce qu'il paroît , fait avancer d'un degré vers la perfection. Cet appareil curieux coûte de dix-huit à douze guinées , selon qu'on l'exige plus ou moins complet.

Le sujet du quatrième chapitre ; savoir , « les instructions générales pour l'usage du microscope & la préparation des objets , » se subdivise en trois chefs. Sous le premier , sont indiquées toutes les dispositions qui ont rapport à l'instrument en particulier ; le second traite de la quantité de lumière & de la meilleure manière de la diriger sur les objets à examiner ; on trouve sous le troisième , les moyens de préparer & de conserver les différentes substances , selon leur organisation & leur texture. Nous transcrirons quelques-uns des conseils de l'auteur.

« Il faut, dit-il, toujours commencer par employer la lentille la moins forte ; on acquiert ainsi une idée exacte de l'ensemble & de la situation respective des parties , & l'on ne court plus de risque de se tromper lorsqu'on arrive aux verres les plus forts. — Les objets transparens supportent mieux les lentilles d'un foyer court , que ne le font les objets opaques. »

» Il y a beaucoup de différence entre voir simplement un objet au microscope , ou l'étudier avec cet instrument. Dans le premier cas

nous nous contentons de recevoir l'impression d'une image formée par le jeu des verres ; dans le second , nous formons un jugement d'après l'aspect de cette image ; & c'est ici qu'est la difficulté : il faut connoître son sujet , être doué de patience , répéter les observations ; car il y a des cas où les apparences sont semblables malgré la différence totale des substances qui les font naître ; c'est à la pénétration de l'observateur qu'il appartient alors de distinguer. — Qu'il ne se hâte point de prononcer ; qu'il apprécie l'effet de toutes les circonstances qui peuvent influer sur ce qu'il voit ; extension forcée , contraction occasionnée par le dessèchement , &c.

« On peut être trompé sur la vraie couleur des objets lorsqu'on emploie de très-fortes lentilles : l'augmentation donne lieu à des jeux de lumière accidentels , qu'il faut savoir reconnaître. »

Sur la quantité de lumière , l'auteur prescrit de la modifier selon la nature des substances qu'on étudie , & il paroît préférer la lumière de la chandelle , ou d'une lampe , à celle du jour. On peut mieux disposer de celle-là à son gré ; & sous ce rapport encore , le microscope lucernal a l'avantage sur les autres. En parlant de la préparation des objets , « personne , dit-il , ne fut à cet égard plus habile & plus heureux que Swammerdam. Dans l'adresse des dissections

dans la persévérance des recherches , dans l'art de déployer aux regards des curieux les richesses microscopiques de la création , il n'a point eu & n'aura peut-être jamais d'égal. Profondément frappé & constamment animé par les scènes étonnantes que lui dévoiloient ses observations , aucun mécompte , nulle difficulté ne l'arrêtoit dans la poursuite de la vérité. — Boerhaave a examiné avec beaucoup d'attention tous ses manuscrits , dans l'espérance d'y trouver quelques détails sur ses procédés. — Il paroît que son moyen principal de dissection étoit l'emploi de ciseaux extrêmement fins & tranchans ; il les préféroit aux bistouris & aux lancettes qui n'ayant pas , comme les ciseaux , un point d'appui réciproque , déchirent souvent les organes très-déliés & déplacent des filamens qu'ils entraînent. Ses instrumens pointus étoient si déliés qu'il ne pouvoit les aiguïser qu'à l'aide d'une loupe ; mais aussi il disséquoit , par leur moyen , les intestins des abeilles avec autant d'aisance & de précision que peut le faire un anatomiste qui travaille sur les mêmes organes chez de grands animaux. Il se servoit de même , avec beaucoup d'adresse , de petits tubes de verre tirés en pointe très-fine à l'une de leurs extrémités , pour souffler dans les plus petits vaisseaux , & les injecter au besoin avec des liqueurs colorées. — Les insectes ont presque tous à l'intérieur plus ou moins de graisse , dont la présence rend

leur dissection d'autant plus difficile : Swammerdam découvrit que cette substance étoit parfaitement dissoluble dans l'essence de térébenthine, ce qui lui fournit les moyens de dégager très-complètement leurs viscères pour les étudier & les démontrer. — On l'a vu fréquemment employer une journée entière à dissoudre ainsi la graisse de l'intérieur d'une chenille pour découvrir la véritable structure du cœur de cet insecte. — Sa manière d'enlever leur peau à l'époque où elles sont prêtes à filer leur coque, mérite d'être citée : il les plongeoit un instant, suspendues par leur fil, dans l'eau bouillante; l'épiderme s'enlevoit alors facilement. Il les mettoit ensuite dans un mélange à parties égales, de vinaigre distillé & d'esprit-de-vin : cette immersion donnoit aux divers organes une consistance suffisante pour qu'on pût les séparer de leurs enveloppes sans les déformer. Il montrait ainsi la nymphe renfermée dans la chenille, & le papillon emmaillotté dans la nymphe. On ne peut lire les ouvrages de ce grand Naturaliste sans éprouver un extrême plaisir, soit que l'on considère l'étendue de ses travaux & son ardeur infatigable, soit que l'on réfléchisse aux sentimens de piété qui se déployoient dans son ame chaque fois qu'un nouveau miracle de la création se découvroit à ses yeux; l'Auteur de ces merveilles étoit toujours présent à sa pensée, & son

cœur bondissoit vers lui à chaque trait de l'admirable sagesse dont toutes ses œuvres portent l'empreinte. »

Les procédés de Lyonnet sont aussi développés par Mr. Adams , & nous avons le regret de ne pouvoir le suivre dans tous ses détails. — Voici comment il prescrit de s'y prendre pour observer, soit la circulation du sang , soit la figure des molécules rouges qui entrent dans la composition de ce fluide.

L'un des animaux chez lesquels la circulation s'observe le mieux est une petite anguille ou un petit gougeon. On le lave bien , pour détacher la couche gluante qui le recouvre , puis on l'étend sur la gouttière presque plate qui accompagne d'ordinaire les microscopes , & est destinée à ce genre d'observations ; on l'y maintient par des fils qui lacent d'un côté à l'autre & l'on observe la queue presque transparente de l'animal. Ou bien on met le petit poisson dans un tube un peu plus gros que lui , & rempli d'eau. Leuwenhoeck donne dans sa 112^e. lettre , une description exacte des vaisseaux sanguins dans la queue d'une anguille.

On a décrit aussi un appareil propre à observer la circulation dans le mésentère d'une grenouille vivante. « Mais , dit notre auteur , comme la cruauté de ce genre d'expériences priveroit le naturaliste sensible de toute la satisfaction qu'il pourroit en retirer , il se contentera

sans doute de savoir qu'elles ont été faites. Il y a amplement dans la nature de quoi alimenter la curiosité sans faire éprouver à l'observateur des sensations aussi pénibles. »

*The poor beetle that we tread upon
In corporeal sufferance finds a pang as great
As when a giant dies. (1)*

SHAKESPEARE.

Les Editeurs citent ici, en note, une réflexion de Montaigne que nous relevons aussi volontiers. C'est que « toutes les especes de créatures animées ont droit à une sorte de bienveillance & de compassion de la part de l'homme. » Et, ajoutent-ils, il est fort à regretter qu'on ne cherche pas avec plus de soin qu'on ne le fait, à inculquer ce principe dans le cœur des jeunes gens. On devrait tâcher d'étouffer de bonne heure cette maligne disposition de la plupart des enfans à tourmenter les êtres sensibles qui sont dans leur dépendance & sur lesquels ils exercent leur tyrannie. Le moindre inconvénient qui résulte de la négligence des parens ou des instituteurs à cet égard, est l'habitude que prennent les enfans de s'endurcir aux souffrances qu'ils n'éprouvent pas eux-mêmes ; & trop souvent, ils passent de cette apathie aux actes de la cruauté la plus atroce. Le sénat

(1) « Le pauvre Scarabée que nous écrasons sous nos pieds, meurt dans des souffrances aussi cruelles que peuvent l'être celles d'un géant à l'agonie. »

d'Athènes , punit , comme on fait , un enfant pour avoir crevé les yeux d'un oiseau ; & l'imitable Hogarth ce grand peintre du genre humain , a représenté admirablement dans ses *cinq périodes de la cruauté* (1) les terribles conséquences de l'inattention des parens à cette fatale légèreté chez leurs enfans. »

On ne s'attend gueres à recevoir des conseils d'éducation dans un Essai sur le microscope.
→ Revenons au sujet.

Pour voir les molécules rouges du sang, on peut s'y prendre de plusieurs manieres. Ou bien l'on en étend une très - petite goutte en couche aussi mince qu'il est possible , sur un verre plan. En la délayant un peu avec de l'eau tiède les molécules se subdivisent d'elles-mêmes en d'autres plus petites, qu'on peut voir isolées. Ou bien comme le prescrit Mr. Baker, on mêle à ce fluide un peu de lait & on l'aspire dans un tube de verre d'un diametre extrêmement fin. Mr. Hewson , qui a particulièrement étudié ce sujet, soutient que c'est très-improprement qu'on a nommé *globules* les molécules du sang, attendu qu'elles ne sont

(1) La premiere des cinq estampes représente des enfans qui dans différens jeux se plaisent à tourmenter toutes sortes d'animaux. On voit dans la quatrieme un homme qui cherche à ensevelir, à la clarté d'une lanterne, une femme grosse qu'il a égorgée & dont il a coupé les mains. (R)

point rondes mais aplaties. Il le démontre en délayant un peu de sang caillé, dans la lymphe même, ou la sérosité qui s'en sépare par le repos. La lymphe, ainsi légèrement colorée, mise sous le microscope sur un plan de verre un peu incliné pour que la partie la plus fluide s'échappe doucement, laisse voir les molécules rouges sous la forme de disques avec un point noir au milieu (1).

L'auteur après avoir donné les directions nécessaires pour préparer les infusions dont on se propose d'observer les animalcules, & pour soumettre ces infiniment petits à l'action du microscope, termine ces détails par une réflexion que nous croyons devoir transcrire.

« L'observateur, dit-il, doit être très-réservé à former un jugement sur la nature, l'usage, & les opérations de ces animalcules, s'il prétend raisonner d'après les idées qu'il s'est formées en étudiant les propriétés des animaux ordinaires. Car ces moyens surnaturels que nous fournit le microscope, nous introduisent, en quelque sorte, dans un monde nouveau, où nous trouvons, non pas un petit nombre d'individus, mais des milliers d'espèces tellement singulières dans leurs apparences, leur for-

(2) Ne pourroit-on point objecter que la formation préalable du caillot étant une sorte de cristallisation, elle pouvoit avoir dénaturé la forme primitive des molécules ? (R)

mation , leurs habitudes , que si cet aspect agrandit des notions que nous nous sommes formées de la toute puissance créatrice , il semble en revanche , par ce qu'il nous offre d'incompréhensible , nous montrer les limites de l'entendement humain plus rapprochées que nous n'aurions été disposés à le croire.

Mais nous dépassons sans nous en appercevoir , les bornes d'un extrait ordinaire. Nous n'avons fait cependant que parcourir très-rapidement les cinq premiers chapitres , soit la partie technique de l'ouvrage. Nous entretiendrons nos lecteurs dans un prochain numéro , de la nombreuse collection de faits qu'il renferme.

G É O L O G I E.

ON THE PRIMITIVE STATE , &c. Sur l'état primitif du globe & la catastrophe qui lui a succédé. Par R. KIRWAN. Esq. des Sociétés Royales de Londres & d'Irlande. (Tiré des *Transactions de l'académie d'Irlande* , T. VI.)

Si , comme nous l'avons observé à l'occasion de l'écrit précédent , les sciences & les arts trouvent leur avantage à s'entraider , il n'est pas moins vrai que les sciences considérées à
part.

part, & celles-là même dont les rapports sont le moins évidens, gagnent aussi à se prêter mutuellement des secours. Cette alliance, système dont l'application des mathématiques à la physique fut un des premiers & des plus utiles exemples, a essentiellement contribué à leurs progrès dans le siècle précédent & dans celui qui va finir.

Mais pour découvrir leurs relations réciproques, pour moyenner ces traités d'échange, il faut, comme dans la diplomatie des nations, que ceux qui sont appelés à y jouer un rôle y portent, outre une vocation naturelle, qui tient au caractère de l'individu, un vaste assortiment de connoissances bien digérées; un esprit net & conciliant; une tête fertile en aperçus, en combinaisons, & froide dans l'examen; de la pénétration, de la sagacité, & une logique sévère. Sans doute, le monde savant n'offre qu'un bien petit nombre d'hommes qui réunissent cet ensemble de qualités éminentes; mais, en traçant cette esquisse, nous avons pourtant dans l'esprit un modèle : c'étoit R. KIRWAN; & son nom s'est présenté si souvent dans nos feuilles, que peut être ici nos lecteurs l'avoient deviné avant que nous le nommâssions.

Ils ont pu remarquer, en effet, que la chimie, la physique, la minéralogie, l'agriculture, la géologie, en un mot, que presque toutes les sciences naturelles ont dû des progrès à

ses travaux soutenus ; & l'écrit qui lui mérite une palme dans l'Académie d'Irlande (1), montre d'une manière frappante, ce que peuvent gagner deux sciences à être rapprochées par une main habile : la chimie & l'agriculture, long-temps inconnues l'une à l'autre, & maintenant associées, ne se sépareront plus ; & en se perfectionnant ensemble, ces deux sciences procureront par les moyens les plus directs, le bien de l'espèce humaine.

Le succès de cette tentative a sans doute encouragé Mr. Kirwan à en hasarder une autre à la réussite de laquelle il a pu croire que l'humanité gagneroit sous le rapport moral. Nous trouvons, dans le dernier volume des *Transactions* de l'Académie d'Irlande un travail dont il est l'auteur & qui est rempli des plus ingénieux rapprochemens ; son objet est de raccorder les monumens géologiques de l'état primitif du globe avec ceux tirés de l'histoire, & en particulier avec le texte des Livres sacrés. Il n'est pas entre les philosophes modernes le premier qui ait étudié profondément ce sujet : Wallerius, avoit déjà pris le récit de Moïse pour base de son système géologique ; & le savant DELUC a publié ses idées à cet égard dans une suite de lettres au Prof. Blumembach, qui ont paru à

(1) *Essai sur les engrais*. Voyez T. II. *Sc. & Art*, p. 28.

KIRWAN, SUR L'ÉTAT PRÉSENT DU GLOBE, &c. 231

Londres depuis près de trois ans : ces lettres viennent d'être traduites , & réunies , avec des additions , en un volume *in-8°*. imprimé à Paris. Les deux géologues , quoique d'accord sur le but principal & les idées fondamentales , ne le sont pas toujours dans le mode d'argumentation ; il ne nous appartient pas de décider entre eux ; & l'amitié , qui nous lie à notre célèbre compatriote seroit d'ailleurs un motif suffisant de récusation. Nous venons au mémoire de Mr. Kirwan.

Cet auteur pose d'entrée , les principes logiques auxquels il ramènera tous ses raisonnemens. Nous allons les énoncer textuellement.

« Dans la recherche des faits anciens qui dépendent de causes naturelles , on doit dit-il , s'attacher invariablement à certaines règles de raisonnement. La première est de n'attribuer aucun effet à une cause dont l'énergie connue soit insuffisante pour le produire. La seconde , est de n'admettre aucune cause dont l'existence ne soit pas prouvée , ou par l'expérience ou par un témoignage incontestable. Il y a un grand nombre de phénomènes naturels qui ont eu lieu & s'observent encore dans des endroits distans de nous & dont on ne pourroit sans absurdité rejeter la preuve par témoignage : ainsi les habitans du Nord de l'Europe qui n'ont jamais éprouvé de tremblement de terre & n'ont jamais vu de volcans , doivent admettre ,

par simple témoignage, l'existence passée & actuelle de ces phénomènes. »

» La troisième règle est, de n'attribuer à une cause présumée, que l'influence qu'elle possède réellement d'après l'observation, & dans les circonstances dans lesquelles elle a exercé son action. »

» Je me propose de me conformer strictement à ces règles dans la recherche que j'entreprends, & elle n'aura de mérite qu'autant que j'y serai fidèle. Je les appliquerai aux divers systèmes dont j'aurai l'occasion de parler. »

» Et les personnes qui seroient tentées de considérer cette recherche comme superflue, & prétendroient que l'état *présent* du globe mérite seul l'attention des naturalistes, ces personnes dis-je, voudront bien observer que son état primitif est si intimement lié avec les apparences actuelles, qu'on ne peut se faire des idées justes de celles-ci sans remonter aux temps antérieurs. Et de plus, des preuves récentes nous ont convaincus que l'obscurité qui a jusqu'à présent enveloppé les premiers âges du monde, a trop favorisé l'apparition de divers systèmes d'athéisme; & que ces systèmes ont à leur tour trop multiplié le désordre & l'immoralité, pour qu'on ne doive pas chercher à dissiper cette obscurité en s'aidant de toutes les lumières qu'ont fournies les recherches des naturalistes modernes. Ainsi la géologie se trou-

vera arriver par une *transition* naturelle (pour nous exprimer en minéralogistes) à la religion ; comme celle-ci , par un passage aussi naturel , se lie au système de la moralité.

» Il faut dire encore , que les recherches des géologues modernes ont été tellement étendues & heureuses , qu'elles font si évidemment liées avec l'objet qui nous occupe , que depuis l'époque où les anciennes traditions ont été obscurcies ou effacées , il n'y a point eu de période plus favorable que ne le sont les temps actuels , à l'examen de l'état primitif du globe , malgré le long intervalle qui nous en sépare. On n'avoit point jusqu'à présent , parcouru sa surface dans nombre de directions différentes ; on n'avoit pas jusqu'à nos jours des données exactes sur sa forme , sur les proportions & les gisemens relatifs des continens & des mers , sur la densité moyenne de la masse totale. On n'avoit pas étudié ses parties constituanes & leurs rapports mutuels ; on n'avoit rien approfondi comme on l'a fait depuis vingt-cinq ans ; & jamais non plus , les preuves testimoniales n'avoient été plus soigneusement pesées & soumises à une critique plus sévère , qu'elles ne l'ont été dans la dernière moitié de ce siècle. »

» Je fais que l'admission de la preuve testimoniale en matière de physique pure , répugne à beaucoup de gens ; mais ils ne font point assez d'attention à la nature de l'objet dont il

s'agit. Toutes les recherches physiques sont fondées sur l'expérience ou l'*observation*, séparément ou collectivement, & sur les conséquences immédiates qu'il est possible d'en déduire. Lorsqu'on ne peut avoir recours à l'*expérience* comme dans le cas présent, alors il faut se borner à l'*observation* seule ; mais comme celle-ci même ne se présente pas tous les jours, & que les faits sont souvent séparés par de grands intervalles de temps & de lieu, on est forcé d'admettre les preuves *historiques* & par conséquent le témoignage. Ainsi, en astronomie, science d'ailleurs purement physique, les philosophes n'ont jamais hésité à admettre les observations d'un Hipparque ou d'un Ptolomée. En effet, les *anciens* événemens géologiques étant du domaine de l'histoire, tout les efforts par lesquels on prétendrait les approfondir en argumentant seulement d'après leurs conséquences *actuelles*, & en excluant toute preuve testimoniale bien avérée, seroient aussi absurdes que ceux d'un écrivain qui voulant faire l'histoire de l'ancienne Rome ne consulteroit que les médailles & les ruines de ses monumens publics, en écartant volontairement les témoignages d'un Tite-Live, d'un Salluste, d'un Tacite. On convient de toutes parts que de grands changemens ont eu lieu à la surface du globe depuis qu'il a commencé d'exister, & que ces changemens ne se sont pas répétés.

depuis quelques milliers d'années. Pourquoi ces grands événemens & leurs circonstances ne seroient-ils pas susceptibles de preuves testimoniales ? Ce n'est sans doute pas qu'ils soient improbables, ou contredits par les observations actuelles, puis qu'au contraire, leur réalité est accordée sans conteste ; je n'en fais voir qu'une raison, relativement à *quelques-uns* de ces événemens ; & au premier énoncé, cette raison est plausible, savoir que leur existence a précédé celle de l'espèce humaine : cela prouve certainement que les connoissances de l'historien qui les rapporte n'avoient pas été acquises, quant à ces faits, par des moyens humains. Mais si dans une *série de faits* découverts par une recherche particulière, à laquelle le témoin est absolument étranger, on remarque accord parfait avec sa relation, non pas seulement quant au *matériel* des faits qu'il a décrits, mais quant à l'*ordre* & à la succession de ces mêmes événemens, alors on est forcé de reconnoître que la relation est *véritable*, quelle que soit la source où l'historien a puisé ses documens (1). Si cette source n'a pu être

(1) On ne sent pas, au premier abord, toute la force de cet argument, parce qu'on ignore quelle est cette recherche collatérale & indépendante de l'historien, par laquelle on découvre & les faits & leur succession nécessaire, tels, & dans le même ordre où il les présente. La lecture du mémoire donne la clef de

humaine, elle doit avoir été surnaturelle, & doit mériter toute croyance; même dans les cas auxquels l'observation n'a pu atteindre, ou qui ne sont peut-être pas susceptibles de ce genre de confirmation. Maintenant j'ose dire que ces caractères s'appliquent à la relation que nous a donné Moïse de l'état primitif du globe; & je prétends le démontrer dans le cours de cet Essai.

Nous ne nous proposons pas d'abord, de transcrire en entier l'espèce de préface qu'on vient de lire; mais les principes de l'auteur & sa méthode y sont si nettement exposés que nous n'aurions pu, sans lui faire tort, en retrancher une ligne. Le reste de son écrit est divisé en deux Essais distincts; le premier traite de l'état primitif du globe; le second, de la catastrophe du Déluge. Nous réserverons l'analyse de celui-ci pour un numéro prochain.

P R E M I E R E S S A I

Sur l'état primitif du globe.

La forme sphéroïdale du globe terrestre.

ce genre de raisonnement. Il revient à celui d'un Juge qui, interrogeant un témoin sur les principales circonstances d'un certain événement, circonstances dont le Juge auroit obtenu d'ailleurs la connoissance, recevrait des réponses parfaitement conformes à ce qu'il fait être la vérité. Il n'hésiteroit pas alors, à ajouter foi au témoin sur les circonstances même qui, par leur nature, n'auroient pu être connues que de ce dernier. (R)

bien établie par les astronomes ; c'est-à-dire , son renflement sous l'équateur & son aplatissement vers les pôles , prouvent que sa surface , jusqu'à une certaine profondeur , doit avoir été liquide ou du moins dans un état qui permit à ses molécules de se mettre en équilibre en obéissant à la fois à la gravitation & à la force centrifuge née de la rotation. Quelques observations géologiques montrent aussi que certaines substances actuellement très-dures doivent avoir été originairement dans un état de mollesse. Ainsi les cailloux siliceux qui font partie des poudingues argilleux des montagnes de Quædlin & Borthollet, en Norvège , sont réduites par la compression à l'épaisseur d'un quart de pouce dans la partie inférieure de la montagne , & se trouvent plus gros & plus arrondis à mesure qu'on s'élève. L'auteur cite d'autres faits du même genre , sur lesquels nous n'insisterons pas , parce que le fait principal est généralement admis.

On ne connoît rien de l'intérieur ; mais on peut présumer & on s'accorde assez à admettre , qu'à l'époque de la création & long-temps après , il y existoit d'immenses cavités , dont les voûtes étoient assez solides pour résister à l'énorme pression des matieres liquides qui les recouroient.

Cette liquidité , qui appartenoit même aux parties maintenant les plus solides ne pouvoit

provenir que d'une fusion ignée, ou d'une solution aqueuse. L'auteur renvoie, sur la première de ces deux hypothèses, à un Mémoire inséré dans les Transactions d'Irlande, dans lequel il a prouvé fort au long qu'elle étoit absolument inadmissible. Reste la solution aqueuse, dont la supposition s'accorde beaucoup mieux encore qu'il ne l'avoit imaginé d'abord, avec les propriétés & les caractères qui distinguent les solides actuels, si l'on en excepte ceux qui sont décidément d'origine volcanique.

Mais les solides actuels ne sont presque point solubles dans l'eau; & où trouveroit-on tout le liquide qui a dû être nécessaire pour les tenir en dissolution? Cette difficulté a embarrassé beaucoup de Naturalistes. Les uns ont recours à un dissolvant particulier maintenant dissipé ou combiné; les autres, à une très-haute température. L'auteur résout fort simplement le problème. Pourquoi oublier, dit-il, le fait duquel nous sommes partis & qui est démontré, c'est que la terre étoit *dans l'origine* une masse *liquide*? pourquoi chercher des solides à faire dissoudre, tandis qu'il n'en existoit point, & que les molécules destinées à former ces solides étoient primitivement suspendues dans une masse ou bouillie hétérogène, qui contenoit les élémens de tout ce qui a existé depuis?

L'eau de cette bouillie étant *liquide*, devoit

avoir une chaleur exprimée au moins par le zéro du thermometre commun, & peut être posséder une température beaucoup plus élevée. Ensuite, elle devoit contenir les huit terres simples; toutes les substances métalliques; tous les principes chimiques simples. Cette masse devoit en un mot, former dans son ensemble, un composé plus compliqué qu'aucun de ceux qui ont existé depuis, & doué par conséquent de propriétés très-différentes de celles que nous reconnoissons dans nos liquides actuels.

Ainsi le feu élémentaire dut être contemporain de la création du chaos; & les loix de la gravitation & des attractions électives paroissent devoir être de même date.

Nous remarquerons que le système de Deluc ne diffère jusqu'ici de celui de notre auteur qu'en ce que le premier suppose ce chaos d'abord dans un état de congélation & n'en admet la liquidité qu'après la création de la lumière, laquelle produisit ensuite le feu nécessaire à la liquéfaction de l'eau.

Ce fluide *chaotique* ne contenoit sans doute pas les différens ingrédiens dont il étoit composé, disséminés dans sa masse d'une manière uniforme. Certaines régions renfermoient certaines terres en plus grande proportion que d'autres; ailleurs certains métaux dominoient. La terre calcaire existoit alors, &, selon notre auteur, a précédé l'animalité. Buffon & Hutton

qui ont soutenu le contraire, ignoroient sans doute que les analystes modernes ont reconnu la terre calcaire dans un nombre de pierres dont la formation appartient à cette première époque. Hutton il est vrai, suppose que le monde actuel provient des ruines d'un monde antérieur, & celui-ci d'un précédent. « S'il entend nous conduire ainsi jusqu'à l'infini, dit notre auteur, je ne prétendrai pas l'y suivre; mais s'il s'arrête quelque part, à moins qu'il ne suppose aussi son globe absolument différent de celui que nous habitons (& alors je n'ai rien à en dire) il y retrouvera mon argument. »

L'action des affinités électives dut produire dans un fluide constitué comme celui qu'on vient de décrire, des cristallisations entre les élémens homogènes qui se trouvoient dans la masse. Les groupes de ces cristaux se déposaient & s'entassoient à mesure sur le noyau solide. Dans les régions où la terre siliceuse & l'argile prédominoient, & ces régions étoient de beaucoup, les plus étendues, le granit & le gneiss ont dû se former les premiers. L'auteur explique ingénieusement d'après l'analyse connue du quartz du feldspath & du mica qui entrent comme cristaux intégrans dans la composition de ces deux aggrégés, quel a dû être l'ordre de succession de ces cristaux; d'abord le quartz, puis le feldspath, ensuite le mica. Cependant l'eau dégagée par l'effet de ces

cristallisations s'élevoit à mesure & en facilitoit de nouvelles qui s'attachoient aux précédentes ; & le mode d'aggrégation variant , à raison des proportions dans les molécules élémentaires , il se faisoit là du granit , ici du gneifs , plus loin des roches micacées ; & l'on observe actuellement ces roches entremêlées dans les montagnes primitives qui datent de cette époque. On doit peu s'étonner si l'on y rencontre aussi quelquefois des substances métalliques & en particulier du fer , comme aussi des traces de carbone & de plombagine.—Ici, comme en beaucoup d'autres endroits , l'auteur cite notre illustre ami Defaussure. Nous nous étonnons qu'il n'ait pas cité La Méthérie qui a expliqué depuis long-temps , la formation des montagnes primitives par cristallisation.

Dans d'autres régions où se trouverent les mêmes terres élémentaires , mais sous d'autres proportions que celles des ingrédiens granitiques , il se forma des masses siliceuses , savoir des porphyres , des jaspes , des schistes siliceux , &c.

Ailleurs encore , les argillites , l'hornblende , les schistes primitifs , & d'autres roches d'antique formation parurent , à raison de tels ou tels ingrédiens qui dominoient dans la masse , & décidoient des cristallisations partielles & imparfaites.

Les substances métalliques , que l'auteur considère comme élémentaires & contemporaines

de tous ces ingrédients, & le fer en particulier, durent souvent s'unir avec le soufre, (aussi de même date) & former les sulfures métalliques qui constituent la plupart des minéralisations. Le pétrole, plus léger que l'eau mais retenu dans la masse épaisse du fluide chaotique, put là aussi s'unir au soufre & au carbone & se précipiter avec eux. Voilà les houilles primitives.

Jusques ici, tout se passe tranquillement, dans le sein d'un liquide en repos. Mais bientôt la scène va changer.

On fait maintenant par expérience, qu'il se dégage beaucoup de calorique dans l'acte de la cristallisation. Quelle chaleur immense ne dut pas se manifester à l'époque où des masses aussi énormes devinrent solides; quelle évaporation à la surface du fluide, en conséquence de cette chaleur; quelles ondulations dans le fluide élastique dégagé, à raison de son inégalité dans les diverses régions où la cristallisation avoit un différent caractère!

Et ici l'effet put renouveler la cause : car l'évaporation diminuant la quantité absolue & la pesanteur spécifique du liquide chaotique, dut, ainsi que cela arrive dans les solutions de nos laboratoires, le disposer à de nouvelles précipitations; & lorsque les molécules ferrugineuses très-abondantes, & d'ailleurs très-peu solubles dans l'état métallique, furent brusquement abandonnées, elles durent décompo-

fer l'eau, avec laquelle elles se trouvoient en contact à une très-haute température. Voilà de prodigieuses quantités de gaz hydrogene qui se produisent ; elles rencontrent l'oxigene mis à l'état élastique par la chaleur qui alloit jusqu'à l'incandescence, & forment d'épouvantables inflammations. La chaleur, redoublant par ce fait même, doit avoir dégagé du fluide chaotique tout l'oxigene ; & ce principe s'unissant avec le reste du fer encore métallique, & en partie avec les substances carboniques & bitumineuses, aura produit une conflagration prodigieuse, qui aura même atteint la base solide du fluide chaotique & l'aura crevassée en beaucoup d'endroits.

Ce n'est point une supposition forcée, que celle de flammes qui sortiroient du fond des eaux. L'auteur en cite des exemples récents. On a vu des isles se former à la suite de ces éruptions.

Ces convulsions, qui paroissent avoir surtout agité à cette époque l'hémisphere méridional, eurent d'importantes conséquences.

1°. La grande chaleur communiquée au liquide en dégagèa l'oxigene & les fluides non respirables : & ainsi, se forma peu-à-peu *l'atmosphère*.

2°. L'oxigene rencontrant le carbone incandescent produisit *l'acide carbonique* ; & ce fluide d'abord mêlé à l'atmosphère, s'en sépara par le refroidissement, & absorbé ensuite par le

liquide , s'unit à la terre calcaire (qui , comme plus soluble que les autres , n'avoit pas encore abandonné le menstrue) , & la fit cristalliser. Telle fut l'origine des couches calcaires *primitives*. Cette formation explique pourquoi elles sont presque toujours dégagées de tout mélange , & pourquoi lorsqu'elles alternent avec d'autres substances , c'est avec des gneifs , ou d'autres roches primitives.

On peut établir d'après l'analyse chimique , que la formation de l'air fixe fut postérieure à celle de la plupart de ces roches ; car elle nous apprend que la terre calcaire , qui entre comme ingrédient en petite quantité dans les substances primitives , y est dans l'état caustique , c'est-à-dire privée d'acide carbonique.

L'analogie tirée de ce que nous observons dans nos laboratoires conduit plus loin l'ingénieux auteur de ces développemens. Après la cristallisation des grandes masses primitives au fond du liquide , & après l'évaporation que produisit la chaleur dégagée , la cristallisation put aussi s'opérer *à la surface* , ainsi qu'on l'observe dans plusieurs sels & dans l'eau de chaux. Des couches successives purent s'y former & se déposer ensuite , tantôt horizontalement , tantôt inclinées & même verticales , à raison des accidens de rupture qui devoient être fréquens dans ces couches comme suspendues. On observe ces variétés d'inclinaison dans les montagnes primitives. Les

Les *plaines* primitives durent résulter du dépôt successif des parties solides encore contenues dans le liquide chaotique, mais peu disposées à la cristallisation, ou trop distantes entr'elles pour s'atteindre. Les argiles mêlées de silice, d'autres terres, & de fer, en se déposant, formèrent des plaines. Celles-ci purent ensuite être recouvertes de débris des montagnes primitives environnantes, mais ce fut dans une époque postérieure.

Un océan universel recouvre encore ces montagnes & ces plaines; mais on va les voir paroître au-dehors: de vastes cavernes existoient dans le noyau solide du globe; les crevasses occasionnées dans son écorce par l'action des feux dont on a parlé, donnent (& particulièrement dans l'hémisphère austral) accès à l'eau supérieure, dans ces grands réservoirs. Elle s'y jette d'abord avec furie, puis moins violemment à mesure que sa profondeur diminue: les sommets sont dégagés, puis les plaines; voilà les *continens*: ils se dessèchent & se consolident peu-à-peu.

Leur apparition paroît avoir été successive. Les premières couches mises à sec étoient élevées au moins de 8500 à 9000 pieds (2742 mètres) au-dessus des mers actuelles, ainsi les sommités des principales chaînes de l'Asie orientale, des Alpes, des Pyrénées, en Europe, &c.

des Cordillieres en Amérique, durent se trouver fort au-dessus du niveau de l'Océan.

A cette époque, & *non auparavant*, le fluide chaotique, devenu un liquide à-peu-près homogène, est une véritable mer & se peuple de poissons.

Ici l'auteur prouve que les eaux antérieures ne contenoient pas d'animaux marins, en citant, avec son érudition ordinaire, les rapports des géographes & des physiciens qui ont déterminé les gisemens de ces chaînes & leur hauteur, & ceux des Naturalistes qui assurent unanimement qu'on n'y découvre point de dépouilles marines, & que les couches calcaires mêmes qui s'y trouvent sont primitives. Pallas a trouvé des sources & des lacs salés dans les plaines de ces hautes régions; il y a même rencontré des veines de houille, mais jamais de traces organiques, à l'exception de quelques coquillages roulés dans les fentes des granits, dépôts accidentels & qu'il attribue avec raison, à l'événement du déluge (1).

(1) Nous invitons, à cette occasion, les jeunes naturalistes qui font des courses & commencent des collections, à distinguer toujours bien soigneusement ce qui appartient *essentielllement* au sol qu'ils parcourent, ce qui est renfermé par exemple dans la masse des rochers contemporains de ce sol, de ce qui n'est qu'*adventif*, ou déposé à la surface par l'effet de causes qui ont agi postérieurement à la formation de ces ro-

Et celles-là même, d'entre les montagnes purement calcaires, qui surpassent la limite que l'auteur assigne à l'ancienne mer, ne contiennent point de dépouilles marines. Il cite à cet égard la Peyrouse pour les Pyrénées, & Desauture pour les Alpes.

Et réciproquement, aucune des montagnes qui contiennent dans leur masse des coquillages pétrifiés n'atteint la hauteur de 8600 pieds (2620 mètres). L'auteur montre même d'après de nombreuses citations, que la plupart de ces montagnes sont d'une hauteur beaucoup moindre; & deux seulement, l'une désignée par Deluc, le mont Grenier dans les Alpes, l'autre la montagne de Terglore en Carniole indiquée par le baron de Zoits, approchent de la limite qu'il a fixée : encore soupçonne-t-il que les coquillages trouvés par Deluc pouvoient être adventifs & provenir du déluge; mais comme nous avons observé nous-mêmes certaines sommités voisines du Grenier, à une hauteur à-peu-près semblable, & *entièrement composées* de coquillages en masse, nous serions disposés à croire que ceux qu'a vus Deluc appartiennent de même aux bancs calcaires de ces hautes régions, qui furent par conséquent long-temps sous-marines.

chers. L'inattention à cet égard introduit dans les rapports une confusion qui fait reculer la science. (R)

Mais les contrées encore supérieures, & celles que les eaux avoient abandonnées, durent bientôt se peupler d'animaux & de végétaux ; car le froid sévère qui les rend maintenant inhabitables n'existoit pas pour elles alors, attendu qu'elles occupoient les couches inférieures de l'atmosphère qui n'étoit pas encore descendue à son niveau actuel ; & qu'elles étoient voisines des mers ; circonstances qui , comme l'auteur l'a montré ailleurs, influent principalement sur la température d'un climat.

Il prouve ensuite, que les eaux ne se retirèrent que graduellement du reste des continents maintenant découverts : voici ses arguments.

1°. On trouve de part & d'autre du plateau altaïque, des montagnes coquillères soit calcaires, soit argileuses. Ces masses ont dû être l'effet du séjour de la mer dans ces régions pendant un grand nombre d'années.

2°. On rencontre çà & là ; dans les plaines de l'ancien & du nouveau monde, des amas énormes de coquillages marins. Parmi les nombreuses citations de l'auteur à cet égard, on distingue le fameux Fahlun de Touraine. On trouve-là, à 100 milles de la mer, & à huit ou neuf pieds de profondeur, une masse de vingt pieds d'épaisseur composée presque uniquement de coquillages marins, dont les analogues vivans habitent en grande partie, les mers voi-

KIRWAN, SUR L'ÉTAT PRIM. DU GLOBE, &c. 249
sines. La plupart de ces coquillages sont déposés sur leur face plate, ce qui prouve qu'ils n'ont pas été accumulés par l'effet de quelque bouleversement. On voit des entassements du même genre mais moins considérables en Angleterre. Il est à remarquer qu'on en trouve rarement en creusant au-dessous du niveau des mers actuelles. Les pays les plus bas, comme le Brabant & la Hollande en contiennent la plus grande quantité. Ils sont aussi fort abondans dans certaines contrées de Russie, où la mer a séjourné plus long-temps qu'ailleurs.

3°. On a trouvé dans nos continens à d'assez grandes profondeurs, & même sous des montagnes, des arbres & divers végétaux ensevelis. Ces arbres n'ont pu croître que dans des régions mises à sec, tandis que celles où on les trouve étoient couvertes par les eaux; ce qui prouve une retraite graduelle. La situation de ces dépouilles ensevelies souvent sous des couches régulières de matières pierreuses, ne permet pas d'attribuer leur dépôt à une convulsion telle que le déluge.

4°. On a souvent trouvé des arbres ensevelis, à des hauteurs où la température qui y regne maintenant ne leur auroit pas permis de végéter. Ils y ont donc vécu à une époque à laquelle ces sommités étoient moins élevées au-dessus de la mer, & à une moindre distance de ses rivages.

5°. Enfin , on observe dans les deux continents , des montagnes stratifiées , de hauteurs diverses au-dessous de 8000 pieds , & dans les couches desquelles on trouve diverses substances d'origine marine & terrestre , qui s'y rencontrent ou pétrifiées , ou dans leur état naturel. La régularité de ces couches indique une action uniforme & long-temps continuée. Nous ne connoissons que les marées qui aient ce caractère. On trouve bien çà & là des bouleversemens , mais ils sont dus à des causes accidentelles. Les couches ne sont pas superposées dans l'ordre de leurs pesanteurs spécifiques , mais les matériaux qui composent chacune d'elles prise à part sont ordinairement disposés dans cet ordre.

Après avoir ainsi prouvé que la seconde retraite des eaux s'opéra très-lentement & que les montagnes secondaires furent formées dans leur sein , seulement depuis que ces eaux eurent été peuplées d'animaux , l'auteur s'occupe du mode de formation de ces montagnes , & il observe :

Que leurs matériaux durent être 1°. les débris des montagnes primaires qui existoient sous les eaux ; leurs sommités battues des vagues & détachées par des tremblemens de terre purent rouler & s'amenuiser suffisamment : 2°. dans quelques endroits , des volcans sou-marins vomirent en abondance des matieres , que les

eaux travaillèrent ensuite de la même manière. Tous ces fragmens durent se déposer à mesure, contre le pied & les flancs des montagnes primaires; ils purent recouvrir même des sommets primitifs inférieurs; ils ensevelirent à diverses époques & les coquillages & les végétaux pêle mêle. Les arbres prirent la situation que leur donnerent les courans qui les précipitoient des montagnes, & delà cette uniformité qu'on remarque dans leur position. Ces avalanches boueuses surprirent aussi les poissons dans certains parages, & on les y trouve encore dans des masses maintenant pierreuses : (1)

D'autres grands faits géologiques s'expliquent aussi heureusement dans cette hypothèse. 1°. L'observation constante, que les montagnes à couches secondaires reposent toujours sur les matières primitives. Le Dr. Hutton seul, nie le fait pour l'Angleterre, parce qu'en la traversant, il a rarement trouvé le granit en masse. Cela ne prouve rien sinon que ce granit étoit plus ou moins profondément recouvert par les couches secondaires. D'ailleurs d'autres naturalistes tels que Mr. Everfman & le Dr. Ash, nous apprennent que l'Ecosse presque entière repose sur le granit (2).

(1) Voyez la description des poissons renfermés dans la pierre, à Monte-Bolca, Tom. II. *Sc. & Arts*, p. 68. (R)

(2) Ainsi, dans nos Alpes, le Granit des chaînes

2°. L'observation de Defaussure, que les couches des montagnes secondaires sont ordinairement inclinées parallèlement aux flancs des chaînes primitives, même à une grande distance, & paroissent s'élever contr'elles (1). Cela indique une formation originaire en appui contre ces flancs; mais de vastes découpures formées par des événemens postérieurs ont creusé des vallées intermédiaires & n'ont laissé subsister que les grands traits de cette disposition générale.

Ainsi Schreiber a observé dans la montagne de la Gardette que les couches calcaires étoient toujours superposées au gneifs, & que là où il y avoit pénétration entre ces substances, c'étoit constamment le gneifs qui se projettoit dans le calcaire, comme consolidé antérieurement à l'arrivée de cette dernière substance. Notre auteur cite encore ici une observation de Defaussure sur la situation des poudingues & des grès, qui appuie son système.

centrales plonge sous les chaînes secondaires collatérales, mais reparoit quelquefois dans les plaines & en particulier là où des rivières ont découpé profondément le sol. Nous l'avons retrouvé de cette manière à Tain en Dauphiné, au bord du Rhône & au pié des collines où croît le fameux vin de l'hermitage. (R)

(1) Cette belle observation est surtout frappante sur le sommet du Cramont où son savant auteur nous invita à la répéter avec lui il y a vingt ans. (R)

La retraite graduée de la mer continua jusqu'à une époque qui dut précéder le déluge de quelques siècles. L'auteur présume que les continens avoient été mis à sec long - temps avant cette catastrophe , parce que sans elle les montagnes n'auroient pu acquérir la consistance nécessaire pour lui résister , ainsi que nous voyons qu'elles l'ont fait. Ce n'est pas que les couches secondaires n'aient eu déjà une certaine dureté à l'époque même de leur formation ; mais elle n'approche jamais de celle que procure à ces matieres le séjour à l'air & l'infiltration lente des sucres lapidifiques. Cette infiltration n'est point une hypothèse , & l'auteur cite ici de belles observations de Werner & de Bergman sur ce procédé de la Nature.

Après avoir ainsi établi , d'après les connoissances positives que nous fournissent la chimie & la géologie dans leur état actuel de perfectionnement, la série , en quelque sorte *nécessaire* , des grands phénomènes ante-diluviens , l'auteur compulse le récit de Moïse , de la manière suivante :

« Au commencement Dieu créa les Cieux & la Terre. » — C'est-à-dire , le premier événement de l'histoire de la Terre est sa création , & celle des corps célestes semés dans l'espace. »

« Et la terre étoit sans forme & vide. » C'est-à-dire d'abord qu'il n'existoit pas de globe *antérieur* , des ruines duquel la terre actuelle eût

été formée. L'expression *sans forme & vide* est imparfaitement traduite de l'hébreu *Tobu Bobu*; Ainsworth remarque que *Tobu* désigne un état de confusion, & *Bobu* un vide. Elle étoit donc en partie dans un état de chaos & en partie vide, ainsi que l'auteur a montré que cela devoit être, d'après les phénomènes.

« Et les ténèbres étoient sur la face de l'abîme. » — La lumière n'existoit donc pas encore; Méde & Estius observent que l'expression hébraïque traduite par l'*abîme* ou les *profondeurs*, désigne un mélange confus de terre & d'eau. David dit Ps. CIV. v. 6. « Tu l'avois couverte de l'abîme comme d'un vêtement & les eaux se tenoient sur les montagnes. »

Il paroît donc que l'eau fut créée *liquide*, & que par conséquent le calorique existoit à cette première époque.

« Et l'esprit de Dieu (ou plutôt *un* esprit de Dieu) se mouvoit sur les eaux. » Le mot traduit par *esprit*, désigne en général un fluide élastique invisible. — *De Dieu*; les Hébreux désignoient ainsi tout ce qui étoit vaste. — *Se mouvoit*, plus exactement *recouvroit*, les eaux, ou *planoit* sur elles. Ici l'auteur voit les produits de l'évaporation que procura le calorique dégagé par la cristallisation dans le sein des eaux. David vient de nous apprendre un fait essentiel, qu'il tenoit sans doute de la tradition mosaïque; c'est que *les eaux surpassoient les mers*.

agnes ; donc celles-ci furent formées dans le sein d'un liquide. Il dit aussi « il a fondé la terre sur ses bases , tellement qu'elle ne fera point ébranlée à perpétuité. » Ceci dénote l'époque où les montagnes se formerent & s'affirment sur le noyau du globe.

« Et Dieu dit, » que la lumière soit , & la lumière fut. « Ici l'auteur remarque que les *faits* seulement , furent révélés à l'Ecrivain sacré ; & que les expressions durent toujours être assorties tant à ses propres notions qu'au langage du peuple auquel il transmettoit ces faits. Ainsi , *Dieu dit, Dieu vit que cela étoit bon*, &c. sont des phrases anthropologiques , qui ne signifient autre chose sinon que tels événemens , naturellement possibles , ont eu lieu en vertu des loix ou des forces établies par le Créateur.

Cette production de la lumière a lieu à l'époque où notre auteur a montré, que dans l'ordre des événemens naturels , les flammes des éruptions volcaniques ont dû paroître. Il n'a pas fait attention que cette époque est assez nettement désignée v. 4 du même psaume qu'il a cité & qui paroît être un abrégé de la tradition mosaïque. « Il fait des vents ses anges & du feu brûlant ses serviteurs » Moïse appelle *jour* cette lumière , d'après sa ressemblance avec le jour , qui , dans le sens ordinaire , désigne l'effet de la présence du soleil , & ne put avoir lieu que dans une époque subséquente.

« Et Dieu dit, » qu'il y ait une étendue entre les eaux, & qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. « Cette étendue ne peut être que l'atmosphère, qui contient les nuages, & sépare ainsi bien véritablement les eaux d'avec les eaux. »

» Puis Dieu dit ; que les eaux qui sont au-dessous des Cieux soient rassemblées en un lieu, & que le sec paroisse ; & il fut ainsi. » — Voilà le cinquième événement que Moïse place dans l'ordre que lui ont assigné des considérations purement physiques, & indépendantes de son récit.

Les événemens subséquens n'ont pas de rapport avec la géologie, à l'exception de la création des poissons, fait très-important dans la théorie de la terre.

Moïse, & les considérations physiques, nous apprennent que cette formation fut postérieure à la séparation des eaux d'avec les premiers continens & les montagnes primitives. L'auteur sacré nous dit aussi que la création des animaux terrestres fut subséquente à celle des poissons : ce fait est également indiqué par les observations géologiques ; car on trouve toujours les débris d'animaux près de la surface du sol, tandis que les poissons occupent les couches inférieures ; Buffon ne se contente pas d'admettre cet ordre de succession, il en fait une des bases de son système.

« Voilà donc, dit notre savant auteur, sept à huit faits principaux en géologie, qui d'une part, sont énoncés par Moïse, & de l'autre, déduits *a posteriori* des observations les mieux constatées par les naturalistes modernes. Les deux séries s'accordent parfaitement, non-seulement quant au *matériel* des faits, mais dans l'ordre des événemens successifs. Si nous admettons l'une de ces deux séries, la concordance avec l'autre est une preuve de la vérité de celle-ci. Si nous n'admettons ni l'un ni l'autre, alors leur accord reste à expliquer. Cet accord, rend infinie l'improbabilité que l'une & l'autre sont fausses; l'une des deux doit donc être véritable, & par conséquent aussi, l'autre. »

» Lorsqu'il ne seroit question que de deux événemens seulement; en supposant les sources où l'on en puise la connoissance, totalement distinctes & indépendantes l'une de l'autre, il seroit déjà très-improbable, si ces faits sont faux, que les récits fussent d'accord, soit pour le matériel, soit quant à l'ordre de succession de ces événemens : représentons cette improbabilité, seulement par la fraction $\frac{1}{10}$; alors l'improbabilité de l'accord de sept événemens, dans le cas où ils seroient faux, sera exprimée par la fraction $\frac{1}{10^7}$, c'est-à-dire, par le rapport de l'unité à dix millions : & cette improbabilité seroit encore beaucoup augmentée si l'on eût fait entrer dans le calcul la considération de

l'ordre de succession de ces événemens. »

Ici l'auteur termine la première partie de son intéressant Mémoire. Nous avons promis l'analyse de la seconde dans un prochain numéro ; c'est avec plaisir que nous tiendrons parole.

M É D E C I N E.

AN INQUIRY INTO THE CAUSES AND EFFECTS OF THE VARIOLÆ VACCINÆ, &c. Recherches sur l'origine & les effets d'une maladie connue dans quelques Comtés de l'Angleterre, & particulièrement dans le Gloucestershire, sous le nom de *Petite-vérole des vaches*, par Edouard JENNER, Dr. Méd. ; Membre de la Soc. Roy., &c. in-4°. 75 p. Londres 1798.

Premier Extrait.

UNE maladie cruelle & contagieuse, apportée de l'Orient par les Arabes, la Petite-vérole, ravage l'Europe depuis plusieurs siècles. Elle fait périr au moins la vingtième partie de ses habitans (1). En Asie, où elle est connue

(1) Depuis l'an 1661 jusqu'en 1772 il est mort à Londres 2,538,450 personnes, dont 193,432 de la Petite-vérole, c'est-à-dire, au moins une sur quatorze. Dans le même espace de temps, il en est mort à Co-

depuis un temps immémorial, elle ne seroit pas moins meurtrière, si l'on n'avoit trouvé & adopté depuis long-temps dans ce pays un moyen de diminuer infiniment ses dangers par l'inoculation. L'Europe a connoissance de ce moyen depuis près d'un siècle; mais elle n'a su en profiter qu'imparfaitement. En vain 80 ans d'expérience lui ont prouvé que lorsque les hommes ont une fois été atteints de la Petite-vérole, tant artificielle que spontanée, ils deviennent incapables de la prendre une seconde fois, & que d'un autre côté, la Petite-vérole inoculée est toujours infiniment plus bénigne que la Petite-vérole naturelle; au point qu'il ne meurt

nèze 76,050 dont 3972 de la Petite-vérole, c'est-à-dire, au moins une sur vingt. Et en calculant d'après la totalité de nos Extraits mortuaires depuis 1581 jusqu'en 1772, je trouve 116,935 morts, dont 7292 de la Petite-vérole, c'est-à-dire, au moins un sur seize (Voyez le *Journal de Médecine* de septemb. 1773 & Janvier 1776.) A Edimbourg, Mr. Alex. Monro rapporte que depuis 1744 jusqu'en 1763, il est mort 14,322 personnes, dont 2441 de la Petite-vérole, c'est-à-dire, plus d'une sur dix. (*Lettre à la Faculté de Paris.*) A la Haye, depuis 1755 jusqu'en 1769, il est mort 18,671 personnes, dont 1455 de la Petite-vérole, c'est-à-dire, plus d'une sur treize. (*Bibl. des Sciences* 1769.) Il seroit aisé d'accumuler les citations de ce genre. On trouveroit partout la mortalité de la Petite-vérole supérieure à celle qu'on annonce ici. (O)

pas un inoculé sur 300 (1), tandis qu'il en meurt au moins un sur dix de la Petite-vérole naturelle. L'Europe ne méconnoit point cet avantage de l'inoculation ; mais elle semble le dédaigner ; & l'on peut dire que même en Angleterre ,

(1) On a souvent porté beaucoup plus loin cette différence. C'est ainsi qu'en 1775 *Sutton* me disoit avoir inoculé entre 36 & 37,000 personnes , & n'avoir perdu que quatre de ces inoculés, dont trois n'avoient pas voulu suivre ses instructions. On nous a encore assuré que dans l'Hôpital des Enfants trouvés à Londres , (*Foundling-Hospital*) on a inoculé jusqu'à présent plus de 4000 enfans , sans en perdre un seul. Mais je me défie beaucoup de l'exactitude de ces rapports. Il faut bien supposer un mois pour l'inoculation. Or , dans tous les pays , à Londres surtout , il meurt au moins une personne sur trente par année , c'est-à-dire , une sur trois cent soixante par mois. Dire donc , que dans le mois destiné à l'inoculation , il n'est pas mort un inoculé sur 4000 , c'est dire , que l'inoculation a décuplé leur probabilité de vie , ce qui n'est guères vraisemblable. Cherchera-t-on à justifier l'inoculation , des morts accidentelles qui peuvent survenir pendant la durée de ce mois en les attribuant à des causes étrangères. C'est bien ce qu'on a souvent fait ; & c'est ce qui explique peut-être les exagérations des inoculateurs. Mais c'est se jeter dans un océan sans bornes , c'est s'ôter tout moyen d'estimer avec vérité la chance favorable à l'inoculation. Car rien n'empêche qu'on n'use du même artifice en faveur de la Petite-vérole naturelle ; & alors on ne saura plus à quoi s'en tenir. (O)

gleterre, où plus que partout ailleurs on a fait les plus grands efforts pour la rendre générale, il n'y a, comparativement à la grande masse des habitans, qu'un petit nombre d'individus qui aient été soustraits par ce moyen à l'influence meurtrière de la petite-vérole naturelle; que la plupart des peres & des meres négligent d'y avoir recours pour leurs enfans; & que partout les gouvernemens, s'ils n'ont pas indirectement blâmé ou même absolument pros crit l'inoculation, ne l'ont au moins que foiblement encouragée.

Qu'est-ce qui a pu produire cette funeste insouciance? C'est peut-être 1°. que quoique la petite-vérole inoculée, soit pour l'ordinaire une maladie peu dangereuse, il est cependant vrai qu'on a vu quelquefois des inoculés avoir la petite-vérole confluyente & en mourir, mort qui étant pour ainsi dire provoquée, a naturellement dû laisser beaucoup plus de regrets & répandre beaucoup plus d'effroi que celles qui ont été la suite d'une maladie spontanée. On sent que jamais une mere ne peut se consoler d'un malheur de ce genre, & la seule possibilité de perdre ses enfans d'une manière aussi déchirante a dû fréquemment suffire pour imposer silence à la raison. 2°. Que quoique les foyers de contagion soyent infiniment moins multipliés par la petite-vérole inoculée que par la petite-vérole naturelle, puisque le nombre

des boutons y est beaucoup moins considérable ; on ne peut nier cependant que la petite-vérole inoculée ne soit jusqu'à un certain point contagieuse. Les gouvernemens ont pu craindre que les encouragemens qu'ils donneroient à cette pratique ne fussent un moyen de répandre la contagion & d'augmenter par-là les ravages de la petite-vérole naturelle , crainte d'autant plus plausible qu'elle a été suggérée plus d'une fois par des médecins très-célebres , & en apparence accréditée par l'augmentation de mortalité de cette maladie à Londres , depuis que l'inoculation y est devenue en usage (1).

(1) Cette objection a surtout été fortement pressée par Mrs. Dehaën & Raft ; mais j'ai démontré son peu de fondement , en faisant voir que l'augmentation de mortalité de la petite-vérole à Londres depuis le commencement de ce siècle n'a point été proportionnée aux progrès de l'inoculation ; qu'elle avoit commencé avant qu'on inoculât ; qu'elle tenoit à une augmentation réelle de malignité dans la maladie , & non à un plus grand nombre de malades ; qu'on n'avoit rien observé de semblable à Genève , où l'on n'a cessé d'inoculer toutes les années , épidémiques ou non , depuis 1751 , un très-grand nombre d'enfans , & qu'enfin la même augmentation avoit eu lieu à Londres , & dans la même proportion relativement à d'autres maladies épidémiques & contagieuses , telles que la rougeole , qui ne sont pas susceptibles d'inoculation. (Voyez mes *Lettres à Mr. Dehaën sur la mortalité de la petite-vérole*, *Journal de Médecine* de 1773, 1776 & 1777). (O)

Si donc on trouvoit un préservatif, une maniere d'inoculation qui mit infailliblement les hommes à l'abri de la petite-vérole, sans leur faire courir les dangers d'une éruption trop abondante, & sans avoir pour le public l'inconvénient de répandre la contagion, on pourroit espérer que ce moyen, plus généralement adopté, détruiroit enfin les germes de cette terrible maladie, pour la faire disparaître de dessus la face de la terre.

L'ouvrage que nous annonçons indique un préservatif de ce genre, une maniere d'inoculation qui garantit sûrement de la petite-vérole, sans jamais produire aucune éruption générale, & sans que la maladie qui en résulte soit susceptible de se répandre de proche en proche par la contagion, à moins que le virus ne soit fortuitement ou volontairement introduit entre l'épiderme & la peau.

Indépendamment de ce double avantage, cette découverte est singulière, & digne de l'attention des Philosophes; parce que si elle se vérifie, elle peut conduire à quelques recherches utiles sur l'origine de la petite-vérole & des autres maladies contagieuses: parce qu'elle présente des phénomènes nouveaux sur la marche & la propagation de ces maladies; parce qu'enfin elle seroit, au moins dans les pays de laiteries, d'une grande utilité pour prévenir une maladie des bestiaux qui sans être bien dangereuse,

ne laisse pas d'être fort à charge aux propriétaires de grandes fermes. C'est-ce qui nous fait espérer que nos lecteurs nous sauront gré de mettre sous leurs yeux la presque totalité de cet ouvrage qui n'est pas bien volumineux, & dont nous prendrons d'ailleurs la liberté d'élaguer les détails superflus.

Voici d'abord comment notre auteur expose le fait dont il s'agit.

« Les chevaux sont fréquemment atteints d'une maladie que les maréchaux ferrans appellent le javart (1); (*the grease*) c'est une tumeur inflammatoire qui leur survient au bas de la jambe, tumeur dont sort un pus qui a des propriétés très-particulières, & qui semble

(1) Je ne suis point parfaitement assuré que la maladie des chevaux dont il est ici question, (*the grease* ou *fore-heels*) soit bien ce qu'on appelle en Français le javart. Le Cit. Sylvestre, médecin vétérinaire de cette ville, qui y exerce son art depuis plus de 17 ans, m'assure que le javart est une maladie fort rare; qu'il ne l'a vue que sept à huit fois, & qu'il n'a jamais eu connoissance qu'elle se fût communiquée aux hommes ou aux bêtes. Mais je n'ai trouvé dans les auteurs vétérinaires, dans le Dictionnaire de *Lafosse*, par exemple, aucune autre maladie des chevaux qui répondit à ce qu'en dit notre auteur; & les circonstances dans lesquelles se trouvent à cet égard les grandes laiteries de l'Angleterre sont si rares partout ailleurs, qu'il n'est pas surprenant que la petite-vérole des vaches ne soit connue que là. (O).

capable de produire dans le corps humain, au moyen de quelques modifications dont je parlerai bientôt, une maladie tellement semblable à la petite-vérole, qu'il me paroît probable que celle-ci peut avoir tiré de-là son origine.

» Dans ce pays abondant en pâturages (l'auteur demeure à Berkeley dans le Comté de Gloucester) on nourrit un grand nombre de vaches, & l'on occupe à les traire des hommes & des femmes indistinctement. Or, si après avoir pansé les ulcères d'un cheval atteint du javart, un homme se met à traire les vaches, sans avoir auparavant la précaution de se laver les mains, il arrive souvent que le pus de ces ulcères s'attachant à ses doigts, il communique aux vaches, une maladie que celles-ci transmettent à leur tour aux autres personnes qui les traitent; & de cette manière la maladie se propage tellement que tout le troupeau en est atteint, ainsi que tous les domestiques attachés à la laiterie.

» Cette maladie porte dans le pays le nom de petite-vérole des vaches, (*cow-pox.*) Elle se manifeste sur le pis des vaches sous la forme de pustules irrégulières, qui dès leur première apparence sont d'un bleu pâle, ou plutôt un peu livides & entourées d'une inflammation érysipélateuse. Ces pustules dégénèrent fréquemment en ulcères phagédéniques ou rongeans, qui à moins qu'on n'y remédie à temps, don-

nent beaucoup de peine pour leur guérison (1). L'animal devient malade, & son lait diminue beaucoup. Des taches enflammées commencent alors à paroître sur les mains & les poignets des domestiques employés à traire les bêtes infectées. Ces taches viennent promptement à suppuration, ressemblant d'abord aux ampouilles produites par une brûlure. Ordinairement elles se manifestent sur les jointures, & à l'extrémité des doigts, sous une forme circulaire. Leurs bords sont plus relevés que le centre, & elles ont une couleur un peu bleuâtre. Le pus s'absorbe ensuite, & il se manifeste des tumeurs sous les aisselles. Alors tout le système s'en ressent. Le malade éprouve des frissons, une lassitude générale, des douleurs vagues dans les lombes & dans les membres, des maux de cœur & des vomissemens. Il se plaint constamment de mal de tête, & il survient même quelquefois du délire. Ces symptômes continuent avec plus ou moins de violence depuis un jour jusqu'à trois ou quatre, & sont accompagnés d'ulcères sur différentes parties des mains, d'ulcères qui sont très-douloureux, très-

(1) Les remèdes usités avec succès dans le pays pour arrêter les progrès des ulcères, sont des remèdes chimiques de nature à agir directement sur le virus, tels que les solutions de sulfates de zinc, de cuivre, &c. (A.)

incommodes , lents à se cicatrifer , souvent phagédéniques comme ceux dont ils ont tiré leur origine. Les levres, les narines , les paupieres en font auffi quelquefois affectées ; mais cela n'arrive que lorsque le malade a l'imprudence d'y porter le pus de ses doigts en se grattant. Je n'ai jamais vu d'éruption en d'autres parties du corps suivre la fièvre , si ce n'est en un seul cas , où il sortit sur le bras quelques boutons très-petits , d'un rouge vif , & qui se flétrirent promptement sans suppurer ; ce qui me fait douter qu'ils eussent aucune connexion avec les symptômes antécédens. »

» Telle est la marche de la maladie , qui se communique d'abord du cheval au pis de la vache & de la vache aux domestiques occupés à la traire. Il est possible que toute espece de pus absorbé par la peau produise des effets jusqu'à un certain point semblables ; mais une propriété particulière à cette maladie & qui mérite surtout notre attention , c'est que toutes les personnes qui en ont été atteintes , deviennent dès lors & pour toujours à l'abri de la petite-vérole , & incapables de la prendre soit par contagion , soit par inoculation. C'est surtout ce fait extraordinaire que je vais prouver par un grand nombre d'observations. »

L'auteur en rapporte ici en détail 23 , que nous allons transcrire sans rien omettre d'essentiel , mais en abrégeant celles qui ne sont qu'une

répétition des mêmes faits , & qui ne méritent d'être rapportées séparément qu'en considération de quelque circonstance particulière.

Il est bon de remarquer auparavant avec l'auteur , que l'on voit fréquemment des ulcères & des pustules se manifester spontanément sur le pis des vaches , dans toutes les saisons de l'année ; mais surtout au printemps lorsqu'on les met à l'herbe. Elles y sont aussi plus sujettes lorsqu'on les laisse nourrir leur veau. Quelquefois , mais rarement , les domestiques employés à les traire dans cet état , en contractent des ulcères aux mains , & éprouvent même quelques symptômes d'indisposition en conséquence de l'absorption du pus. Mais ces sortes de pustules sont toujours d'une nature beaucoup plus bénigne que celles que produit la contagion qui constitue la véritable petite-vérole des vaches. Elles n'ont jamais cette apparence bleuâtre & livide qui est si manifeste dans celle-ci. Elles ne sont accompagnées d'aucun érysipèle , & n'ont aucune disposition à former un ulcère phagédénique ; mais elles se terminent promptement par une croûte , sans produire sur la vache aucune affection générale. En un mot , c'est une maladie très-différente de celle dont il est question dans cet ouvrage , & qui n'a point les mêmes effets sur le corps humain. C'est à quoi il faut bien faire attention pour ne pas croire trop légèrement à l'abri de la

petite-vérole les malades qui en sont atteints.

Première Observation. Joseph Merret, actuellement sous-jardinier du Comte de Berkeley, étoit domestique chez un fermier du voisinage en 1770; & aidait occasionnellement son maître à traire les vaches. Plusieurs chevaux de la ferme furent atteints du javart, & Merret les pansoit. Les vaches furent dans peu affectées, & bientôt après, il survint aux mains du domestique plusieurs ulcères qui furent suivis de tumeurs, & de roideur dans les aisselles. Il en fut tellement indisposé que pendant plusieurs jours il ne put vaquer à ses occupations ordinaires.

Avant que la maladie se manifestât parmi les vaches, aucun des domestiques n'en étoit attaqué, & l'on n'avoit amené dans la ferme aucune vache nouvelle.

En 1795, c'est-à-dire 25 ans après, on fit à Berkeley une inoculation générale. Merret fut inoculé avec sa famille. On lui fit à plusieurs reprises & avec beaucoup de soin plusieurs incisions au bras sans pouvoir lui donner la petite-vérole. Il n'y eut qu'une légère efflorescence d'un rouge pâle autour des incisions, avec une apparence érysipélateuse dans le centre, efflorescence, dit l'auteur, qu'on voit souvent dans les personnes qu'on inocule après qu'elles ont eu la petite-vérole, & qui dans ces cas là est toujours beaucoup plus prompte que celle

qui survient en conséquence d'une inoculation qui réussit (1). Merret demeura avec les autres

(1) Cette inflammation locale qui survient autour des incisions faites avec du pus variolique aux personnes qui ont eu la petite-vérole, paroît avoir été mieux observée par notre auteur que par aucun autre. Quant à moi, je n'ai jamais inoculé personne qui eût bien certainement eu la petite-vérole, à ma connoissance ; mais j'ai fréquemment inoculé sans succès & à plusieurs reprises des personnes qui ne savoient pas si elles l'avoient eue & qui vouloient se mettre à l'abri de toute crainte. Or il m'est arrivé aussi souvent de ne voir survenir dans ces cas là aucune inflammation, que de voir celle que décrit ici Mr. Jenner. Quand je l'ai vue, je l'ai considérée comme un demi effet du virus & comme une raison de réinoculer, ce qui m'a quelquefois réussi pour produire enfin une petite-vérole complete. D'un autre côté, j'ai vu dans quelques cas une inflammation très-prompte, très-étendue, & même une fois accompagnée de beaucoup de fièvre & de convulsions, survenir le jour même de l'inoculation, se dissiper ensuite, & faire place cependant à la véritable inflammation locale de la petite-vérole, qui commence pour l'ordinaire au 5^e. jour, & produit l'affection générale au 7^e. ou 8^e. J'ai vu des cas dans lesquels cette première inflammation sans être bien étendue, avoit produit un bouton suppurant qui se terminoit par une croûte, après la chute de laquelle commençoit la véritable inflammation. Enfin ce qui est encore plus singulier, j'ai vu deux cas dans lesquels au 8^e. jour d'une inoculation qui n'avoit produit aucune apparence quelconque d'inflammation locale, & où la trace des incisions étoit à

inoculés pendant tout le temps que dura la petite-vérole. Un d'eux en eut abondamment.

Il est à remarquer que dans ce cas, ainsi que dans tous ceux qui suivent, on s'étoit parfaitement assuré que les individus dont il est question n'avoient point eu la petite-vérole ordinaire, avant de subir les tentatives qu'on fit pour la leur donner. Cette certitude seroit peut-être difficile à avoir dans une grande ville, ou dans un canton très-peuplé. Mais à Berkeley où la population est très-petite, & où l'on tient note avec beaucoup de soin de ceux qui ont eu la petite-vérole, il n'y avoit aucun risque d'inexactitude à cet égard.

2^{de}. *Observation.* Il y avoit 27 ans que Sarah Partlock avoit eu la petite-vérole des vaches, lorsque son enfant prit la petite-vérole ordinaire. Elle le soigna pendant sa maladie, & se fit inoculer aux deux bras. Mais l'inoculation ne prit point. On n'en observa aucun autre effet que ceux qui avoient eu lieu dans le cas précédent.

3^{me}. *Observation.* John Philips avoit eu la petite-vérole des vaches à l'âge de 9 ans. On lui inocula la petite-vérole ordinaire à l'âge de 62 ans. Le pus fut pris des bras d'un enfant

peine visible, il survint cependant une petite-vérole très-bénigne & très-bien caractérisée. Mais toutes ces anomalies n'empêchent pas que l'observation de Mr. Jenner ne puisse être généralement bien fondée. (O)

inoculé, immédiatement avant la fièvre éruptive, dans le moment de sa plus grande activité (1). Il ne fut point délayé. On l'inféra sur le champ. Le malade ressentit bientôt aux incisions une douleur semblable à celle d'un aiguillon. Une légère efflorescence parut ensuite tout autour. Elle s'étendit au 4^{me}. jour, & fut suivie d'un peu de douleur & d'enroidissement aux aisselles. Mais au 5^{me}. jour, ces symptômes diminuèrent, & deux jours après, ils se dissipèrent entièrement, sans produire aucune indisposition générale.

(1) C'est ce que j'ai constamment vu. Jamais aucune inoculation ne m'a mieux réussi & d'une manière plus régulière que lorsque j'ai pu inoculer avec un pus encore limpide & non délayé. Un pus épais manque souvent, même quand il est délayé. Cependant on vient d'imprimer dans un Journal nouveau, dont on doit naturellement attendre beaucoup d'instruction, que Mr. le Professeur Hufeland, d'Iena recommande pour l'inoculation, de prendre un pus *bien cuit* & bien formé, parce qu'une matière qui n'est pas mure, prise » avant la bonne suppuration ne produit souvent que » la fausse petite-vérole, tandis qu'une matière bien » cuite en produit toujours une belle. » (*Bibliothèque Germanique*, N^o. 1. pag. 8 & 11.). De la part d'un praticien aussi célèbre que le Professeur Hufeland, cette assertion m'étonne, parce qu'elle est diamétralement contraire à ce que j'ai cru voir; mais en lisant le reste du Mémoire, il me semble qu'en cette occasion il a plutôt écrit d'après ce qu'il croyoit, que d'après ce qu'il avoit vu. (O)

4^{me}. *Observation.* Mary Barge fut inoculée en 1791. L'inoculation produisit autour des incisions une efflorescence d'un rouge pâle qui se dissipa dans quelques jours sans aucune indisposition. La malade servit ensuite de garde à plusieurs enfans atteints de la petite-vérole. Mais elle ne la prit point. Elle avoit eu la petite-vérole des vaches 31 ans auparavant.

5^{me}. *Observation.* L'inoculation faite avec un pus très-actif, & avec beaucoup de soin, n'eut pas plus d'effet en 1778 sur une vieille Dame qui avoit pris la petite-vérole des vaches dans son enfance, pour avoir manié les ustensiles dont se servoient des domestiques qui en étoient atteints. Elle avoit peu de temps après cet événement, vu & soigné une de ses parentes qui mourut de la petite-vérole, sans en avoir elle-même aucune apparence.

6^{me}. *Observation.* La propriété qu'a la petite-vérole des vaches de préserver de la petite-vérole ordinaire est jusqu'à un certain point réciproque. Ceux qui ont eu celle-ci, ne sont pas susceptibles de prendre celle-là ou ne la prennent que très-légèrement. Ce fait est si bien connu parmi nos fermiers, qu'aussitôt que la maladie se manifeste dans le troupeau, on cherche à se procurer des domestiques qui aient eu la petite-vérole: sans quoi tout le train ordinaire de la ferme pourroit être arrêté.

Au mois de mai 1796, la petite-vérole des

vaches se manifesta chez Mr. Baker, fermier demeurant dans le voisinage de Berkeley. La maladie étoit venue d'une vache infectée qu'on avoit achetée à la foire. Aucune des vaches de la ferme ayant du lait, & elles étoient au nombre de 30, n'échappa à la contagion. La famille consistoit en deux domestiques mâles & deux servantes qui, ainsi que le fermier lui-même, étoient occupés deux fois par jour à traire les vaches. Ils avoient tous eu la petite-vérole à l'exception de Sarah Wynne, une des servantes. Aussi le fermier & le plus jeune des valets échappèrent entièrement à la contagion. L'autre valet & l'autre servante n'eurent qu'un ulcère sur un de leurs doigts qui ne produisit aucune affection générale.

Sarah Wynne n'en fut pas quitte à si bon marché. Elle prit la maladie d'une manière si violente qu'elle fut obligée de se mettre au lit, & fut pendant plusieurs jours incapable de suivre à ses occupations ordinaires dans la ferme. Au mois de mars 1797, j'inoculai cette fille avec beaucoup de soin. Il parut, comme à l'ordinaire, un peu d'inflammation autour des incisions; mais dès le cinquième jour cette inflammation disparut entièrement sans produire aucune affection générale.

7^{me}. *Observation.* La petite-vérole ordinaire ne préserve cependant pas toujours aussi complètement ni aussi sûrement de la petite-vérole des vaches.

Chez Mr. Andrews , autre fermier du voisinage, une vache achetée à la foire dans l'été de 1796, infecta de même toutes les vaches de la ferme. La famille consistoit en six personnes, le fermier, sa femme, ses deux fils, un valet & une sèrvante. Tous s'aiderent à traire les vaches, excepté le fermier qui craignit pour lui-même les conséquences de la maladie. Tous, à l'exception du valet, Will. Rodway, avoient eu la petite-vérole. Cependant aucun d'eux n'échappa entièrement à la contagion. Ils eurent tous des ulcères aux mains, & quelques symtômes d'indisposition générale précédés de douleurs & de tumeurs aux aisselles. Mais la maladie qu'éprouverent ceux qui avoient eu la petite-vérole, fut incomparablement plus bénigne que celle du valet qui ne l'avoit pas eue. Car il fut obligé de se mettre au lit pendant plusieurs jours, tandis que les autres purent facilement vaquer à leurs occupations ordinaires.—Au mois de février 1797 j'inoculai William Rodway. Toutes les incisions s'enflammèrent au troisieme jour; mais cette inflammation se dissipa bientôt; & à l'exception d'une légère rougeur érysipélateuse qui dura jusqu'au 8^{me}. jour, & qui alors produisit pendant une demi-heure seulement, une sensation désagréable à l'aisselle droite, il n'y eut aucun symptôme d'affection générale.

8^{me}. *Observation.* Quelque bénigne qu'ait

été la petite-vérole des vaches, dans le corps humain, à quelque distance qu'elle se soit manifestée, du moment où l'on est exposé à la contagion de la petite-vérole ordinaire, elle conserve toujours la propriété d'en préserver complètement. — Elisabeth Wynne avoit eu la petite-vérole des vaches à l'âge de 19 ans; mais si légère que la maladie s'étoit bornée à un petit ulcère sur le petit doigt de la main gauche, & à peine y avoit-il eu quelques symptômes d'indisposition générale. Trente-huit ans après, je lui inoculai la petite-vérole ordinaire. Une légère efflorescence se manifesta bientôt autour des incisions, & la malade y éprouva une sensation douloureuse jusqu'au 3^{me}. jour, que ces symptômes commencèrent à diminuer. Au cinquième jour, ils se dissipèrent entièrement, sans aucune apparence d'indisposition générale.

9^{me}. *Observation.* Puisque la petite-vérole ordinaire ne se manifeste jamais qu'une fois dans la vie, & que la petite-vérole des vaches en garantit sûrement, il semble que celle-ci ne devrait non plus se manifester qu'une fois dans le même individu, & que quand on l'a eue, on devrait en être à l'abri. Cependant il est démontré qu'on peut l'avoir plusieurs fois. Il est vrai que pour l'ordinaire, elle est plus bénigne à la seconde qu'à la première, même dans les vaches; mais quelquefois elle est tout aussi forte. En voici un exemple. — William Smith

de

de Pyrton étant en 1780 chez un fermier du voisinage, fut appelée à panser les ulcères d'un des chevaux de la ferme qui avoit pris le javart. Il porta l'infection aux vaches, & en fut ensuite lui-même atteint. Il eut plusieurs ulcères aux mains & les symptômes ordinaires d'affection générale décrits ci-dessus. En 1791 il se trouvoit chez un autre fermier, parmi les vaches duquel la maladie se manifesta, & il la prit pour la seconde fois aussi fortement que la première. Enfin il l'eut une troisième fois en 1794, sans aucune diminution de gravité dans les symptômes. En 1795, il fut inoculé deux fois, mais sans succès, & dès-lors il a impunément bravé la contagion de la petite-vérole.

10^{me}. *Observation*. Le développement des maladies contagieuses ne se fait pas toujours dans un espace de temps uniforme. L'affection générale qui résulte de la petite-vérole des vaches commence pour l'ordinaire comme celle de la petite-vérole inoculée, sept à huit jours après le moment de l'infection. Mais il n'est pas rare de voir la petite-vérole inoculée ne se manifester que long-temps après l'insertion du pus variolique (1). Voici un exemple très-

(1) L'intervalle le plus long que j'aye vu s'écouler entre le moment de l'insertion de la petite-vérole, & le commencement de l'inflammation, a été de dix-sept jours. C'étoit un enfant de deux ans. Croyant que l'inoculation manquoit, je le réinoculai; mais en

remarquable mais peu précis du long intervalle qui s'écoule aussi quelquefois entre le moment de l'infection, & celui où les symptômes de la petite-vérole des vaches commencent à paroître.

Simon Nichols étant en 1782 domestique chez Mr. Bromedge à Berkeley, eut à panser les ulcères d'un cheval atteint du javart, & en même temps à traire les vaches. Celles-ci devinrent malades, mais ce ne fut que quelques semaines après le pansement des chevaux par Nichols que les pustules commencèrent à se manifester sur le pis des vaches. Nichols quitta le service de Mr. Bromedge & entra chez un autre fermier. Il n'avoit point encore d'ulcères, mais bientôt ils se manifestèrent, & il eut tous les symptômes de la petite-vérole des vaches dans un degré assez violent : il cacha la nature de sa maladie, continua à traire les vaches de son nouveau maître & la leur communiqua. Quelques années après, la petite-vérole s'étant manifestée dans la maison dans laquelle il se trouvoit, je l'inoculai avec plusieurs autres personnes qui la prirent, &

découvrant son bras, j'aperçus un commencement de rougeur & d'élévation à l'endroit de l'incision. Je l'inoculai cependant pour la seconde fois. Mais les premières incisions seules s'enflammerent. Les secondes manquèrent absolument, & la petite-vérole fit son cours d'une manière très-régulière & très-heureuse. (D)

PETITE-VÉROLE DES VACHES. 279

avec lesquelles il demeura pendant toute sa durée. Mais ni l'inoculation, ni la communication avec les autres malades n'eurent aucun effet sur lui. Il eut une inflammation passagère aux incisions, & rien de plus.

11^{me}. *Observation.* William Stinchcomb seroit avec Nichols chez Mr. Bromedge, lorsque les vaches furent infectées. La contagion l'atteignit aussi d'une manière grave. Il eut plusieurs ulcères rongeans à la main gauche, & une tumeur considérable à l'aisselle du même côté. Le côté droit fut aussi affecté, mais beaucoup moins. En 1792, Stinchcomb fut inoculé avec plusieurs autres personnes, & demeura avec elles pendant tout le temps de la petite-vérole, qui se manifesta chez elles avec plus d'abondance qu'à l'ordinaire. Quant à lui, il n'eut qu'une inflammation passagère aux incisions; mais il fut frappé de la ressemblance qu'il observa entre les symptômes qu'éprouverent ses compagnons, & ceux qu'il avoit éprouvés lui-même, lorsqu'il avoit eu la petite-vérole des vaches, & il en fit plusieurs fois la remarque.

—12^{me}. *Observation.* Tous les pauvres du village de Fortworth furent inoculés en 1795 par M. Henry Jenner, chirurgien de Berkeley. Huit d'entre eux avoient eu la petite-vérole des vaches dans différentes périodes de leur vie. J'en avois vu moi-même Hester Walkley affecté

M É D E C I N E.

grièvement atteinte en 1782. Mais ni elle, ni les sept autres personnes qui avoient eu cette maladie, parmi lesquelles il se trouvoit plusieurs femmes enceintes, ne prirent la petite-vérole, quoiqu'elles demeurassent constamment avec les autres inoculés.

13^{me}. *Observation.* La petite-vérole des vaches tirant son origine du javart, il arrive quelquefois que les hommes qui pansent les chevaux atteints de celui-ci, contractent directement les mêmes symptômes que produit celle-là, quoique cela ne soit pas bien ordinaire. Quand cela a lieu, la maladie qui en résulte garantit aussi jusqu'à un certain point de la petite-vérole ordinaire (1). Mais pas aussi sûrement que quand elle se communique par les vaches. Sur trois malades auxquels la maladie avoit été communiquée directement par des chevaux, l'un devint par-là, incapable de prendre la petite-vérole ordinaire; un autre la prit, mais incomplète; le troisième enfin l'eut complète, mais très-bénigne. Voici ces trois observations.

Thomas Pearce avoit eu des ulcères aux

(1) C'est peut-être par cette raison que tous les inoculateurs ont remarqué en Angleterre que quand on inocule des ferruriers, (qui dans la campagne font presque tous l'office de maréchaux ferrans) l'inoculation manque souvent, ou ne leur communique qu'une petite-vérole anormale & imparfaite. (A)

doigts, suivis d'une indisposition générale bien marquée & assez grave, après avoir pansé des chevaux atteints du javart. Six ans après, je lui inoculai à plusieurs reprises la petite-vérole ; sans pouvoir produire en lui aucun autre effet qu'une inflammation locale, peu considérable, très-prompte & passagère autour des incisions.

14^{me}. *Observation.* Mr. James Cole avoit été affecté de la même manière pour avoir pansé des chevaux atteints du javart. Je l'inoculai quelques années après avec du pus variolique. Il eut un peu de douleur à l'aisselle & une légère indisposition générale qui ne dura que trois ou quatre heures. Il lui survint ensuite quelques boutons au front, mais qui disparurent bientôt, sans suppurer.

15^{me}. *Observation.* La jument de Mr. Abraham Riddiford ayant pris le javart, il la pansa lui-même, & eut, bientôt après, des ulcères aux mains, des tumeurs à chaque aisselle, & une indisposition générale assez grave. Un chirurgien du pays l'assura que cette maladie le mettoit pour toujours à l'abri de la petite-vérole. Il se trompoit. Car 20 ans après, le malade s'étant exposé à la contagion, il la prit, mais très-régulière & très-bénigne. Il est vrai que les boutons n'eurent pas l'apparence ordinaire, sans qu'on pût exprimer en quoi ils en différoient. D'autres praticiens qui virent le malade apperçurent comme moi cette différence.

mais quelques doutes qu'elle pût donner sur la réalité de la maladie, ils furent bientôt levés par l'inoculation de quelques personnes avec le pus contenu dans ces boutons. Elles eurent une petite-vérole régulière & dont les boutons furent exactement ce qu'ils devoient être.

16^{me}. *Observation.* Sarah Nelmes, laitière chez un fermier du voisinage, prit la petite-vérole des vaches de la manière ordinaire; mais elle reçut l'infection sur une écorchure qu'elle s'étoit faite à la main avec une épine. Il en résulta un gros bouton ulcéré & accompagné de tous les symptômes qui constituent la maladie; mais ce bouton me parut si bien caractérisé que je le fis graver dans son état d'ulcération complète, pour donner une idée nette de la maladie. On voit sur la gravure deux autres boutons qu'elle eut en même temps au poignet, & un autre sur l'index, qui a été dessiné d'après un autre malade pour montrer leur apparence lorsqu'ils commencent à se manifester. (1)

(1) Cette gravure, ainsi que trois autres qui se trouvent dans le corps de l'ouvrage, portent le nom d'Edouard Pearce, dessinateur, & Wil. Skefton, graveur. Elles sont colorées & d'une grande beauté. Il est impossible de rien voir de plus parfait tant pour le coloris que pour les formes. C'est exactement comme si l'on voyoit les malades eux-mêmes. Pourquoi n'a-t-on pas des gravures semblables pour toutes les maladies de la peau? On en auroit une idée bien plus parfaite que celle que peut donner la meilleure description en paroles. (R)

17^{me}. *Observation*. La petite-vérole des vaches peut comme la petite-vérole ordinaire, s'inoculer artificiellement, & alors elle est communément plus bénigne que quand elle vient naturellement par le contact des vaches; mais elle a la même propriété & garantit aussi sûrement de la petite-vérole.

Un jeune garçon de huit ans & d'une bonne santé, fut inoculé le 14 mai 1796 avec le pus d'un des ulcères survenus aux mains de Sarah Nelmes. Les deux incisions pénétoient à peine jusqu'à la peau, & avoient environ un demi-pouce de long. Au 7^{me}. jour, il se plaignit d'une sensation de mal-aise à l'aisselle. Au 9^{me}. il eut des frissons, du dégoût & un léger mal de tête. Il fut malade tout ce jour-là & eut beaucoup d'inquiétude la nuit suivante. Mais le lendemain il étoit parfaitement bien. L'apparence des incisions dans leur progrès vers la suppuration fut à-peu-près la même que s'il avoit été inoculé avec du pus variolique ordinaire. Seulement la sérosité limpide contenue dans l'ampoule étoit d'une couleur un peu plus foncée, & l'efflorescence des incisions étoit d'un rouge un peu plus vif que dans l'inoculation de la petite-vérole ordinaire (c'est le sujet de la 2^{de}. gravure). Mais les incisions se séchèrent & se terminèrent par une croûte exactement semblable à celle de la petite-vérole.

Curieux de voir si une maladie aussi légère auroit garanti cet enfant de la petite-vérole, je l'inoculai le 1. juillet suivant avec du pus variolique frais & non délayé. Je fis sur ses deux bras plusieurs piqûres & incisions que je frottai bien avec ce pus ; mais il n'en résulta que l'inflammation passagère qu'on voit ordinairement quand on inocule ceux qui ont eu la petite-vérole des vaches ou la petite-vérole ordinaire ; & une seconde inoculation faite plusieurs mois après avec du pus variolique bien choisi n'eut pas plus d'effet.

Ici finissent les premières observations de l'auteur. L'humidité du printemps de cette année ayant produit le javart dans plusieurs chevaux du voisinage , & la maladie s'étant communiquée aux vaches de plusieurs laiteries , il eut occasion de faire de nouvelles recherches qui feront le sujet d'un autre Extrait.

(*La suite au Numéro prochain.*)

C H I M I E.

OBSERVATIONS ET EXPERIMENTS, &c. Observations & expériences sur la formation du fer ; par Mr. SMITH : & annonce d'une découverte sur la faculté qu'ont les terres simples d'absorber l'oxigene ; par HUMBOLDT.

MR. SMITH, après avoir montré, dit-il, dans des mémoires précédens (qui ne nous sont pas connus) que les terres calcaire & argilleuse ; la terre végétale , ou le terreau proprement dit ; enfin que le soufre & le phosphore peuvent se retirer de l'air commun , & que la force vitale tant animale que végétale est l'agent principal de la formation de ces substances, se persuade maintenant que cette même force , en décomposant, de diverses manieres, l'air & l'eau , forme ou produit, toutes les substances terrestres sans exception.

On fait que le fer se trouve partout & en particulier dans les matieres animales & végétales ; & à cet égard, l'auteur se demande si ce métal est , comme l'argile , formé par l'action vitale, ou bien s'il est produit dans l'acte même de la décomposition de ces substances ? Il penche vers cette dernière opinion , & cherche à l'établir par quelques expériences.

Dans la première, il fait croître cinq plantes de cresson dans un mélange d'argile & de terre siliceuse, humectées d'eau; & après avoir desséché & incinéré ces plantes, & lessivé leurs cendres, il trouve, par l'essai du prussiate de potasse, qu'il se précipite du bleu de prusse dans la lessive, & que par conséquent elle contient du fer. Cependant les terres dans lesquelles ces plantes ont végété n'ont perdu aucune partie sensible de leur poids.

Mais, comme il seroit, à la rigueur, possible que ces plantes eussent extrait de ces terres une quantité de fer si petite qu'elle eût échappé aux instrumens employés pour s'assurer du poids de celles-ci avant & après l'expérience, l'auteur s'y prend d'une autre manière pour obtenir un résultat qui ne prête pas à cette objection. Nous transcrirons mot à mot son procédé.

» Je pris, dit-il, un quart d'once de crin de cheval, cuit au four ainsi qu'on le prépare pour garnir les meubles. Je le tins pendant douze heures dans une température de 105 degrés ($32\frac{4}{5}$ R.) au moyen d'une lampe à esprit-de-vin. J'en pesai ensuite 60 grains. Je choisiss cette substance afin que les racines des plantes que j'y ferois croître pussent en être dégagées sans danger de les rompre, ce qui seroit arrivé si j'eusse employé du coton, de la flanelle ou des chiffons de toile. Je mis ce crin dans un vaisseau plat & j'y semai soixante grains de mou-

tarde. Je mis le tout dans une serre chaude. Les plantes s'élevèrent très-haut, dans l'espace de huit jours, à raison de la chaleur & du défaut de renouvellement dans l'air. Je les fortis à cette époque, & après avoir soigneusement dégagé toutes les racines je desséchai le crin à la même température que précédemment, & je lui trouvai précisément le même poids. Les plantes pesoient deux onces & un quart, & je leur avois fourni quatre onces & demie d'eau de pluie dans divers arrosemens. Je pris une once de ces plantes que je fis sécher & que je réduisis en cendres, comme dans la première expérience; je versai sur six grains de ces cendres un quart d'once d'eau distillée, & je décantai cette lessive. Elle verdissoit le syrop de violettes, comme dans la première expérience. Vingt gouttes d'acide marin versées dans la liqueur produisirent de même une effervescence (1). Je fis deux parts de cette lessive. Dans l'une je versai de la solution de prussiate de potasse, & il parut un précipité abon-

(1) Nous dirons, en faveur de ceux de nos lecteurs qui ne connoitroient pas les conséquences qu'on tire à l'ordinaire des effets de ces deux réactifs, que la conversion des couleurs bleues végétales en vert, indique la présence d'un alkali, (qui sans doute étoit ici la potasse); & que l'effervescence qui suit l'affusion d'un acide dans un mélange, annonce la présence d'un sel composé d'une base quelconque & d'acide carbonique ou air fixe, lequel se dégage sous forme élastique. (R)

dant de bleu de Prusse ; je versai dans l'autre portion quelques gouttes d'une forte infusion de noix de galles , & le mélange noircit un peu. Le reste de la liqueur lorsque je la saturai d'alkali caustique , fournit un précipité abondant de chaux sous la forme de flocons blancs , mais il restoit un résidu dont j'ignorois la nature. Pour la découvrir je fis croître de la même manière une plus grande quantité de ces plantes & après les avoir desséchées , brûlées , &c. je trouvai que ce résidu , étoit pour la plus grande partie , de la terre siliceuse (1).

Pour découvrir ensuite si ce fer & cette terre siliceuse existoient dans la plante avant l'incinération , l'auteur traita à l'acide nitreux & à l'acide marin , tant à froid qu'à l'aide de la chaleur , une certaine quantité de ces mêmes plantes fraîches , & il ne put point en extraire de fer (2). Il en conclut que l'incinération

(1) On sait que cette même terre forme , dans les nœuds du bambou , des concrétions qu'on nomme *Tabasheer* aux Indes & qu'on emploie en médecine. Et dans un très-beau travail que viennent de faire les célèbres chimistes Français , Fourcroy & Vauquelin sur l'analyse des calculs de la vessie , ils ont trouvé que la terre siliceuse entroit quelquefois comme partie constituante dans ces concrétions. (R)

(2) Il nous semble que le fer auroit pu exister dans les plantes fraîches sans être décelé par l'action des eaux acides sus-désignées. Il suffiroit pour cela de supposer qu'il fût dans leur composition par des affinités supérieures à celles de ces acides pour les diverses parties constituantes de ces végétaux. (R)

est l'un des procédés qui, en succédant à l'influence préalable de la vitalité, peut produire le fer. Il est convaincu qu'il existe un autre procédé naturel qui décompose les végétaux & produit, dans certaines circonstances, les eaux ferrugineuses. On fait que ces eaux abondent dans les contrées où se trouvent aussi les mines de houille & où l'on rencontre en général des matières d'origine végétale en état de décomposition.

Ces expériences, comme toutes celles qui présentent des résultats extraordinaires, & celles-là surtout dans lesquelles on est acheminé à opérer sur de très-petites quantités de matière & à fonder en même temps d'importantes conclusions sur les résultats, demandent à être répétées & variées. Nous nous abstenons de porter un jugement sur celles-ci; mais nous invitons les Chimistes & les amateurs à s'occuper de ces recherches; elles sont en rapport immédiat avec celles qui ont procuré les savantes analyses des C. C. Fourcroy & Vauquelin & qui ont fait faire des progrès très-rapides à cette branche de la chimie si nouvelle & si curieuse, qu'on désigne sous le nom de *chimie animale*.

Nous saisissons cette occasion d'annoncer, quelques résultats remarquables qu'a obtenus l'actif & infatigable Humboldt; en s'occupant dernièrement à Paris d'expériences sur la constitution chimique de l'atmosphère.

On fait, qu'indépendamment des mélanges accidentels, l'air atmosphérique est essentiellement composé de deux fluides très-différens, le gaz oxigène, & le gaz azote; que le premier de ces fluides, le seul qui entretienne la vie des animaux respirans, entre pour un peu plus d'un quart dans le mélange, & que les trois autres quarts ne sont pas respirables. Ces proportions varient, dans certaines limites, selon les saisons & les localités; & les procédés *eudiométriques* tendent à faire reconnoître dans un moment & dans un lieu donné, quelles sont les quantités respectives d'oxigène & d'azote qui composent un certain volume d'air qu'on soumet aux expériences. Nous dirons, en passant, que ce physicien plein de génie a beaucoup simplifié & perfectionné ces procédés.

Il avoit observé, ainsi que le Dr. Ingenhousz, que la terre végétale, ou le terreau ordinaire, avoit la propriété d'absorber peu à peu l'oxigène; & que l'air atmosphérique, en contact avec ce terreau humide en vases clos, se réduisoit finalement à l'azote pur mêlé de quelques centièmes d'acide carbonique. Ce fait est d'une grande importance dans l'histoire de la végétation & tend en particulier à expliquer l'influence des fréquens labours sur la fertilité de la terre.

En variant les expériences, il a mis aussi en contact avec l'air atmosphérique en vases clos,

OBSERV. SUR LA FORMATION DU FER, &c. 291
chaque des cinq terres suivantes, que les chimistes nomment *élémentaires* parce qu'ils n'ont pas encore pu parvenir à les décomposer; savoir la chaux, la baryte, l'alumine, la magnésie, & la silice. Elles étoient abondamment humectées & remplissoient partiellement des flacons bien bouchés.

Il a observé, au bout de quelques jours, une diminution plus ou moins considérable dans l'air commun qui avoit séjourné sur les trois premières de ces terres; & les épreuves eudiométriques annonçoient que l'absorption se portoit exclusivement sur l'oxigène, qui entroit dans quelque nouvelle combinaison avec les matières terreuses. La présence de l'eau étoit une condition nécessaire au succès de l'expérience. Si ces essais, faits sur de très-petites quantités, se trouvent confirmés par les expériences que leur auteur, ou d'autres physiciens, mis sur la voie, répéteront sans doute en grand, la découverte à laquelle ils auront donné lieu sera une importante addition aux connoissances chimiques actuelles.

HISTOIRE NATURELLE

DESCRIPTION OF THE ROCKS, &c. Description des rochers d'Andersbaeh en Bohême.

ON découvre de très-loin cette *forêt de rochers*: on diroit une armée de Géants rangés en ba-

taille dans une immense plaine. A mesure qu'on approche, leurs dimensions apparentes augmentent, & peu-à-peu les groupes deviennent innombrables. Chacun de ces piliers est isolé, & on en voit qui ont de cent à cent-cinquante, & jusqu'à deux cents pieds de hauteur. Ils sont de forme plus ou moins conique & si rapprochés les uns des autres qu'un homme peut à peine passer dans l'entre deux. Ils occupent un espace de trois milles & demi d'Allemagne en circonférence, & forment un labyrinthe dont il seroit difficile de se tirer sans guide.

La substance de ces rochers est un grès filiceux très-tendre & presque friable lorsqu'il est imbibé d'eau. C'est une sorte de pierre à filtrer imparfaite. Le rocher attire puissamment l'humidité de l'air; les pluies s'insinuent dans son tissu, il imbibe les rosées & les brouillards, & lorsqu'il est ensuite frappé des rayons du soleil l'eau suinte de toutes parts & emporte avec elle des particules de la substance du rocher. De là vient que les sentiers tortueux qui serpentent autour de ces masses isolées sont pour la plupart occupés par un ruisseau dont l'eau est très-limpide, parce qu'elle découle comme d'un filtre, & que le sable qu'elle charrie se dépose immédiatement sous la forme d'un gros gravier. On voit dans quelques endroits l'eau sortir du pied des cones, & on peut distinguer les filets
de

de sable qu'elle charrie. Quand ces petites fontaines s'ouvrent sous le niveau du ruisseau principal, l'effet est encore plus distinct & plus frappant.

Il est très - probable que cette colonnade de rochers formoit autrefois le noyau d'une montagne que les pluies & les torrens ont délavée ; le rocher mis à nu & exposé à l'action combinée de l'eau & de la gelée a pris un tissu tendre & spongieux. Cette dégradation s'opère sous les yeux mêmes de l'observateur. Les eaux charrient continuellement vers la base le sable qu'elles détachent du sommet. De-là résulte dans le niveau des sentiers, un exhaussement, très-sensible au bout d'une dizaine d'années. Partout où l'eau ne tombe pas verticalement depuis le sommet des cones, mais coule le long d'un plan incliné, elle dépose des sédiments si copieux que les curieux entrent jusqu'à mi-jambe dans ces sables accumulés.

Les eaux ont attaqué par la base quelques-uns de ces cones de telle manière, que leur masse entière, toute énorme qu'elle est, demeure en équilibre sur un pivot qui a, tout au plus, un pied cube de solidité. Ces cones ont des indices marqués d'une origine commune. Toutes leurs couches sont continues, ou parallèles entr'elles & à l'horison.

Lorsqu'on pénètre dans ce labyrinthe on y trouve les sites les plus variés & des traces très-pi-

toresques de la violence des torrens qui ont précipité des arbres & des rochers dans les abîmes profonds dans lesquels on les voit encore ensevelis.

Les rochers d'Andersbach présentent pour ainsi dire le squelette d'une montagne. Lorsqu'on pénètre bien avant dans leur intérieur on arrive à la partie de la montagne qui est encore garnie de terre couverte de forêts, & dont la destruction commencée d'une manière insensible. Cette circonstance met le comble à la singularité du spectacle. On peut voir dans le même lieu tous les degrés successifs de dégradation dont une montagne peut être susceptible.

Dans cette grotte profonde qui n'a ni toit ni voute qui la recouvre, la température est cependant à-peu-près uniforme & ne varie que peu avec les saisons. On y éprouve en été la fraîcheur la plus agréable & on s'y apperçoit à peine du froid de l'hiver.

Il y a vers les confins de ce groupe gigantesque un écho remarquable. Il répète sept syllabes jusqu'à trois fois sans confondre les sons. Le centre phonique est à une petite distance des côtés du grand cone dans lequel est le principal foyer des sons réfléchis. Les mots prononcés à voix basse sont répétés distinctement à la distance requise, mais lorsqu'on s'avance ou qu'on recule de quelque pas, la voix la plus forte ne produit aucun écho. Nous en fîmes l'essai par des mots articulés plus ou moins fortement, & par des coups de pistolet.

La nature offre de singulieres variétés jusques dans ses phénomènes les plus simples. L'écho est, sans contredit, du nombre de ceux-ci; cependant, sans parler des différences relatives au nombre de syllabes qu'ils répètent,

à leur articulation plus ou moins distincte , & aux intervalles de retour plus ou moins prolongés , nous observâmes de plus , dans tous les essais que nous fîmes avec nos voix dans ces montagnes , que ces sons réfléchis acquéroient un caractère ou timbre particulier.

J'ai vérifié depuis , par des observations plus particulières , qu'aucun écho ne répète le son précisément tel qu'il a été articulé. L'écho d'Andersbach est prompt , & sec dans sa réflexion , parce que les surfaces qui répercutent sont dégarnies de terre & de végétaux. C'est un violon dont le corps seroit d'acier.

L'écho de Kinast transformoit le bruit d'un coup de pistolet en longs roulemens interrompus par des éclats & des intonations variées. Sa réflexion est en partie produite par des rochers nus & en partie par des forêts. Mais rien n'égale l'effet touchant & mélancolique de l'écho de Zobtenberg dont les réflexions sont adoucies par un bois épais situé à une assez grande distance.

V A R I É T É S.

CONSTITUTION d'un homme destiné à vivre long-temps ; par le célèbre Médecin Allemand HUFELAND. (*Univ. Mag.* avril 1798.)

L'HOMME destiné à vivre longtems est d'une taille moyenne & bien proportionnée ; ses membres sont plutôt gros que minces. Son teint n'est pas trop fleuri ; & dans tous les cas , la rougeur du visage dans la jeunesse est rarement un signe de longévité. Ses cheveux tirent plus sur le blond que sur le noir ; sa peau est forte , mais non rude. Sa tête n'est

pas trop grosse ; il a des veines saillantes aux extrémités & ses épaules sont plutôt rondes que plates. Son col n'est pas trop long ; son ventre est peu saillant , & les mains sont grandes , mais pas trop profondément découpées. Son pied est plutôt épais que long & ses jambes sont fermes & rondes. Sa poitrine est large & arquée ; sa voix est forte & il peut retenir longtemps sa respiration sans trop de peine. En général il y a une harmonie complète dans tous ses membres. Ses sens sont bons sans être trop délicats , & son poulx est lent & régulier.

Son estomac est excellent , son appétit bon & la digestion facile. Il fait peu de cas des plaisirs de la table ; seulement ils disposent son ame à la sérénité. Il ne mange pas seulement pour se nourrir , mais chaque repas est pour lui une sorte de petite fête journalière , un plaisir qui loin de diminuer ses autres jouissances les multiplie. Il mange lentement & n'est pas trop altéré ; l'altération excessive est toujours le signe d'une consommation plus rapide de la vie.

En général il est serein , il parle volontiers , il est actif , susceptible de joie , d'amour , & d'espérance ; mais insensible aux impressions de la haine , de la colère & de l'avarice. Ses passions ne sont jamais extrêmes ni destructives. Lorsqu'il éprouve de l'indignation elle produit chez lui un mouvement intérieur , une sorte de fièvre momentanée & douce , qui n'occasionne pas d'épanchement de bile. Il aime à s'occuper , surtout d'objets d'une méditation tranquille , & de spéculations agréables. Il a de la disposition à l'optimisme ; il aime la nature , & les jouissances domestiques. Il n'ambitionne ni les honneurs , ni les richesses , & ne s'occupe point trop du lendemain.

P H Y S I Q U E.

ESSAIS ON THE MICROSCOPE, &c. Essais sur le Microscope (1), par feu G. ADAMS, seconde édition, avec des additions considérables, par F. KANMACHER, in-4°. grand format, 714 pag. avec trente-deux planches folio. — Londres *W. & S. Jones; Holborn* 1798, prix 1 liv. sterl. 8 sh. broché.

(*Dernier Extrait.*)

LES huit derniers chapitres de l'ouvrage d'ADAMS, c'est-à-dire, au moins les deux tiers du livre, devoient porter un autre titre que celui « d'Essais sur le microscope. » Ils renferment l'exposé des principales découvertes faites par divers observateurs à l'aide de cet instrument : c'est plutôt une « Contemplation de la nature microscopique ; » & sous ce point de vue, l'ouvrage peut intéresser un plus grand nombre de lecteurs. Nous allons en extraire les faits les plus remarquables ; & l'innombrable tribu des insectes nous les fournira presque seule.

(1) Voyez le titre détaillé, pag. 197 de ce volume, en tête du premier extrait.

Sciences & Arts. Vol. 9. N°. 4. an VII.

X

On décrit plutôt qu'on ne définit un insecte en disant que « c'est un animal dont la tête est garnie d'antennes ; qui n'a point d'os , mais dont la peau est plus ou moins dure ; qui a six pieds ou davantage ; & qui respire par des ouvertures latérales. »

Il y a cette différence très-notable dans l'organisation générale des insectes, comparée à celle des quadrupèdes , des oiseaux , & des poissons ; c'est que ces trois classes d'animaux ont un squelette osseux auquel les muscles sont attachés ; au lieu que tout l'intérieur de l'insecte est composé de matière molle , & que les muscles s'attachent à un squelette extérieur qui remplit le double office d'os & de peau.

La plupart des Naturalistes considèrent quatre parties principales dans le corps d'un insecte , savoir : la tête ; le tronc ou corcellet ; l'abdomen ou le ventre ; & les membres. La structure de chacune de ces parties fournit des caractères particuliers qu'on emploie dans la classification.

La tête seule , offre de singulières variétés dans son organisation : tantôt elle est jointe au thorax par une sorte d'articulation , tantôt elle ne forme avec lui qu'une seule pièce ; elle est le siège principal des sens & contient le cerveau , ou ses rudimens. Elle est très-grosse dans certains insectes , à proportion du reste de leur corps ; & la tête n'est pas d'une grosseur constante dans le même insecte. Elle est ordinaire,

ment très-petite dans certaines chenilles avant qu'elles changent de peau ; la dureté de cet organe ne lui permet pas de croître à proportion du reste du corps ; mais lorsque l'insecte est disposé à revêtir une enveloppe nouvelle , il retire vers le premier anneau du col la substance molle qui remplissoit l'intérieur de sa tête , & là elle trouve une place suffisante à de plus grandes dimensions ; on la voit , avec étonnement , devenir double en grosseur , de celle que l'animal a laissée dans sa vieille peau ; & comme l'insecte ne mange ni ne croît pendant que sa tête se forme , cet organe , & le reste du corps , ont des époques alternatives d'accroissement : pendant que la tête grossit , le corps n'augmente point , & *vice versa*.

Il y a dans la structure de la bouche des insectes un art merveilleux. Elle varie dans sa forme & sa disposition à raison des espèces. Elle occupe ordinairement la partie antérieure & inférieure de la tête ; mais quelquefois elle est sous la poitrine ; tantôt elle est armée de pincés plus ou moins fortes pour saisir , retenir , & dépecer une proie ; d'autres fois elle porte un dard propre à blesser & à fuser le sang : dans certains insectes la mâchoire est sillonnée de dents quelquefois assez fortes pour qu'à leur aide l'animal puisse charrier des fardeaux , percer la terre , les bois les plus durs , & jusqu'aux pierres , pour y faire son habitation & celle de sa progéniture.

D'autres portent une sorte de tube qui remplace la langue & sert à sucer les fleurs. Enfin certains insectes , tels que les æstres , n'ont point de bouche apparente.

La trompe , que possèdent certains insectes est un organe très-curieux & d'une structure très-compiquée. Quelques Naturalistes ont cru qu'elle remplissoit à la fois les fonctions de bouche , de nez , & de trachée artère. L'auteur décrit avec beaucoup de détail celle de l'abeille , du taon , du papillon , & du cousin : on peut se faire une idée assez nette des deux dernières sans le secours des figures. Nous allons parler d'après lui.

« La trompe du papillon est roulée en spirale comme le ressort d'une montre ; elle fait ordinairement huit révolutions. On peut la développer & l'étendre , avec la pointe d'une épingle. Son diamètre diminue de l'origine à l'extrémité , & là elle se divise en deux petits tubes qui ont chacun leur organe de succion. C'est probablement par là que l'insecte extrait le suc des fleurs : comme il n'a point de bouche il n'a pas d'autre organe alimentaire que sa trompe. Lorsqu'on la sépare de l'insecte elle conserve la faculté de se rouler & se dérouler pendant un temps assez long. »

» La trompe du cousin (*culex*) est formée d'un grand nombre de pièces extrêmement délicates qui concourent toutes au même but.

C'est un stilet propre à percer la peau , & un suçoir qui fait arriver le sang de l'animal attaqué , jusques dans l'intérieur de l'insecte. On ne voit à l'œil nu que l'enveloppe ou le fourreau qui renferme toutes les pieces. C'est un tube cylindrique , ouvert dans sa longueur de maniere que l'insecte peut le séparer du dard , & le relever à mesure qu'il enfonce celui-ci. »

» Le dard est composé de cinq à six lames ou lancettes excessivement aigues , assemblées en faisceau. Les unes sont taillées en forme d'épée à deux tranchans , & les autres sont dentelées à leur pointe en fer de flèche. A l'instant où l'insecte enfonce dans la peau ce faisceau de dards jusqu'à l'intérieur de quelque très-petite veine , il l'accompagne d'une ou deux gouttes d'un fluide qui atténue le sang ; & le faisceau de lames agissant alors à la maniere des tubes capillaires , le sang s'élève entr'elles & arrive jusques dans le corps de l'insecte. Le fluide injecté cause la démangeaison si désagréable qu'on éprouve à la suite des piqures de ces petits animaux. »

L'auteur indique , dans une note , quelques remèdes pour ces piqures , souvent très-incommodes. L'alkali volatil appliqué à l'instant ; l'eau fraîche ; se frotter le soir avec un peu de terre à foulon détrempée d'eau ; ces trois spécifiques tendent à diminuer l'inflammation. Il propose aussi comme préservatifs , de se laver

avec du vinaigre , ou bien avec une solution de sucre de Saturne (acétite de plomb) avant de s'exposer à l'attaque des cousins.

Les antennes , ces fils minces , quelquefois articulés , mobiles dans toutes sortes de directions , dont la tête d'un assez grand nombre d'insectes est armée sont un organe dont l'usage est encore mal connu. Quelques naturalistes ont cru qu'elles remplaçoient le nez ; d'autres leur attribuent une sensibilité assez exquise pour faire appercevoir à l'animal les moindres mouvemens ou changemens dans le fluide qui l'environne. On voit avec évidence que certains insectes non pourvus d'ailes , employent cet organe à tâter le terrain & à assurer leur marche. La forme des antennes , excessivement variée à raison des espèces , a été employée avec succès par les naturalistes comme moyen de classification.

Mais c'est surtout l'organe de la vue qui présente chez les insectes les variétés les plus admirables. La plupart ont deux yeux : dans le monocle , ces deux yeux sont si rapprochés l'un de l'autre qu'ils paroissent n'en former qu'un. Le gyrimus en a quatre ; le scorpion fix , l'araignée huit , & le scolopendre trois. Cet organe est fixe dans presque toutes les classes d'insectes , & chez un assez grand nombre , ces protubérances qu'on apperçoit des deux côtés de la tête sont des yeux , composés d'un très-grand nombre

de facettes dont chacune est un œil complet. C'est surtout dans les yeux de l'insecte appelé Demoiselle (*libellula*) que le microscope fait découvrir cette admirable structure. La surface convexe de la protubérance est divisée en un nombre de cellules exagones qui renferment chacune un œil dont la surface est extrêmement polie; si l'on place une chandelle allumée dans le voisinage, chacune des faces en réfléchit l'image en même temps qu'elle fait pour l'insecte l'office d'une lentille transparente. La multiplicité de ces facettes & leurs directions très-variées suppléent à l'immobilité des protubérances auxquelles elles appartiennent; & font que l'animal peut voir en même temps de tous les côtés. Swammerdam a montré que chacune de ces facettes forme la base d'une pyramide exagone composée d'un grand nombre de fibres longitudinales & transversales, sans doute essentielles à la perfection de l'organe. Leurwenhoeck a compté 12,544 exagones pareils dans les yeux d'une Demoiselle. Quelques mouches éphémères ont quatre protubérances garnies d'yeux à réseau; & l'organe lui-même chez d'autres insectes du genre des mouches ne le cède pas en couleur & en vivacité aux pierres précieuses. La couleur varie avec les espèces. Ici les yeux sont verts, là rouges; d'autres fois changeans du pourpre au verd & à la couleur de cuivre.

L'araignée a ordinairement huit yeux très-

beaux à voir au microscope, quelque désagréable que soit l'aspect de l'insecte lui-même. Ces yeux sont disposés de la manière la plus favorable pour voir de tous côtés. Deux sont sur le sommet de la tête & voyent en haut : deux sont à la partie antérieure, & quatre autres dans les côtés, regardant les uns en avant, les autres en arrière. Mr. Baker essaya d'appliquer un de ces yeux à un trou d'épingle fait à une carte, pour s'en servir comme de lentille : il trouva qu'il grossissoit beaucoup, mais que les objets étoient peu distincts. Peut-être ce défaut de transparence provenoit-il de ce que l'insecte étoit mort depuis long-temps lorsqu'on fit cet essai.

Les ailes ne sont pas l'organe de moins curieux à observer dans les insectes : les uns n'en ont que deux, d'autres quatre : chez quelques-uns, ces quatre ailes sont égales, chez d'autres inégales. On sait que Linné en a fait l'une des principales bases de sa classification (1).

(1) Les ailes des insectes ont servi, il est vrai, à la formation des classes du célèbre Linné : en conséquence, en tirant ses étymologies du Grec, il a nommé *Apère* tout insecte dénué d'ailes ; *Coléoptère* tout insecte qui a deux ailes dures, & deux autres membraneuses, comme le cerf-volant ; *Hyménoptère*, celui qui a quatre ailes nues & dépourvues des écailles qui ornent celles des papillons, comme l'abeille, &c.
— Mais jusqu'à présent aucun auteur n'avoit étudié

Les variétés dans la forme & la structure de cet organe chez les insectes sont presque infinies : la beauté de son coloris ; l'art avec lequel l'aile est articulée avec le corps ; la manière curieuse dont quelques-unes se reploient sous un couvercle solide & se déploient au moment du besoin ; les articulations déliées qui permettent

avec assez d'attention l'organisation de ces parties pour en faire une application méthodique.

Le Cit. Jurine, connu dans le monde savant par ses belles expériences physiologiques, & qui a particulièrement étudié les insectes, dont il possède une collection très-précieuse, va publier incessamment un ouvrage sur les Hyménoptères, qui offrira aux Naturalistes une nouvelle méthode pour fixer avec sûreté leurs caractères génériques, & qui leur offrira sans doute de nouveaux sujets d'admiration, par la régularité qu'ils remarqueront dans la distribution des nervures qui divisent comme en cellules, la surface des ailes.

Cette méthode sera appliquée aux diptères & peut-être aux coléoptères. Il a observé que l'aile antérieure des hyménoptères s'articule avec une pièce un peu mobile fixée au corcelet, & il a soupçonné que c'étoit leur bras, qui étoit très-raccourci, & que la nature avoit construit sur un modèle différent de celui de l'homme, à raison des fonctions qu'il avoit à exécuter. Les deux filets gros & durs qui s'étendent depuis ce moignon de bras jusqu'au point de l'aile, dans sa partie antérieure, représentent les os du *radius* & du *cubitus* : il a considéré enfin le point de l'aile comme le Carpe ou le poignet, à raison du mouve-

ce jeu ; les nombreuses ramifications ou nervures qui donnent à l'organe sa solidité , en même temps qu'elles servent à conduire les sucs nutritifs sur toute sa surface ; cette merveilleuse organisation déploie au microscope toute son élégance. Mais il n'est pas besoin de cet instrument pour reconnoître les élytres , ces étuis

ment articulaire dont il jouit ; pour s'en convaincre que l'on jette les yeux sur un hanneton au moment où il se pose après avoir volé ; on le verra plier à l'instant , dans cette articulation son aile membraneuse pour la cacher sous l'écailluse. Or si l'avant-bras n'étoit pas articulé avec le bras ; si le poignet n'avoit pas une charnière , & si les nervures de l'aile n'étoient pas équivalentes aux muscles mis en action par la volonté , comment cette opération s'exécutoit-elle ?

Une seule partie de l'aile antérieure ou de la grande aile a suffi à ce Naturaliste pour y prendre le premier des caracteres génériques qui constituent sa méthode ; c'est la partie qui s'étend depuis l'extrémité de l'avant-bras & le poignet jusqu'au bout de l'aile ; l'on y voit fréquemment deux rangs de cellules : il a nommé *cellules radiales* celles qui partent du point , & *cubitales* celles qui sont au-dessous.

A ce caractere générique il en a associé deux autres qui sont les *mandibules* ou dents , & les *antennes* , où l'on suppose que réside le sens de l'odorat. — Cet ouvrage sera accompagné de gravures exécutées avec le plus grand soin ; chaque genre sera représenté par un insecte dont les caracteres génériques seront grossis , ainsi qu'on les verroit au microscope. (R)

qui recouvrent les ailes & dont la force & la dureté sont si bien adaptées à leur fonction ; ils servent en même temps de bouclier à l'insecte ; & par les brillantes couleurs dont la plupart sont décorés , ils l'emportent en lustre sur les ouvrages de l'art les plus soignés. On est tenté en les considérant , de croire que le luxe n'est point une invention ou un abus purement humain , mais que la nature en a donné l'exemple , & que dans des sujets de goût ou d'ornement elle a été quelquefois jusqu'à fournir des modèles.

On trouve dans la *micrographie* du Dr. Hooke des recherches fort curieuses sur la vitesse absolue des vibrations des ailes de quelques insectes. Il a trouvé au moyen du son que produisent ces vibrations & dont il cherchoit l'unisson sur une corde tendue , qu'il se fait plusieurs centaines & au-delà d'un millier de ces vibrations dans une seconde de temps. Si , comme on a lieu de le présumer , la rapidité des sensations de l'animal est en rapport avec la vitesse des mouvemens qu'il peut exécuter , sa vie , qui nous paroît si courte , est relativement aussi longue que la nôtre , & peut-être davantage , à raison du nombre de perceptions & d'idées dont ils peuvent être capables dans un temps donné.

Et s'ils sont distingués sous ce point de vue , dans le regne organique , ils ne le sont pas

moins par ces étonnantes transformations que subissent tous les insectes ailés sans exception, avant d'atteindre toute la perfection dont leur espèce est susceptible. Ce n'est point un simple changement de couleur, de grosseur, de proportion dans les diverses parties de l'animal; c'est une métamorphose entière & complète dans ses formes, ses proportions, ses organes, ses mouvemens & toutes ses habitudes. Ces changemens sont quelquefois si soudains, qu'on pourroit croire que les anciens, à qui ils n'étoient pas tout-à-fait inconnus, avoient puisé dans l'observation de quelques faits de ce genre leurs fictions poétiques de métamorphoses & peut-être même l'opinion de la transmigration des ames (1). Quoiqu'il en soit, les faits relatifs à ces transformations n'avoient été observés que très-imparfaitement jusqu'à la fin du siècle dernier, époque où Malpighi & Swammerdam leverent presque entièrement le voile dont la nature s'étoit enveloppée: l'infatigable & clairvoyant Réaumur vint ensuite, & on ne trouve plus gueres qu'à glaner après ces auteurs dans le champ des découvertes entomologiques. Notre texte nous entraîneroit ici dans de grands

(1) L'emblème d'un papillon, qu'on trouve sur des monumens funéraires, désignoit, sans doute, leur opinion que l'ame survivoit au corps, & qu'elle étoit appelée à une régénération dans cette nouvelle existence. (R)

détails ; nous ne pouvons qu'indiquer rapidement les principaux traits qui caractérisent ces opérations naturelles.

La vie de l'un des insectes soumis aux transformations peut être divisée en quatre époques ou périodes.

Le germe dans l'état d'*œuf*, possède déjà un principe de vie qui n'attend que les circonstances favorables, & pour l'ordinaire une certaine température, pour se développer & passer à l'état de *larve* ; soit dans certaines espèces, l'état de ver ou chenille. Il se transforme ensuite en *chrysalide* ; enfin il devient *insecte ailé*, & arrive alors au terme du perfectionnement qu'il peut atteindre. Il jouit quelque temps de toute la plénitude de son existence ; c'est à cette époque où la femelle pond les œufs qui doivent reproduire l'espèce, puis l'insecte meurt quand cette tâche est terminée. Entrons dans quelques détails sur ces divers modes d'exister dans un animal qui conserve son identité au travers des transformations les plus étranges.

Et remarquons d'abord, que la même intelligence qui a ordonné ces changements, a pourvu l'insecte, dans chacune de ces périodes, d'un assortiment d'organes parfaitement adaptés à son état passager & à toutes ses convenances momentanées.

Prenons l'histoire de la chenille pour exemple & observons ses métamorphoses : la femelle,

qui pond les œufs, choisit toujours, guidée par un instinct particulier, le lieu qui sera le plus convenable à sa progéniture. Le principe de vie demeure *latent* dans ces œufs, & peut supporter la température la plus rigoureuse, jusqu'à ce que le soleil du printemps le mette en action & renforce le petit animal assez pour qu'il perce son enveloppe & cherche ensuite par son propre instinct à entretenir l'existence qu'il vient d'acquérir & qu'une nourriture convenable ne tarde point à consolider.

Le corps de la chenille est divisé en douze anneaux; la tête, qui est dure & crustacée, tient au premier. Aucune chenille de papillon ni de phalène, n'a moins de huit jambes; ou plus de seize. Dans celles qui en ont douze, les six premières sont crustacées & adhérentes aux trois premiers anneaux; elles forment l'enveloppe des six jambes du futur papillon. Les six autres sont molles & flexibles ou membranées; elles accompagnent exclusivement l'état de larve. On remarque dans la partie latérale du corps, neuf petits trous de chaque côté; ce sont probablement, les organes de la respiration; & cinq ou six taches noirâtres qu'on observe des deux côtés de la tête, sont, selon toute apparence, les yeux de l'insecte.

Il est déjà soumis à des changemens considérables dans son état de chenille; il prend en grossissant, & à plus d'une reprise, une peau nou-

velle : & si l'on examine sa dépouille, on remarque que les principales parties solides de la tête, le crâne, les mâchoires, & même des parties crustacées intérieures qui servoient d'attache à certains muscles, les enveloppes des jambes ; en un mot, que toutes les parties visibles de l'animal se retrouvent dans cette dépouille.

Ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'il s'en débarrasse : cette crise est ordinairement précédée & suivie d'un jeûne plus ou moins long ; mais notre célèbre compatriote Bonnet a observé que certaines chenilles s'empressoient de manger leur dépouille après l'avoir déposée. — Nous regrettons d'être ici forcés d'omettre les curieux détails qui présentent l'insecte comme un modèle de patience, d'industrie & d'adresse. On sait que le ver à soie subit quatre changemens pareils, qui sont, pour lui, comme autant de maladies.

Enfin le moment approche où l'insecte va se trouver par une transformation beaucoup plus complète que ne l'est un simple changement de peau, dans un état moyen en quelque sorte, entre la vie & la mort. Il va perdre presque tous les organes des sens, & la faculté de se mouvoir ; & par conséquent celle d'éviter tous les dangers ; dangers qu'il lui seroit inutile de prévoir puisqu'il ne pourroit s'y dérober. Mais le même instinct qui lui annonce l'arrivée prochaine de cette période de demi-existence, lui suggère les

moyens de se garantir d'une partie des inconvéniens dont il est menacé dans l'état de chrysalide.

Après avoir cherché une retraite convenable il employe l'une des quatre méthodes suivantes pour s'y mettre à l'abri. Certaines chenilles, telles que le ver-à-soye, se filent un tissu très-ferré qui les enveloppe comme un œuf dans la coquille : d'autres se cachent dans de petites cellules creusées en terre : d'autres se suspendent par leur extrémité postérieure : d'autres enfin s'accrochent aussi en l'air, mais par une espèce de ceinture dont elles se sont environnées.

Le passage de la chenille à l'état de chrysalide est précédé d'un assez long intervalle de repos & de jeûne, qui donne aux organes extérieurs & intérieurs situés sous la peau, le temps de se développer. Puis, l'animal se contracte & se retire dans la partie antérieure de son enveloppe ; là par des efforts répétés il fend le crâne en trois pièces & rompt aussi les premiers anneaux du tronc ; & après s'être donné beaucoup de mouvement il sort enfin de cette dépouille, qui le constituoit reptile, & qui semble lui être devenue odieuse.

Le voilà chrysalide : c'est un petit magot orné quelquefois des plus belles couleurs, & en particulier d'une teinte dorée de laquelle il a tiré son nom (1). Toutes les parties du futur

(1) χρυσος (*chrysos*) en grec signifie de l'or.

papillon existent, & quelques-unes peuvent être apperçues, sous l'enveloppe mince mais crustacée, de la chrysalide : le fluide visqueux dont elle est recouverte à son apparition ne tarde pas à se dessécher, & contribue à consolider cette écorce qui est en même temps le tombeau de la chenille & le berceau du superbe insecte ailé qui la remplacera. La chrysalide du papillon blanc ordinaire, vue au microscope lucernal pour les objets opaques, y donne un très-beau spectacle.

L'insecte, sous cette forme, est ordinairement immobile, & attend patiemment l'époque de sa dernière métamorphose. Il est comme enseveli dans un sommeil profond ; il se réveille au contact des objets extérieurs & donne alors quelques signes de vie, mais c'est là tout. Ses organes sont enveloppés & fixés dans la situation qu'ils avoient prise en sortant de l'état de chenille ; quelques-uns sont susceptibles d'un léger mouvement, mais très lent, & en apparence pénible.

Cet état dure plus ou moins longtemps à raison de l'espèce de la chenille, & d'autres circonstances encore mal connues & dont probablement la température moyenne de la saison est une des principales. Tantôt quelques semaines suffisent au développement de la chrysalide, & d'autres fois ce développement exige plusieurs mois. L'auteur cite un exemple de chrysalides provenant des mêmes œufs, dont les chenilles avoient

été nourries de la même manière & avoient filé leur coque en automne à peu de jours de distance, & dont le déploiement à l'état de papillon eut lieu à des périodes très-distantes : savoir, pour un tiers d'entr'elles au printemps suivant ; pour un second tiers une année après ; & pour le troisième, encore l'année suivante. Celles-ci avoient donc vécu trois ans dans l'état de chrysalide.

Le papillon sort plus facilement de l'enveloppe de la chrysalide que celle-ci ne s'est débarrassée de sa peau de chenille. Cette enveloppe est si desséchée & devenue si fragile à l'époque où l'animal parfait est prêt à en sortir, qu'il ne faut, à sa part, qu'un léger effort pour la rompre ; & cette rupture se fait toujours au même endroit. L'insecte en sort humecté & encore engourdi ; bientôt ses ailes s'étendent & se renforcent en se desséchant : elles grandissent, exactement à vue d'œil, & en peu de minutes leur surface devient cinq fois plus grande qu'elle n'étoit d'abord ; le papillon les essaye & s'envole.

La nourriture de la chenille étoit solide & grossière, & l'animal la cherchoit en rampant & exposé à mille dangers. Il la triturait péniblement entre ses dents pour que son estomac pût la digérer. Devenu papillon il se nourrit du nectar des fleurs ; l'air devient son élément & son séjour habituel ; il frappe nos regards

par l'élégance de ses formes & la beauté de ses couleurs. Il lui falloit des journées entières pour arriver d'un buisson au buisson voisin , & maintenant, d'un vol léger & en un clin-d'œil il dépasse des arbres les plus élevés ; il ne s'occupe que d'amour & de voyages , & semble jouir , en folatrant , de toute la plénitude de ses facultés nouvelles.

Si quelques-uns de nos lecteurs à qui ces faits seroient connus & familiers nous reprochoient de suivre , dans leur exposé , notre auteur avec trop de complaisance , nous les inviterions à se rappeler que l'un des principes que nous ne perdons jamais de vue en travaillant à ce recueil , est d'écrire moins pour les gens profondément instruits , que pour la classe nombreuse des amateurs qui , sans s'être attachés à aucune branche d'étude particulière , cherchent à meubler leur mémoire de faits curieux , & leur entendement , de ce genre de connoissances qu'on aime à se retracer parce qu'elles donnent matière à réfléchir.

Les insectes ailés ne sont pas les seuls qui soient soumis aux transformations : la punaise & la puce , ces deux especes si incommodes pour l'homme , passent aussi par l'état de larve & de chrysalide.

Parmi les faits remarquables que cite notre auteur , & qui pourroient n'être pas connus des Naturalistes du continent , nous choisirons

une anecdote de l'histoire des pucerons.

On sait, d'après les curieuses recherches de Bonnet, qu'un puceron, mis dès l'instant de sa naissance dans la solitude la plus parfaite, se trouve au bout de quelques jours au milieu d'une famille nombreuse d'individus de son espèce; que si l'on met à part un de ces pucerons, il ne tarde pas à produire seul une seconde génération, dont chaque individu possède aussi la faculté de faire naître une troisième génération, &c.

« Mr. Bonnet, dit l'auteur, avoit répété l'expérience jusques à la sixieme génération, & avec des résultats uniformes, lorsqu'un soupçon de Mr. Trembley son ami (1) l'engagea à reprendre cette suite d'observations & à pousser plus loin l'épreuve. Il poursuivit jusqu'à la dixieme génération ces pucerons solitaires, en tenant une note exacte du jour & de l'heure de la naissance de chacune. Il découvrit qu'il naissoit finalement des mâles & des femelles : les premiers ne parurent qu'à la dixieme génération, & en petit nombre : l'accouplement de ceux-ci avec les femelles suffisoit à produire dix générations successives d'insectes, toujours vivipares, excepté la premiere qui provient d'œufs

(1) Le célèbre auteur de la découverte des polypes d'eau douce & l'un des meilleurs observateurs que ce siècle ait produits, (R)

fécondés : tous ces individus sont des femelles , à l'exception de quelques mâles , qui paroissent seulement à la dixieme génération , & donnent naissance à une nouvelle série semblable. »

Le Dr. Richardson a repris ces expériences ; & a choisi parmi la grande variété d'espectes que renferme le genre des pucerons ou *aphides* , ceux du rosier , comme étant les plus gros & ceux dont la carrière est la plus longue. Ils paroissent de bonne heure au printemps & on en trouve encore en automne.

Dès le mois de février , si le soleil est chaud , on les voit sortir de petits œufs noirs déposés l'année précédente aux environs des boutons à fleur. L'inclémence de la saison en détruit souvent un grand nombre , & ceux qui lui résistent n'atteignent qu'en avril toute leur grosseur ; c'est alors qu'ils commencent à se propager , après avoir changé deux fois de peau. Il n'y a que des femelles ; elles sont toutes vivipares & leurs petits naissent à reculons. Le printemps produit deux générations pareilles ; mais la fécondité augmente dans les mois d'été ; ils fournissent cinq générations , dont les individus changent trois ou quatre fois de peau selon que la saison est plus ou moins chaude. Ce changement est d'autant plus fréquent , que l'accroissement de l'insecte est plus rapide.

Quelques individus de la troisieme génération , nés en mai , après leur dernier change-

ment de peau, se trouvent pourvus de quatre ailes, plus longues que leur corps. On observe la même variété dans les générations suivantes, mais toujours sans diversité de sexe. Trois autres générations se succèdent pendant les mois d'août & de septembre, & c'est dans la dernière seulement (qui est la dixième, à dater de celle qui a commencé par l'œuf) qu'on retrouve des mâles; mais toujours beaucoup moins nombreux que les femelles.

La multiplication de ces insectes pendant les mois d'été est si grande qu'ils nuicroient excessivement à la végétation des pousses tendres auxquelles ils s'attachent s'ils n'étoient partiellement détruits par de nombreux ennemis. Mais ils ne sont pas sans amis, si l'on peut donner ce nom aux parasites qui les assiégent officieusement pour profiter des aubaines que les pucerons leur fournissent. La fourmi & l'abeille, ces deux classes, d'ailleurs si laborieuses, sont de ce nombre, & ramassent le miel que produisent les pucerons avec assez d'abondance. Il y a cependant cette différence entre les procédés de ces deux classes; c'est que l'assiduité des fourmis est constante, tandis que les abeilles n'ont recours au miel des pucerons que quand les fleurs sont rares. Celles-ci l'enlèvent aux pucerons à mesure qu'ils le produisent; les fourmis le prennent sur les feuilles où les pucerons l'ont déposé.

L'histoire des abeilles elles-mêmes est assez étendue dans notre auteur ; elle nous mèneroit trop loin & seroit, après tout, imparfaite, car il ne connoissoit pas les découvertes de notre ingénieux compatriote F. Huber (1).

(1) *Nouvelles observations sur les abeilles ; adressées à Mr. Charles Bonnet par François Huber. Genève chez Barde & Manget 1792.*

L'histoire de cet ouvrage n'est pas moins remarquable que ne le sont les découvertes qu'il renferme. Qu'on nous permette de transcrire ici quelques phrases de la préface, elles présentent un fait que nous croyons unique dans les annales des sciences.

« En publiant, dit l'auteur, mes observations sur les abeilles, je ne dissimulerai point que ce n'est pas de mes propres yeux que je les ai faites. Par une suite d'accidens malheureux je suis devenu aveugle dans ma première jeunesse ; mais j'aimois les sciences, & je n'en perdis pas le goût en perdant l'organe de la vue. Je me fis lire les meilleurs ouvrages sur la physique & sur l'Histoire naturelle : j'avois pour lecteur un domestique (*F. Burnens, né dans le Pays-de-Vaud*) qui s'intéressoit singulièrement à tout ce qu'il me lisoit : je jugeai assez vite par ses réflexions sur nos lectures, & par les conséquences qu'il savoit en tirer, qu'il les comprenoit aussi bien que moi, & qu'il étoit né avec les talens d'un observateur. Ce n'est pas le premier exemple d'un homme, qui, sans éducation, sans fortune, & dans les circonstances les plus défavorables, ait été appelé par la nature seule à devenir naturaliste. Je résolus de cultiver son talent & de m'en servir un jour pour les observations que je projetois : dans ce but, je lui fis répéter d'abord

Rien de plus curieux & de plus varié que l'industrie avec laquelle la plupart des insectes pourvoyent à l'emplacement de leurs œufs & à la nourriture de l'embryon qui doit en provenir. Nous en avons déjà cité quelques exemples dans ce Recueil, en parlant des ætres (1).-Le coufin, la mouche éphémère, la demoiselle volent au-dessus des eaux dormantes pour y déposer leurs œufs, qui doivent éclore dans le sein du liquide. La masse d'œufs pondus par la femelle du coufin ressemble à un petit bateau ; chaque œuf a la forme d'une quille & ils sont réunis d'une manière singulière. L'insecte ne pond qu'un œuf à la fois ; il croise ses jambes postérieures pour le recevoir dans la fourche qu'elles

quelques-unes des expériences les plus simples de la physique ; il les exécuta avec beaucoup d'adresse & d'intelligence ; il passa ensuite à des combinaisons plus difficiles. Je ne possédois pas alors beaucoup d'instrumens ; mais il savoit les perfectionner, les appliquer à de nouveaux usages, & lorsque cela devenoit nécessaire, - il faisoit lui-même les machines dont nous avions besoin. Dans ces diverses occupations, le goût qu'il avoit pour les sciences devint bientôt une véritable passion & je n'hésitai plus à lui donner toute ma confiance, parfaitement assuré de voir bien en voyant par ses yeux. »

(1) Voyez T. VII, pag. 47, *Sc. & Arts*, les curieuses observations de Mr. Bracy Clark sur ce genre d'insectes ; notre auteur rend à cet excellent naturaliste toute la justice qu'il mérite. (R.)

forment ; un second œuf vient s'attacher au premier , puis un troisieme , & ainsi de suite jusqu'à-ce que le petit bateau qu'ils doivent former soit achevé & puisse flotter tout seul. Plusieurs insectes ont pour leurs œufs & pour les larves qui en proviennent , les mêmes soins que l'instinct de la maternité inspire à la plupart des vivipares. L'araignée elle-même, si vorace & si cruelle , soigne ses œufs avec l'intérêt le plus inquiet. L'araignée-loup, les charrie sur son dos dans une petite bourse de soie tissue par elle ; & si on les lui enleve elle donne des signes de la plus grande détresse. Cependant les individus de cette espece s'attaquent quand ils se rencontrent , & le plus fort dévore le plus foible. Ils portent jusque dans leurs amours, une défiance & des précautions, qu'on n'observe jamais dans les autres especes. Et l'industriuse fourmi, au milieu des soins économiques dont elle semble être constamment occupée, donne à ses œufs des attentions toutes particulieres ; elle les redouble lorsque les larves ont paru ; si le temps est beau elle apporte du fond de son nid ces petits magots au soleil pour qu'ils jouissent de sa bénigne influence ; puis elle les remporte dès que l'air se rafraichit. Si le nid se trouve dérangé par quelque accident , & souvent par la malice d'un passant , l'alarme est universelle ; les meres courent ça & là , dans l'apparence du désespoir ; elles recueillent les larves dispersées , elles les entre-

posent sous le premier abri en attendant qu'elles aient réparé le dommage, puis elles vont les chercher pour les remettre dans leur nid.

La fécondité des insectes surpasse toute idée; l'auteur cite ici sur cet objet, les expériences & les calculs de Réaumur, de Lyonnet, de De Geer, &c. La chenille à brosse, par exemple, d'après les calculs de Lyonnet, peut fournir à la troisième génération 1,492,750 chenilles produites par un seul papillon; De Geer, d'après ses propres observations porte ce nombre à quatre millions. Mais ce sont aussi les espèces dont la multiplication est la plus rapide qui ont le plus grand nombre d'ennemis : cette compensation entretient l'équilibre tel que nous l'observons autour de nous.

Parmi les anecdotes que cite l'auteur sur les habitudes & l'industrie des insectes parasites, ou qui se nourrissent aux dépens d'autres espèces vivantes, nous choisirons le fait suivant. « J'observois un jour (dit le Naturaliste qui le lui a communiqué) quelques chenilles qui paroissent faire un excellent repas d'une feuille de chou. Je fus frappé des procédés d'une petite mouche qui, en bourdonnant autour des chenilles paroissoit chercher à se poser : celles-ci commencèrent incontinent à s'agiter avec des signes d'une violente inquiétude & en s'efforçant par leurs contorsions d'esquiver la mouche chaquefois qu'elle s'approchoit plus par-

ticulièrement de l'une d'elles : enfin l'insecte ailé fit son choix & s'abatut sur l'une des plus grosses & des mieux nourries ; vainement le malheureux reptile cherchat-il à déloger la mouche ; la terreur qu'il avoit montrée à son approche n'étoit rien au prix des angoisses que les piqûres de l'insecte ailé lui faisoient éprouver : la pauvre chenille se tordoit à chaque blessure , essayoit d'atteindre la mouche en courbant son corps en-dessus , mais tous ses efforts furent vains ; & la mouche après avoir donné trente ou quarante coups de stilet, s'envola en triomphe. Je présurai qu'elle avoit déposé un œuf dans chacune des plaies qu'elle venoit de faire , & j'emportai la chenille chez moi pour observer les suites de l'événement : je lui donnai à manger , elle parut se guérir au bout de quelques heures & pendant quatre à cinq jours elle mangea comme à son ordinaire ; mais ces œufs ne tarderent pas à donner naissance à de petits vers , oblongs & très-voraces , qui furent à peine éclos qu'ils commencèrent à se nourrir dans l'intérieur de la chenille , de la substance même de l'animal , sans attaquer cependant les organes de la respiration ni ceux de la digestion ; & parvenus à toute leur grosseur ils sortirent de la chenille en la perçant à jour , supplice auquel elle succomba. L'insecte , ainsi attaqué par la larve de cette mouche n'échappe jamais ; mais la larve , qui a besoin de lui pour

toute la durée de sa propre existence, ne touche point jusqu'au dernier moment aux parties essentielles à la vie ; cette larve ne produit point de papillon ; les vers, qui se sont nourris de la substance du malheureux insecte, se filent une coque, dès qu'ils l'abandonnent, & ils sortent ensuite de cette enveloppe, sous la forme de mouches qui, avec le même instinct féroce, vont chercher à placer leurs œufs comme l'ont été ceux qui les ont produites. »

Ces mouches parasites, ou ichneumones, offrent un très-grand nombre d'espèces : Linné en a reconnu soixante-dix-sept, & il n'est pas probable qu'aucune ne lui ait échappé. Les habitations des insectes tant aquatiques que terrestres ; la structure de leurs nids, dans laquelle ils développent tant d'adresse & d'industrie ; tout cela fournit à notre auteur des articles intéressans que nous regrettons d'être forcés d'omettre. Il les termine par une réflexion qui mérite d'être méditée. Après avoir montré par des comparaisons qui sont toutes à l'avantage de l'insecte, combien l'homme lui est inférieur dans tous les procédés que *l'instinct* suggère ou commande, il trouve dans cette infériorité même le signe de sa perfection réelle ; ou plutôt d'une perfectibilité indéfinie & illimitée, qui le place infiniment au-dessus de tout animal dont les facultés ont dans leur développement, une marche rigoureusement circon-

crité, & un terme fixe qu'elles atteignent toujours, il est vrai, mais qu'elles ne dépassent jamais.

A mesure que notre extrait se prolonge, nous éprouvons le pénible embarras du choix entre des citations qui nous semblent offrir un égal intérêt. Nous allons prendre le parti de les exclure toutes, & arriver, avec notre auteur, aux confins de l'animalité : nous terminerons ce morceau, déjà long, par quelques-uns des traits les plus saillans de l'histoire des polypes d'eau douce : c'est-là que l'Auteur de la nature a diversifié ses modèles avec le plus de variété, & qu'il a surtout mis en évidence l'inconcevable fécondité de ses moyens pour la conservation des espèces.

Ces polypes appartiennent à l'ordre des zoophytes, ou animaux-plantes : leur corps paroît consister en un simple tube qui porte à l'une de ses extrémités de longs bras avec lesquels il saisit la proie dont il se nourrit. Cet animal paroît ne posséder aucun des organes qui sont communs à tant d'autres ; il n'a ni tête, ni cœur, ni estomac, ni intestins, il n'a point de sexe, & se reproduit d'une manière très-singulière ; si on le coupe en morceaux, chacune des portions séparées devient en peu de temps un animal parfait dans son espèce. Cette propriété si caractéristique & qui rappelle la fable de l'hydre de Lerne les a fait nommer

Hydræ par Linné : le Dr. Hill les a appelées *Biota*, d'un mot grec qui signifie *vie*, à raison de la prodigieuse vitalité dont cet animal paroît être doué.

Ceux qui prétendent qu'on trouve chez les anciens, des germes de presque toutes les découvertes modernes citent Aristote qui dit (1) « qu'il y a des animaux qui multiplient de bouture, & par des sections, à la manière des plantes » St. Augustin rapporte « qu'un de ses amis fit devant lui l'expérience de couper en deux un polype, & que les deux portions se sauverent chacune de leur côté » (2)

Leuwenhoeck avoit aussi publié quelque chose sur ces animaux en 1703 dans les *Transact. Philos.* ; mais personne ne les avoit étudié & n'avoit rendu compte de leurs diverses espèces, de leurs habitudes, de leur manière de se nourrir & de se propager jusqu'à ce que le hasard les fit tomber sous les yeux d'un Naturaliste Genevois qui réunissoit au plus haut degré les talents & les qualités dont l'ensemble constitue l'observateur. C'étoit feu Mr. Trembley, & son nom depuis lors est en quelque sorte identifié avec sa découverte. L'ouvrage dans lequel il a donné la suite de ses observations sur ces animaux,

(1) Aristote *de Historiâ animalium*, T. I. L. IV, C. 7. pag. 824.

(2) St. Augustin. *De quantitate animæ*, C. 62, pag. 431, col. 1.

est un chef-d'œuvre de sagacité & de logique. Il écrivoit à Mr. Bonnet en janvier 1741. « J'ai étudié ces petites créatures depuis le mois de juillet dernier; je leur trouve des propriétés qui appartiennent à la plante, & d'autres qui font de l'animal. On les prend pour des plantes au premier coup-d'œil, mais si ce sont des plantes, elles sont sensibles & ambulantes; si ce sont des animaux, on peut les multiplier de bouture comme les plantes » ce ne fut qu'au mois de mars de la même année qu'il put décider la question.

Ce fut le célèbre Buffon qui le premier communiqua à la Société Royale de Londres cette curieuse découverte: quelques métaphysiciens ne pouvant accorder les faits avec des raisonnemens qu'ils avoient pris l'habitude de croire sans réplique, nierent bonnement les faits; mais il fallut les admettre à la fin, quand une nuée de témoins les eut constatés.

On compte sept espèces d'hydres ou de polypes d'eau douce. Celles sur lesquelles on a le plus multiplié les observations sont le polype vert, le polype gris, & le polype rougeâtre.

Le premier que découvrit Trembley fut un polype vert. La couleur verte est très-décidée dans cette espèce. Il observa dans les bras, ou ramifications, de cette petite créature des indices d'un mouvement spontanée; l'animal les allongoit ou les raccourcissoit: il les recon-

boit en tout sens ; & au plus léger contact ces bras se contractoient tellement qu'ils disparoissent tout-à-fait , en se réduisant à une petite saillie en forme d'un grain verdâtre. Il découvrit ensuite le polype gris , & lui vit avaler & digérer des vers beaucoup plus gros que n'étoit le polype lui-même. Ces especes ont depuis six jusqu'à douze ou treize bras ; en en a compté dix-huit dans un polype gris. Ils se contractent tellement au sortir de l'eau qu'on les prendroit pour une goutte de gelée. Ces animaux peuvent dilater séparément ou leurs bras , ou leur tronc , & se ployer dans toutes les directions imaginables. Ils montent & descendent à volonté dans l'eau & demeurent suspendus depuis la surface par un procédé singulier : ils font sortir , pour un moment , l'extrémité de leur queue au-dessus du niveau du liquide ; elle s'y dessèche très-promp-tement , & par sa résistance à s'humecter de nouveau elle soutient le polype , & forme autour du point de suspension une petite concavité comme celle qu'on observe autour d'une aiguille lorsqu'on la fait surnager à l'eau. Quelquefois le polype s'attache si fortement , par le simple contact de sa queue , aux plantes aquatiques , qu'on ne peut pas facilement lui faire lâcher prise , surtout quand avec ses bras , qu'il emploie comme autant d'ancres , il a multiplié ses points d'adhérence.

Sa bouche est située à l'extrémité antérieure du-tronc à l'endroit d'où partent tous les bras : cet organe prend toutes les formes qui conviennent aux besoins de l'animal , & elle est susceptible d'une très-grande dilatation ; car le volume de la plupart des animaux dont se nourrit le polype est à la dimension ordinaire de sa bouche , ce que seroit une pomme aussi grosse qu'une tête d'homme , pour une bouche humaine.

C'est un animal très-vorace ; lorsqu'il a faim , il étend ses bras comme un pêcheur déploie ses filets , & il attend patiemment que le hasard lui amène quelque proie. Tout petit insecte qui passe à portée est saisi par quelqu'un des bras & porté à la bouche. On ne lui connoît point d'yeux ; cependant il paroît avoir quelque sens qui remplace celui de la vue & qui l'informe de l'approche de sa proie.

Lorsqu'il attaque un petit ver , il le tue avec tant de promptitude que Fontana attribue , d'après ce fait , au polype une influence vénéreuse très-active. A peine l'animal a-t-il touché le ver , de l'un de ses bras , que celui-ci périt , sans qu'on observe qu'il ait reçu aucune blessure.

La transparence du polype permet de suivre dans son intérieur la digestion des fragments qu'il a avalés ; on facilite cette observation en lui donnant à manger quelque ver rougeâtre. On voit alors les sucs nutritifs se répandre

non-seulement dans le tronc mais dans les bras.

Quelquefois deux polypes attaquent le même ver par ses deux extrémités ; alors ils avalent chacun de leur côté jusqu'à ce que leurs bouches se rencontrent : puis ils s'arrêtent quelque temps , & le ver se rompant pour l'ordinaire , chacun conserve sa moitié. D'autrefois les choses ne se passent pas si paisiblement ; ils se disputent la proie ; & l'un des deux ouvrant la bouche avec plus d'avantage , avale l'autre, avec une portion du ver. L'affaire tourne moins mal qu'on ne le présumeroit pour le polype dont une portion a été avalée ; son antagoniste le revomit pour l'ordinaire sain & sauf au bout d'une heure ; d'où il paroît que l'estomac du polype , qui dissout si promptement les matières animales , n'attaque point la substance d'un autre polype (1).

(1) L'un de nos amis , le Cit. Trembley , neveu du naturaliste célèbre à qui nous devons presque toutes ces observations si curieuses , vient d'y ajouter quelques faits nouveaux. Voici ce qu'il nous mande à ce sujet.

« J'ai lu avec bien de l'intérêt l'extrait que vous avez donné dans votre dernier N°. de la *Biblioth. Bris.* de l'ouvrage d'Adams. — Vous annoncez qu'il a consacré un chapitre entier aux polypes d'eau douce. Comme j'ai observé dans le courant de l'été dernier une espèce de ces singuliers animaux & que j'ai été

Toutes ces allures ont des rapports plus ou moins marqués avec ce que nous connoissons de l'animalité en général ; mais sous le rapport

témoin d'un fait qui avoit échappé aux observations de mon oncle, je serois très-curieux de savoir s'il en est question dans l'ouvrage d'Adams : voici ce dont il s'agit. »

« Mon oncle exprime les regrets au commencement de son second Mémoire de ce qu'après six mois d'observations sur le polype vert il n'a pas pu découvrir comment il se nourrissoit. »

« On a vu, dit-il, dans le Mémoire précédent, » que ce sont les polypes verts que j'ai trouvés les » premiers. Je les ai observés pendant plus de six » mois ; & quelques soins que je me soie donnés pour » découvrir comment ils se nourrissent, je n'ai pu » en venir à bout. Lorsque j'ai eu lieu d'être per- » suadé qu'ils étoient des animaux, & que leur struc- » ture m'a été un peu connue, j'ai soupçonné que » cette ouverture qui se faisoit remarquer à leur ex- » trémité antérieure étoit leur bouche ; mais tous » ceux que j'avois font périés avant que j'ai pu pouf- » ser plus loin mes recherches ; & sous les soins que » j'ai pris pour en trouver d'autres, depuis le mois » d'avril 1741, jusqu'à présent, (janvier 1744) ont » été inutiles. »

« J'ai eu le bonheur de trouver de ces animaux dans une eau stagnante très-voisine de ma demeure ; & après avoir répété quelques-unes des expériences qui tiennent aux étonnantes reproductions de ces animaux, j'ai dirigé toute mon attention sur les faits qui pouvoient m'indiquer la manière dont ils se nourris- » sent ; & mes recherches n'ont point été infructueuses.

de la propagation , le polype est une plante ; car il multiplie par rejettons. On voit paroître à sa surface de petits tubercules qui s'allon-

J'avois mis divers insectes aquatiques dans une grande foucoupe où je tenois des polypes : je remarquai que ceux-ci appliquoient leurs bras avec une sorte d'avidité sur des vers rouges de tipules : les vers se débattaient & entraînoient les polypes avec eux. Ceux-ci paroissoient sucer le ver. J'essayai un jour de couper en deux un de ces vers , & j'eus alors le plaisir de voir un polype avaler en entier une de ces portions. Après l'avoir gardée pendant un certain temps & en avoir tiré toute la substance qui lui convenoit , il vomit le résidu. Depuis ce moment je vis tous les jours des polypes avaler de petits vers ou des portions de vers ; on apperçoit ceux-ci dans le corps du polype à travers sa peau ; il les rejette ensuite sans les avoir déformés ; mais il est à présumer qu'il en a tiré tout le suc , parce que si l'on offre à un autre polype un de ces vers rejetés , il ne le saisit pas. „

„ Je vis un jour un spectacle très-singulier : ordinairement les polypes saisissent les vers par l'une de leurs extrémités ; mais j'offris à l'un d'eux une portion d'un ver assez gros ; il appliqua sa bouche sur le milieu du ver , puis il la dilata peu-à-peu au point de couvrir toute sa surface ; les bras du polype étoient redressés en dehors & fort contractés ; ce qui formoit une espece de petite corbeille dont l'extrémité postérieure du polype occupoit le centre : on peut dire que les trois quarts de son corps s'étoient convertis en une grande bouche qui suçoit le ver sans l'avalier. Il m'auroit été impossible de le reconnoître.

gent peu-à-peu en forme de branche , deviennent un polype parfait , & se séparent ensuite du tronc primitif par des secouffes volontaires.

Sous cette forme singulière , si je n'avois suivi de l'œil ce changement depuis l'origine. Lorsque le polype eut bien sucé le ver , il reprit dans un instant sa première forme. Les polypes verts se nourrissent indistinctement des vers rouges dont j'ai parlé , & d'une autre espèce fort analogue , mais qui est d'un blanc jaunâtre. Ces vers forment de petits tuyaux avec des débris de plantes ou autres matières spongieuses & s'y tiennent ordinairement renfermés. Ces deux espèces sont très-bien décrites dans le premier Mémoire du V^e. vol. de Réaumur sur les insectes. Il est assez singulier que la conformation des vers blancs l'ait porté à leur donner le nom de vers polypes , quoiqu'à cette époque il ignorât l'existence des polypes , & par conséquent , que ces vers leur servoient de nourriture. Je montrai mes polypes verts à Mr. Favre de Rolle , qui a beaucoup de goût pour l'Histoire naturelle ; il en prit quelques-uns chez lui , & découvrit au bout de quelque temps , que ces mêmes vers qui étoient dévorés par les polypes les mangeoient à leur tour ; ils appliquent leur bouche contre le polype , qui diminue peu-à-peu , se change en une sorte de bouillie , & passe en entier dans le corps du ver où l'on voit la matière verdâtre dont est composé le polype. C'est un fait assez singulier dans l'Histoire naturelle , que de trouver des insectes d'espèces différentes qui se mangent réciproquement. »

„ J'ai essayé de garder des polypes sans leur donner à manger : ils ont vécu près de 4 mois ; ils ont diminué à mesure que le jeûne se prolongeoit , & ont

La chaleur de la saison influe beaucoup sur la rapidité de ces développemens : on observe à cet égard des différences qui s'étendent depuis un jour jusques à quinze. Le jeune polype pendant son adhérence au tronc principal, le fait profiter de la nourriture qu'il fait déjà se procurer avec ses petits bras.

Le principe de vie est si universellement & si intimément attaché à toute la substance de cette classe d'animaux, que les mêmes procédés qui tuent tous les autres, non-seulement n'annéantissent point ceux-ci, mais accélèrent im-

fini par disparaître tout-à-fait. La privation d'air les tue au bout de dix à douze jours, & beaucoup plus tôt si l'eau dans laquelle ils sont est très-échauffée. Quelques heures ont suffi pour les tuer dans un flacon que j'avois mis dans la poche de mon gilet »

» En observant quelques animaux aquatiques j'ai vu une sorte de ver qui a un grand rapport avec les larves de cousins, dont il diffère cependant à quelques égards dans la partie postérieure. Sa tête est aplatie de dessus en dessous, & son contour est arrondi : le corps est longuet, la tête est bien détachée du premier anneau, auquel elle tient par une espèce de col. Ce petit animal fait sortir de sa tête deux espèces de houpes dont l'agitation & le jeu attirent vers sa bouche l'eau & les petits corps qui nagent au-dessus. Il avale ensuite ceux qui lui conviennent. Pendant que je considérois cette petite manœuvre, je fus très-étonné de voir la tête de ce petit insecte tourner comme sur un pivot horizontal, de manière que le dessus se trouva dessous, quoique le reste du corps

médiatement leur multiplication. On peut varier ces épreuves de mille manieres. Si on coupe un polype en morceaux , soit en long, soit en travers , chaque fragment devient bientôt un animal entier ; même une petite portion de la peau produit aussi un animal parfait. Si l'on fend un polype en deux , depuis le sommet de la tête jusqu'au milieu du tronc , on produit un polype à deux têtes qui font chacune leurs fonctions ; si on le divise en six ou sept parties , on obtient un polype à six ou sept têtes. Qu'on refende chacune d'elles , on a un polype à douze ou quatorze têtes ; qu'on coupe toutes

n'eût point bougé : je la vis tourner & retourner plusieurs fois sans que le jeu des petites houpes cessât. Cela présente un spectacle assez singulier. Je l'ai montré à Mr. Senebier qui a vu la chose comme moi. Je n'ai rien trouvé qui y eût rapport dans les descriptions de Reaumur. J'ai suivi l'insecte dans l'état de nymphe ; elle a beaucoup de rapport avec celle du cousin Mr. Jurine à qui Mr. Senebier a envoyé une mouche provenue d'un de ces vers a assuré que ce n'étoit point une tipule ni un cousin. „ . . .

„ Il y a encore un fait singulier relatif aux polypes verts , & dont je n'ai pu découvrir la cause : c'est leur extrême rareté dans certains temps & dans certains lieux. Vous avez lu que mon oncle fut plus de trois ans sans pouvoir en retrouver ; & mon frere m'écrivit de Berlin que j'ai eu une espece de bonne fortune en trouvant des polypes verts , & qu'il en avoit souvent cherché avec mon oncle aux environs de Genève , sans pouvoir en découvrir. „

ces têtes , chacune fournit seule un nouveau polype , & de nouvelles têtes croissent sur tous les troncs. Jamais les récits fabuleux de l'Hydre de Lerne n'ont approché de ces merveilles.

On peut enter deux ou plusieurs polypes les uns aux autres , en rapprochant leurs extrémités fraîchement coupées : on met si l'on veut , la tête de l'un sur le corps de l'autre & elle y demeure. On peut réunir deux polypes en un seul en faisant avaler , l'un des deux par l'autre jusqu'à la tête ; le nouveau polype a deux fois plus de bras qu'un autre & s'en fert également bien. Enfin si l'on retourne un polype sur lui même , comme on feroit un sac ou un gant , il s'accoutume très-bien à ce mode d'existence ; son estomac devenu épiderme , l'épiderme converti en estomac , s'acquittent très-bien de leurs fonctions respectives. Si à l'époque de l'opération il y avoit de jeunes polypes à la surface extérieure de l'animal ainsi retourné , ceux qui avoient déjà acquis un certain développement font leur chemin en-dedans du côté de la bouche pour fortir par-là lorsqu'ils se détacheront ; ceux qui étoient plus petits prennent le parti de se retourner aussi & ils atteignent ainsi de nouveau la surface extérieure , en traversant la substance même du sac dans lequel ils se trouvoient renfermés.

Mais ces détails entraînant nous font dépasser

les bornes & le genre d'un extrait. — Nous supprimons & les réflexions qui naissent en foule, & d'autres faits qui appartiennent au monde microscopique ; peut-être y reviendrons-nous une fois : nous aimons à l'espérer.

G É O L O G I E.

ON THE PRIMITIVE STATE OF THE GLOBE, &c.

Sur l'état primitif du globe & la catastrophe qui lui a succédé. Par R. KIRWAN, Esq. des Soc. Roy. de Londres & d'Irlande. (tiré des *Transactions de l'Acad. d'Irlande*, T. VI.)

(*Dernier extrait.*)

« **A** PRÈS avoir, dit l'auteur, établi dans l'essai précédent la confiance due à Moïse d'après des raisonnemens purement philosophiques & indépendans de toutes considérations théologiques, je ne me ferai aucun scrupule de le prendre pour guide, dans le développement des circonstances de la plus terrible catastrophe à laquelle l'homme, tous les animaux & le globe lui-même aient été exposés depuis la création. Son témoignage est, à la vérité, confirmé par les traditions de plusieurs anciens peuples (1). — Mais je

(1) Nous trouvons dans une très-curieuse *Dissertation sur le Déluge*, publiée en latin en 1768 par le C. Picot, l'un des Professeurs actuels de l'Acad. de

m'attache plus particulièrement aux preuves géologiques, & j'en trouve de très-concluantes.

Il cite d'abord, les coquillages trouvés au Pérou, par D. Ulfoa à la hauteur de 14,220 pieds : & comme il a montré dans l'Essai précédent, que les poissons n'ont commencé à exister que lorsque les eaux furent descendues à 8500 pieds seulement, au-dessus de leur niveau actuel, les coquillages adventifs trouvés à de si grandes hauteurs, ont dû y être portés par quelque inondation, qui, pour atteindre jusques là n'a pu être partielle, mais a dû s'étendre sur tout le globe.

Ensuite ; on a trouvé dans les plaines de la Sibérie des os d'éléphant & de rhinocéros, & même la carcasse entière d'un de ces derniers animaux. Or, comme ils ne peuvent vivre dans un climat aussi froid, il faut qu'ils y aient été transportés par quelque violente inondation qui provenoit de régions d'une température plus douce, séparées de la Sibérie par des montagnes de plus de 9000 pieds de hauteur, par dessus lesquelles les eaux ont dû se frayer un chemin.

Genève, quelques détails sur ces diverses traditions ; on les a retrouvées en Chaldée ; en Syrie ; en Egypte ; en Perse ; dans l'Inde ; en Italie ; en Chine ; en Grèce ; en Scandinavie ; & jusques en Amérique. — Toutes s'accordent sur le fait principal, & elles ne diffèrent que dans les circonstances. (R)

Enfin on trouve souvent entassés dans les mêmes lieux des coquillages qu'on fait appartenir à des régions très-distantes les unes des autres. Il faut donc que l'une au moins des espèces ainsi réunies ait été amenée par quelque violente inondation.

L'auteur considère ces trois classes de faits comme offrant les preuves géologiques les moins équivoques d'un déluge universel. Il croit que les autres faits du même genre qu'on cite en preuve peuvent avoir une origine différente. De ce nombre sont les os fossiles d'éléphants qu'on rencontre ici & là en Europe ; les os & dents de baleines trouvés près de Maëstricht, &c.

On a formé diverses hypothèses pour expliquer ceux d'entre ces faits qui sont les mieux constatés : les uns supposent que dans une époque plus ou moins ancienne, l'axe de la terre étoit, parallèle à l'écliptique, ce qui produisoit sur toute la surface du globe un printemps perpétuel & une température supportable aux éléphants. Mais les astronomes ont démontré qu'il est impossible que ce parallélisme ait jamais existé. D'autres imaginent que les pôles changent continuellement de place & qu'ils ont pu se trouver anciennement là où est maintenant l'équateur, &c. Mais les mouvemens bien connus de l'axe de la Terre, mouvemens très-peu sensibles & qui ont leurs limites & leurs périodes, ne s'accordent point avec

cette hypothese ; d'ailleurs les pyramides d'Égypte , encore très - régulièrement orientées , montrent que depuis trois mille ans , les pôles n'ont point changé.

Vient ensuite l'hypothese de Buffon , qui comme on fait , suppose la terre dans un état de fusion ignée , & d'incandescence pendant un terme plus ou moins long , & se refroidissant ensuite graduellement. Elle étoit ainsi plus chaude qu'elle ne l'est à présent , lorsque les éléphants pouvoient vivre en Sibérie. — “ Si Buffon , dit l'auteur , eût suivi les sentiers de l'expérience , il auroit vu que ce qu'il appelle son verre primitif , le *quartz* , loin d'être une substance vitreuse , est infusible ; & qu'au grand feu il perd sa transparence & une portion de son poids : il auroit vu que le *mica* , qu'il prend pour du quartz exfolié , est un composé absolument différent du quartz , &c. &c. Et sans parler des autres difficultés auxquelles cette hypothese est sujette , elle n'explique pas même les os d'éléphants & la carcasse de rhinocéros trouvés en Sibérie ; car , en supposant que le climat de ces régions ait pu une fois convenir à ces animaux , leurs dépouilles trouvées dans le pays ne peuvent point prouver qu'ils y ont vécu : 1°. parce qu'éloignées comme elles le sont , de plusieurs centaines de milles de la mer , elles sont accompagnées de plantes marines , qui sans doute ont été charriées avec elles ; 2°. parce qu'on les

trouve en monceaux ; & qu'on ne peut pas mieux présumer que ces animaux se donnassent à cette ancienne époque des cimetières communs , qu'on ne l'observe actuellement dans l'Inde où rien d'analogue n'a été remarqué ; 3°. parce que le rhinocéros a été trouvé entier & non putréfié ; ce qui n'auroit pu arriver s'il eût péri dans un climat chaud ; 4°. enfin , parce que dans le Groënland , à une latitude qui n'est pas très distante de celle où les os ont été trouvés en Sibérie (55°.) on rencontre *sur les montagnes*, des ossemens de baleines & non d'éléphans. Il faut donc que le climat y fût alors assez froid pour les baleines ; c'est-à-dire , extrêmement différent de celui qui convient aux éléphans : donc, les animaux dont on a trouvé les restes en Sibérie ne peuvent pas y avoir vécu. »

La quatrième hypothèse est celle de Mr. Edouard King, qui a été fort développée & agrandie par Mr. Deluc : ce philosophe , justement célèbre, est persuadé que les continens actuels étoient , avant le déluge , le fond ou le lit de l'ancien océan , & que le déluge ne fut que le résultat de la submersion des anciens continens , lesquels forment le fond actuel des mers. Il résulte de cette supposition que nos montagnes actuelles ont dû être formées dans l'océan antédiluvien , & que les coquillages marins peuvent se rencontrer sur leurs sommets les plus élevés. »

» Selon cette hypothèse les anciens continens doivent avoir existé dans les régions maintenant occupées par les mers atlantique & pacifique. Comment expliquer alors, les os d'éléphans & le rhinocéros trouvés en Sybérie ? Ces parties du globe étoient le fond d'une mer ; & les eaux en se précipitant vers les continens qui s'enfonçoient, ont dû *y porter*, & non en *rapporter*, des dépouilles animales quelconques. »

Indépendamment de ces objections tirées des faits géologiques, notre auteur attaque l'hypothèse de Mr. Deluc par un côté auquel ce savant ne se seroit sans doute pas attendu. Il ne la trouve point assez conforme au récit de Moïse.

L'écrivain sacré indique nominativement deux causes de la catastrophe : une pluie de quarante jours ; & l'éruption des eaux du grand abîme. Il nous dit que les eaux *s'éleverent* sur les continens pendant un certain nombre de jours ; qu'elles *demeurerent* stagnantes pendant une seconde période, & qu'ensuite elles *reprirent leur ancien lit*. Puisqu'il y a eu dans leur marche, mouvement progressif & retraite, n'est-il pas évident que ces expressions ne sont applicables qu'à une portion identique & non à deux portions différentes du globe ?

« Mr. Deluc, dit notre auteur, répond qu'il est annoncé (13 verset chap. 6 de la Genèse) que la terre seroit *détruite*. — Mais, Moïse n'a pu entendre par cette expression une destruction

qui la fit disparoître à toujours , & il ajoute que les eaux s'éleverent de 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes; mais comme il n'a parlé nulle part des montagnes antédiluviennes & qu'il a fait mention , au contraire dans plusieurs endroits , de celles qui sont postérieures au déluge , il est évident que c'est à celles-ci que cette circonstance de sa narration se rapporte. »

La branche d'olivier est difficile à expliquer dans l'hypothèse de Deluc. Ce savant la fait croître sur une des Isles des mers antédiluviennes; mais alors, comment Noé auroit-il pu considérer l'apparition de ce rameau comme étant un signe de la diminution des eaux ? S'il y eut alors des Isles qui demeurèrent intactes, leurs habitans auroient pu échapper à la catastrophe; supposition directement contraire au texte. La colombe revint, parce qu'elle ne trouva pas où se poser; il n'y avoit donc pas d'Isles; & le corbeau ne revint pas, parce qu'il dût trouver assez de carcasses flottantes pour se nourrir.

Après avoir seulement nommé, en passant, Burnat Woodward & Whiston, comme inventeurs de systèmes géologiques qui ont été réfutés suffisamment & à plusieurs reprises (1).

(1) Burnet, fait de la Terre antédiluvienne une écorce plane qui recouvre l'abyme : cette écorce se rompt; se déprime inégalement, elle comprime les

L'auteur en vient au détail de cette grand révolution, pris dans son sens simple & littéral. « C'est le seul ajoute-t-il, qui paroisse parfaitement d'accord avec tous les faits maintenant observés. Moïse attribue nettement la catastrophe à une cause furnaturelle. — Nous devons donc considérer le Déluge comme une inondation miraculeuse, provenant à-la-fois & de l'atmosphère & des eaux souterraines; & si les eaux, situées en parties au-dessus & en partie au-dessous de l'écorce du globe, ont pu suffire *une fois* à couvrir jusqu'aux plus hautes montagnes, ainsi que je l'ai montré dans mon premier Essai, elles peuvent avoir recouvert une seconde fois ces mêmes sommités, en supposant qu'une impulsion furnaturelle ait fait ressortir cette masse de liquide hors de ses réservoirs souterrains. » Keil,

eaux; celles-ci viennent l'inonder partiellement & se retirent ensuite. — Woodward délaye, dissout même dans l'océan boueux produit par les pluies & l'éruption de l'abyme, toute l'enveloppe solide terrestre; ces matieres se déposent ensuite & se stratifient pêle-mêle. — Whiston cherche dans les Cieux & dans l'abyme à la fois, la cause du bouleversement. Il fait approcher une comete, dont l'attraction produit des marées énormes; l'eau de l'abyme, fortement attirée rompt l'enveloppe qui la recouvre & se répand partout avec furie; la queue même de la comete fait momentanément partie de l'atmosphère terrestre, & occasionne la pluie de quarante jours, &c. (R)

« Keil ; d'après la supposition que la profondeur moyenne de l'océan n'excédoit pas un quart de mille , avoit calculé qu'il faudroit vingt-huit océans pour recouvrir les plus hautes montagnes ; mais , dit l'auteur , Mr. De la Place calculant la profondeur moyenne de la mer , non d'après des sondes partielles & imparfaites , mais d'après ce qu'exige la théorie newtonienne des marées , démontre qu'une profondeur moindre de quatre lieues ne peut concilier cette théorie avec les phénomènes. Il n'en faut pas tant , à beaucoup près , pour que cette masse d'eau suffise à l'explication mosaïque du déluge. »

« Après avoir ainsi établi la possibilité & la réalité de cette catastrophe , je vais essayer de reprendre son origine , ses progrès , & les conséquences , qui sont encore sous nos yeux. Je crois que l'inondation vint du grand océan méridional , au-delà de l'équateur , & qu'elle s'étendit sur l'hémisphère septentrional. » Voici les faits sur lesquels l'auteur fonde cette opinion.

1°. L'océan méridional renferme la plus grande masse d'eau qu'il y ait actuellement à la surface du globe.

2°. On trouve bien dans les latitudes septentrionales , entre 45 & 55°, des dépouilles terrestres & marines des régions méridionales ; mais on ne rencontre pas dans les latitudes australes des débris d'animaux ou de végétaux qui aient appartenu aux régions boréales. Les

l'auteur cite les faits rapportés par divers Naturalistes , & qui tous appuient son assertion.

3°. On trouve encore dans beaucoup d'endroits des traces d'un choc ou d'une impression violente provenant du midi. Ici s'appliquent les observations de Patrin sur les chaînes de la Daourie ; de Steller, sur celles du Kamschatka ; de Storr , de Hæpfer & de Desaussure sur les chaînes voisines des Alpes ; enfin celles de Lefius sur les montagnes du Hartz.

4°. On peut remarquer que tous les grands continens se terminent par un angle aigu du côté du midi. L'Amérique, l'Afrique, la Presqu'isle d'Asie , l'extrémité méridionale de la Nouvelle Hollande , présentent cette figure , résultat probable de l'action violente des eaux venant du midi , action à laquelle rien que de grandes chaînes de montagnes n'a pu résister.

C'est au milieu du vaste continent de l'Asie , vers les sources du Ganges & du Burrampooter que notre auteur place la première demeure de l'homme. Delà , à mesure que la température devint plus froide, la population descendit dans les plaines de l'Inde.

Il cherche à se former une idée des effets d'une pluie de quarante jours , en les rapprochant des observations recueillies par les physiciens modernes sur certains bouleversemens produits par des pluies fortes ou longues. On a vu une montagne entière , de la province de

KIRWAN, SUR L'ÉTAT PRIM. DU GLOBE, &c. 147

Vermeland en Suède s'écrouler après une averse d'une nuit ; &c. Dans l'entassement de matières de toute espèce qui dût être le premier résultat du déluge, les substances animales durent fournir l'acide phosphorique qui minéralise quelquefois des métaux, on le trouve combiné avec la terre calcaire sous la forme de phosphate de chaux.

Suivons maintenant, avec une mappemonde ou un globe terrestre sous les yeux, la marche des eaux méridionales telle que notre auteur l'indique à grands traits.

Le complément de la catastrophe fut sans doute, dit-il, l'éruption & l'invasion des eaux du grand abîme, ainsi que le dit expressément l'Historien sacré. Ce réservoir est probablement, comme on l'a indiqué tout-à-l'heure, l'immense étendue de mer comprise entre les Philippines & le continent d'Asie d'un côté, l'Amérique méridionale de l'autre, & de là jusqu'au Pôle antarctique. Cet océan est contigu à un autre non moins vaste, compris entre la côte orientale de l'Amérique méridionale d'une part, & la Nouvelle Hollande de l'autre, & se terminant au même pôle. La première de ces deux masses d'eau, chassée du midi au nord avec une impétuosité irrésistible, balaya le continent qui unissoit probablement alors l'Asie & l'Amérique ; il n'en reste de traces que quelques Isles éparsemées, jusques vers les 40 degrés de latitude :

nord, où il paroît que les hautes montagnes de la Chine & de la Tartarie d'un côté & celles de la côte Américaine située vis-à-vis, diminueroient sa violence : delà le courant se répandit à droite & à gauche sur les contrées collatérales ; la partie contenue par les grandes chaînes de Tartarie forma, en entraînant toute la partie végétale du sol, le désert de Coby ; le torrent intérieur ou moyen, tendoit droit au pôle, mais resserré encore par les montagnes contigues & élevées de la Sibérie orientale & de l'Amérique occidentale ; il dut s'élever à une hauteur & acquérir une pression telles que rien ne put y résister & que les sommets des montagnes en furent bouleversés, ainsi que l'ont remarqué Patrin & Steller : ces eaux, chargées des dépouilles animales & végétales des contrées qu'elles venoient de ravager au Sud, les déposèrent dans les immenses plaines, doucement inclinées, de la Sibérie orientale. Telle est l'origine des ossemens provenant d'éléphans ou de rhinoceros qu'on trouve dans les plaines ou les collines graveleuses & marneuses dans le Nord-ouest de la Sibérie. C'est du moins l'origine que leur assigne Pallas. »

» Si, revenant vers le midi, nous contemplons les effets de l'arrivée des eaux contre l'Inde & l'Arabie, nous les verrons, là où les côtes n'étoient pas garanties par des chaînes de montagnes, creuser les golphes de Nankin,

KIRWAN, SUR L'ÉTAT PRIM. DU GLOBE, &c. 349
de Tonkin & de Siam, le vaste golphe de Bengale, le golphe Persique & la mer rouge. On ne peut présumer que les foibles courans qu'on observe encore aux environs des promontoires qui séparent ces golphes, aient pu les former, mais la force d'une masse d'eau telle qu'on vient de la désigner paroît seule être en proportion avec ces effets prodigieux, & uniformes dans leur principal caractère.

L'impulsion du courant paroît avoir été surtout dirigée du Sud au nord entre les 110 & les 200 degrés de longitude orientale, à compter du méridien de Londres. Son action paroît avoir été plus foible dans les régions plus occidentales. Je soupçonne que les plaines de l'Inde furent moins ravagées que le reste, ou peut-être leur fertilité subséquente est-elle due au grand nombre de rivières qui arrosent cet heureux pays. Il n'en est pas ainsi de l'Arabie : la base solide qui résista à l'inondation céda toute la croûte de terre végétale qui la recouvroit, cette contrée est encore maintenant déserte, & les régions intérieures plus montueuses ayant intercepté & recueilli ce sol enlevé, sont encore de nos jours, renommées pour leur fertilité. On peut attribuer aussi à l'enlèvement du terreau au végétal antédiluvien les vastes déserts sablonneux de l'Afrique & la stérilité de la plupart des plaines de la Perse.

Nous ne suivrons pas l'auteur dans tout le

déploiement de son système sur le continent de l'Asie. Nous remarquerons seulement qu'il attribue les grands lacs méditerranées tels que la mer Caspienne, & le Pont Euxin aux tournoiemens occasionnés dans le courant principal par les obstacles que lui oppoient les chaînes de l'Asie septentrionale. Le mélange des coquillages & des animaux Indiens & Américains qu'on trouve en Europe & au nord de l'Afrique, comme à Fez, par exemple, appuie éminemment l'ensemble de ce système.

La rencontre de ces masses énormes de liquide qui cheminoient dans des directions opposées, dut secouer violemment certaines parties de la voûte qui les supportoit & peut-être les rompre. C'est à un effet de ce genre que l'auteur attribue la formation de la mer Atlantique depuis les 20 degrés de latitude Sud jusqu'au pôle arctique ; « la seule inspection d'une carte suffit, dit-il, à montrer que cette portion considérable de la surface du globe a été creusée par l'impression des eaux ; la protubérance qui s'étend du Cap Frio à la rivière des Amazones, correspond avec l'excavation de la côte d'Afrique depuis la rivière de Congo jusqu'au Cap Palmas ; & d'autre part, la saillie du continent Africain entre le détroit de Gibraltar & le Cap Palmas, répond à l'immense golphe entre New-York & le Cap St. Roque. »

Les parages voisins de la grande rupture,

durent s'en ressentir plus ou moins, & les déchiremens latéraux formerent, ou préparèrent, des Isles, & les côtes escarpées des faces occidentales d'Irlande, d'Ecosse, & de Norwège. « Il est possible, ajoute l'auteur, que les fissures des masses basaltiques de ces mêmes côtes, datent de l'époque de cette secousse violente. »

C'est avec les débris de matieres métalliques, bitumineuses, charbonneuses, &c. charriées pêle mêle par les eaux, & aux combinaisons nouvelles & aux dépôts, qui se formerent dans le liquide, que l'auteur forme certaines couches de houille, & les basaltes, substances entre lesquelles l'excellent observateur Werner a trouvé des rapports très-marqués. Les fluides élastiques qui s'en dégageoient laissent des cavités qui furent ensuite remplies par des infiltrations auxquelles on doit les calcédoines, les zéolites, les olivines, les basaltines, & des substances spathiques diverses, qu'on trouve encore fréquemment mêlées d'asphalte & de bitume. Ce dépôt fut la dernière scene de la grande catastrophe, c'est pourquoi les coquillages étant déjà stratifiés à cette époque, on n'en trouve point dans ces basaltes. Certaines couches de grès & d'argile datent du même temps.

Au demeurant, l'auteur ne donne qu'en passant & sans plus d'importance qu'elle ne peut en mériter réellement, cette hypothese sur la formation des basaltes. Il reprend ensuite la

récit de Moïse & répond à quelques objections des critiques, & en particulier à celle qui repose sur la difficulté que dût éprouver Noé à rassembler *toutes les espèces* d'animaux dans l'arche. Il croit d'après le rapprochement du v. 191 Chap. VI de la Genèse, avec le v. 30 Chap. I. du même livre, qu'il ne s'agissoit que des animaux herbivores, & des granivores; c'est-à-dire de ceux qui sont plus particulièrement utiles à l'homme. Il croit que les autres, furent créés dans une époque subséquente; & ceux-là surtout, qui appartiennent exclusivement à l'Amérique, & aux Zônes torride & glaciale.

L'atmosphère elle-même dût éprouver une modification particulière par les effets du déluge. La proportion des végétaux qui purifient l'air, aux animaux qui le détériorent, étoit beaucoup plus grande dans les temps qui suivirent de près la création qu'elle ne le fut ensuite: delà probablement la longévité des antédiluviens. L'effet inverse eut lieu après le déluge, & les innombrables décompositions de matières animales absorbèrent une quantité très-considérable d'oxygène, ce qui amena peu-à-peu l'atmosphère aux proportions actuelles. La race humaine habita probablement long-temps les lieux élevés, pour éviter l'effet des exhalaisons nuisibles; ensuite, les descendants de Noé s'établirent dans le voisinage de la Chine, pays dont les traditions s'accordent avec ce titre d'ancienneté.

Dans son TROISIEME ESSAI, l'auteur s'occupe des événemens postérieurs au déluge ; mais qui avoient été jusqu'à un certain point, préparés par cette catastrophé. Il met dans ce nombre la séparation totale des continens d'Amérique & d'Asie ; le rétrécissement de la Baltique ; la séparation de la mer Caspienne & du Pont Euxin & la jonction de cette dernière mer avec la méditerranée ; enfin la séparation de l'Irlande, avec la Grande - Bretagne , & l'ouverture complète du Canal de la Manche. Il examine ce que la tradition nous apprend , & ce que les apparences nous acheminent à présumer sur ces événemens.

On n'a point de tradition sur la séparation de l'Asie avec l'Amérique ; l'auteur conjecture que ces continens étoient réunis parce qu'il paroît que leurs habitans ont eu des communications réciproques. Il croit que la séparation finale fut l'effet d'éruptions volcaniques.

Il présume le rétrécissement successif de la Baltique d'après les plaines de plusieurs centaines de milles, qu'on trouve dans la Russie méridionale depuis Pétersbourg jusqu'à Pultawa ; ces plaines sont encore marécageuses & couvertes de coquillages pétrifiés. Cette mer est plutôt un lac formé par la décharge des eaux d'un bassin immense ; son eau n'est que peu salée & elle n'acquiert cette qualité que par sa communication avec la mer d'Allemagne.

Pallas a, sinon démontré, du moins rendue extrêmement probable l'ancienne communication qui existoit entre la mer Caspienne, le lac d'Aral & la mer Noire avant que le Bosphore de Thrace fût ouvert. Il conclut d'un assez grand nombre d'observations que le niveau primitif de la mer Caspienne étoit de quatre-vingt-dix pieds au-dessus de son niveau actuel, & qu'elle communiquoit ainsi avec le Pont Euxin par la mer d'Azoph. Ce n'est qu'environ 1800 ans avant notre Ere que la séparation a eu lieu, ainsi que le montre Mr. Forster dans un savant Mémoire inséré dans le magasin de Goettingue pour 1780.

« Buffon ne donne point les motifs de son opinion que la rupture de l'Isthme qui séparoit cette mer de la méditerranée a dû précéder le déluge, » aucune tradition dit l'auteur, n'appuie cette hypothèse. La rupture de l'Isthme fut probablement soudaine & totale, & selon toute apparence, l'effet d'un tremblement de terre. Considérons, pour découvrir cet effet, l'état antérieur de la méditerranée. »

« Avant son union avec la mer Noire & l'océan, elle formoit probablement un bassin beaucoup plus étroit & moins profond que ne l'est son bassin actuel, car quoiqu'elle reçût plusieurs rivières considérables telles que le Nil, le Rhône & le Pô, puisque même à présent, l'évaporation suffit à maintenir son niveau qu'on

qu'elle reçoive les eaux de la mer noire & de l'océan, nous pouvons bien supposer que lorsqu'elle étoit isolée les eaux étoient beaucoup plus basses. Lors donc que par la rupture de l'Isthme de Thrace d'une part, & de celui qui joignoit Ceuta & Gibraltar de l'autre, les eaux se jeterent avec violence dans ce bassin; la pression immense qui en résulta fit crever son fond, & dans ce tumulte, les Isles de Sicile, de Sardaigne, de Corse, & celles de l'Archipel furent séparées du continent adjacent, & l'Italie prit la forme allongée qu'on lui voit aujourd'hui. Les rivages voisins de France & d'Espagne, & surtout ceux d'Afrique, de Grèce & d'Asie furent inondés assez avant, & delà les imprégnations salines qu'on trouve encore dans les parties adjacentes de l'Afrique. »

L'auteur nous paroît moins heureux dans son explication des volcans sou-marins de la méditerranée. Il conjecture du silence d'Homère, que l'apparition de l'Etna fut postérieure au temps où vécut ce Poète. Il rappelle d'anciennes traditions sur la séparation de la Sicile & de l'Italie (1).

(1) Zancle quoque juncta fuisse
Dicitur Italiam, donec confinia pontus
Abstulit & media tellurem reppulit unda.

Ovid. Metam.

, , , , Trinacria quondam

« Les côtes escarpées qu'on observe entre Gênes & Livourne , & que Ferber a décrites dans sa 22^e. Lettre sont l'effet de la rupture des couches ; car les marées étant presque nûles dans cette mer , on ne peut leur attribuer rien de pareil. La rapidité du Rhône & de la plupart des rivières qui se jettent dans cette mer , (du côté d'Europe , indique la grande inclinaison des pays intérieurs vers cette même mer , effet naturel de la dépression des terres qui leur servoient d'appui. On observe aussi dans les montagnes de Suisse les vestiges d'un choc venant du Sud-ouest ; mais j'en abandonne le développement aux excellens géologues qu'on trouve en nombre dans ce pays. »

Ce fut à l'époque de l'ouverture du détroit des Dardanelles que la mer Noire , baissant de niveau , se trouva séparée de la mer Caspienne , le niveau de celle-ci qui ne reçoit que deux rivières considérables (le Volga & l'Ural) baissa ensuite par l'évaporation , & laissa à sec les déserts salés qu'on trouve encore aujourd'hui dans son voisinage.

La Grande-Bretagne ne fut séparée du continent , que long-temps après le Déluge ; & le Canal de St. George est encore de plus fraîche

Italix pars una fuit , sed pontus & ætus
Mutavere situm , rupit confinia nereus
Victor , & abscisso interluit æquore montes.

Claudian. de rapt. Prosper.

date. C'est à un tremblement de terre que l'auteur attribue la rupture de l'Isthme entre Calais & Douvres; la brèche fut ensuite agrandie par l'effet des marées & des courans. L'Irlande, protégée par l'Ecosse contre la violence du choc septentrional, ne s'est séparée d'elle que graduellement & dans des temps postérieurs à la séparation d'avec l'Angleterre, séparation qui date probablement du déluge, & qui fut l'effet d'un choc venant du midi.

Tous ces changemens se sont opérés au moins trente-six siècles en arrière du temps où nous sommes, & l'auteur ne voit pas de raison de supposer que le niveau moyen de l'Océan ait changé depuis lors. Mais il n'en est pas de même du niveau des continens.

Deux causes ont constamment tendu à l'abaisser. La première est la diminution des eaux dont ils étoient primitivement imprégnés; la seconde est l'éboulement, ou le glissement des couches argileuses inférieures: sans parler des causes accidentelles comme les tremblemens de terre & les inondations.

Après le déluge, nous dit l'auteur, la terre sur laquelle les eaux avoient séjourné 150 jours & d'où elles se retireraient lentement, dut être bien profondément humectée. La végétation en fut d'autant plus active; & on fait que vingt siècles en arrière de nous la plus grande partie de l'Europe étoit couverte de forêts, cette circonstance

devoit contribuer à entretenir l'humidité & produire une infinité de ruisseaux qui ne tarissoient point & charrioient continuellement dans de grandes rivières, & delà à la mer, les particules du sol délayées par leurs eaux. Nous voyons de notre temps, les plus hautes sommités attaquées par l'action combinée de l'air & de l'eau se détruire graduellement; & sans doute ces sommités cèdent depuis long-temps à cette influence & s'abaissent d'autant. A mesure que la population s'est accrue sur la surface du globe les forêts ont disparu, & le sol, en se desséchant, a dû se contracter. Il est évident à l'aspect des collines horizontales qui bordent le lit de la plupart des grandes rivières, que la masse d'eau qu'elles charrioient étoit beaucoup plus considérable autrefois qu'elle ne l'est actuellement. »

L'auteur cite quelques faits modernes qui appuyent cette partie de son système; entr'autres la descente ou le glissement d'une partie considérable de la montagne de Ziegenberg en Bohême. Elle descendit de 38 brasses, jusqu'à l'Elbe, & les arbres qui la convroient demeurèrent en partie debout & en partie inclinés. Ailleurs au contraire la surface du sol s'est élevée par les dépôts des pluies, qui ont même enseveli quelques monumens de l'antiquité. Les ravages de la guerre ont souvent aidé la nature dans ce genre de travail,

L'influence des volcans pour changer la face du globe paroît être beaucoup plus circonscrite, selon notre auteur, que plusieurs écrivains modernes ne l'ont affirmé. Il croit qu'un très-petit nombre de montagnes leur doivent l'existence, & qu'en particulier, ni le Vésuve ni l'Etna ne sont des produits de volcans; il en atteste leurs bases, qui sont des pierres *neptuniennes* ou formées par les eaux. — Écoutons comment il critique la disposition de certains observateurs à tout volcaniser.

« Il n'est aucune illusion contre laquelle les physiciens se soient tenus moins en garde que contre celle qui multiplie les volcans à mesure que l'imagination s'échauffe : sans doute l'étonnement que cause les magnifiques phénomènes de leurs éruptions a influé jusques sur l'entendement de quelques-uns des spectateurs. Chaque pierre noirâtre qu'ils rencontrent ensuite est une lave; l'excellent observateur Sir W. Hamilton n'est point hors de l'influence de cet enthousiasme; il nous dit dans une lettre à Sir John Pringle, (mai 1776) que « partout où » l'on trouve des colonnes basaltiques sembla- » bles à celles du *parc des Géans* en Irlande, on » ne peut douter qu'il n'ait existé des volcans, » car ces colonnes sont de la lave pure. » — Je crois pourtant qu'aujourd'hui personne ne prétendra que l'origine volcanique de ces colonnes soit à l'abri du doute (1).

(1) C'est là une grande question, & l'auteur, s'il

Il nous dit que le Vésuve & l'Etna ont été formés par une série d'éruptions volcaniques, quoiqu'il n'y ait aucune preuve du fait pour la première de ces deux montagnes, & qu'on puisse démontrer que la seconde existoit comme montagne avant que de devenir un volcan. Le Pere della Torre, qui a donné une bonne description du Vésuve soutient que sa charpente n'est point volcanique, mais une simple continuation des Apennins : ce nombre de pierres neptuniennes qu'il vomit dans ses éruptions, & que Gioeni a rassemblées dans sa lithographie du Vésuve, confirme cette opinion ; sans doute, les couches calcaires sont recouvertes d'une croûte de lave très-profonde ; mais il n'est point prouvé que la masse entière du Vésuve en soit composée. On dit qu'en creusant un puits au bord de la mer, on a trouvé des couches de lave à une assez grande profondeur ; mais qui fait si on n'a pas pris le hornblende, soit compacte, soit schisteux, pour la lave elle-même qui doit son origine à ce genre de pierre ?

Quant à l'Etna, il ne peut y avoir de doute. Dolomieu a trouvé des amas énormes de coquillages marins sur ses flancs, au Nord-est, environ 2000 pieds au-dessus du niveau de

étoit appelé au recensement des opinions sur l'origine des basaltes, trouveroit encore peut-être plus de volcanistes qu'il ne l'imagine. (R)

KIRWAN, SUR L'ÉTAT PRIM. DU GLOBE, &c. 362
de la mer. Il en conclut avec raison que ce
Volcan existoit comme montagne avant que la
mer Peût mis à découvert ; il ajoute, qu'à la
hauteur d'environ 2400 pieds, on trouve des
bancs réguliers de glaise grisâtre remplie de
coquillages marins. Ces couches doivent avoir
été déposées à l'époque où la montagne se for-
moit dans le sein de la mer : on y trouve aussi
dit-il de la lave prismatique ; mais le mot de *lave*,
surtout avec l'épithète de *prismatique*, n'en im-
pose plus maintenant à personne. »

• Il affirme de plus, que dans certaines par-
ties de cette montagne on trouve des bancs
calcaires sous la lave. — D'autre part, le Comte
de Borch dans les Lettres sur la Sicile & sur
Malthe, nous dit, que la pierre fondamentale
de l'Etna est un granit mêlé de jaspe, subs-
tances qui n'ont pas de rapport avec des laves ;
il ajoute qu'on y trouve des mines de plomb,
& de cuivre en abondance, & ces mines ne se
rencontrent jamais dans les laves, sauf quel-
ques fragmens accidentellement enveloppés. Ce
dernier géologue prétend que l'Etna a au moins
3000 ans d'antiquité : il fonde cette opinion
sur les couches de terreau qu'il a observées
entre diverses couches de lave. Cependant Dolo-
mier nous dit expressément (Isles Ponces, p. 472)
qu'il n'existe rien de pareil entre les couches
de cette substance. Cette observation ne permet
pas d'admettre les conséquences du calcul de

Borch ; & quand on trouveroit de la terre végétale entre les couches de lave , on ne pourroit rien en conclure sur leur date , car il y a de ces couches qui sont beaucoup plus promptement décomposées & plus fertiles que d'autres : ainsi le Chevalier Gioanni trouva en 1787 des laves vomies en 1766 , déjà en état de végétation , tandis que d'autres beaucoup plus anciennes n'en montraient aucun indice. (Dolomieu, *Ponces* p. 493). On fait d'ailleurs que les couches composées de cendres volcaniques & de pierres poncees végètent beaucoup plus promptement que les autres. »

Ces détails n'entroient pas dans le plan primitif de l'auteur : il se justifie de les avoir introduits , en observant que l'opinion qui fait remonter jusqu'à des temps très-reculés , l'état du globe tel à-peu-près que nous le voyons , se trouveroit en opposition avec les récits de Moïse , récits dont il a cherché à démontrer l'authenticité. Par ses savans rapprochemens & les concordances frappantes qui en résultent , il nous semble avoir atteint le but qu'il s'étoit proposé ; & là aussi il s'arrête.

Mais en lui accordant que la cause du Déluge fût surnaturelle , nous regrettons que son génie n'ait pas cherché à faire un pas de plus , & à deviner quel fut le mode d'action de cette cause. Les physiciens occupés de ces hautes recherches ont toujours un fil qui dirige & contient leur

KIRWAN, SUR L'ÉTAT PRIM. DU GLOBE, &c. 363
imagination, d'ailleurs facilement égarée; c'est
la loi du *minimum* d'action qui s'observe dans
tous les grands phénomènes de la nature; c'est
donc toujours à la *plus prochaine*, à la *plus*
simple qu'il faut recourir quand on a l'ambition
de remonter aux causes. Quel est le plus simple
des moyens que pouvoit employer l'auteur de
la nature pour produire cette submersion dont
nous venons d'étudier les circonstances? Le
philosophe qui aura répondu juste à cette ques-
tion aura probablement deviné le secret que
l'Historien ignore, ou qu'il ne crut pas ses con-
temporains dignes d'apprendre. Voici la solution
que nous donne l'ingénieux auteur de la diffé-
rentiation que nous avons citée (1).

Il suppose qu'à l'époque du déluge, le mou-
vement de rotation de la terre sur son axe fut
retardé dans une certaine proportion; tous les
faits s'expliquent alors de la manière la
plus simple.

On sait que la force centrifuge, née de la
rotation, donne à la terre la forme d'un sphé-
roïde relevé sous l'équateur, & que la différence
du rayon de l'équateur au demi axe polaire,
ou la saillie de la région équatoriale en vertu de
la force centrifuge, est de plus de 10000 toises.

Si l'on suppose que la vitesse de rotation di-
minue, la force centrifuge diminue aussi & la

(1) P. 327. (note.)

gravité augmente proportionnellement. Pour nous faire une idée de l'effet, anéantissons totalement la force centrifuge, c'est-à-dire arrêtons tout-à-fait le mouvement de la terre ; la gravitation agissant alors seule, tendra à faire du sphéroïde une sphere ; les eaux des zones équatoriales cherchant leur niveau, se répandront de part & d'autre vers les pôles ; & leur saillie étoit assez considérable pour qu'il doive en résulter un mouvement prodigieux dans leur chute ; ce mouvement est plus considérable que celui qui suffit à expliquer le déluge ; mais on peut le modérer à volonté à mesure qu'on diminue la quantité du retardement supposé ; on explique encore, si l'on veut, des oscillations dans la masse du fluide, en supposant que le mouvement de rotation ne fut pas retardé uniformément, mais comme par secousses. On peut donc rendre raison de tous les grands faits par cette hypothese.

L'auteur ne l'a pas même développée autant qu'elle auroit pu l'être : car indépendamment des autres influences atmosphériques qu'il examine, & dont il discute l'effet avec sagacité, un changement brusque dans la densité de l'air put seul produire la pluie ; effet que nous imitons en petit lorsque nous condense l'air dans nos récipients ; on voit paroître incontinent une vapeur aqueuse qui se précipite.

Un autre effet encore plus marqué dut le

combiner avec l'accroissement de gravitation qui donna aux eaux équatoriales une tendance à se ruer de part & d'autre vers les pôles ; c'est le résultat de l'inertie de toute la masse des mers, qui se trouvoit en mouvement par l'effet de la rotation de la terre, avec des vitesses données pour chaque point de leur surface, vitesses proportionnelles aux rayons de rotation, ou aux cosinus des latitudes.

Car, à l'instant où l'on suppose que le ralentissement du mouvement diurne a lieu, les eaux, conservant leur vitesse acquise, (qui sous l'équateur approche de celle d'un boulet de canon) se meuvent avec une extrême violence d'occident en orient sur leur fond qui demeure en arriere ; & leur quantité de mouvement relatif, qui varie avec les latitudes des zones dans lesquelles on le considère, se combinant avec la tendance polaire qui résulte de la transformation du sphéroïde en sphere, & avec l'effet des obstacles locaux qu'offroit la disposition primitive des continens & des chaînes de montagnes, a pu produire très-facilement toute la série d'événemens dont Moïse nous a présenté le tableau.

Vent-on ensuite que tout revienne à sa place ; il suffit de supposer que la même main qui retarda le mouvement rotatoire du globe lui redonne sa vitesse première : les eaux retournent des pôles vers l'équateur ; elles reforment

le sphéroïde. Leur inertie produit des courans d'orient en occident qui se combinent aussi avec ceux qui tendent, en retour, des pôles à l'équateur jusqu'à ce que ces mêmes eaux aient acquis toute la vitesse du noyau solide qui les entraîne. — Nous laissons les détails, qui tous cadrent merveilleusement avec les faits & avec les traditions Indiennes. Qu'un LAPLACE fît l'idée principale; qu'il la méditât; qu'il lui appliquât ses puissans moyens d'analyse, elle prendroit, nous le croyons, cette consistance, que les sciences exactes seules, peuvent donner aux matieres conjecturales (1).

(1) Le Prof. Picot ajoute dans une note, que l'Abbé Le Brun avoit eu une idée analogue à la sienne, en cherchant à expliquer le Déluge par une *accélération* dans le mouvement diurne; il augmentoit ainsi la force centrifuge & faisoit sortir de leurs cavernes les eaux souterraines. Il avoit même construit une machine qui représentoit la suite des événemens qu'avoit dû produire cette cause.

Voici ce que nous mande, sur le même sujet, notre savant correspondant, le C. Wild. « Je me suis rappelé en lisant la première partie du Mémoire de Kirwan dans votre Journal, la Géogonie de Silberslag & un appareil qu'il me fit voir, au moyen duquel il démonstroît le déluge conformément au récit de Moïse. C'étoit un secteur de globe, en forme conique, dont la surface sphérique contenoit des montagnes à-peu-près dans la proportion requise. L'intérieur étoit très-ingénieusement distribué en cavités, siphons, commu-

M É D E C I N E.

AN INQUIRY INTO THE CAUSES AND EFFECTS OF THE VARIOLÆ VACCINÆ, &c. Recherches sur l'origine & les effets d'une maladie connue dans quelques Comtés de l'Angleterre, & particulièrement dans le Gloucestershire, sous le nom de *Petite-vérole des vaches*, par Edouard JENNER, Dr. Méd.; Membre de la Société Royale, &c.

Second Extrait.

LES premières observations du Dr. JENNER avoient prouvé que la petite-vérole des vaches quoique susceptible elle-même de revenir plusieurs fois, est un préservatif sûr & infaillible

nications, &c. — arrivoit la pluie — les bondes des Cieux s'ouvroient; les plaines étoient inondées; l'eau absorbée entroit par mille petites ouvertures; enfin les abymes regorgeoient par la pression, & les plus hautes montagnes étoient recouvertes jusques à 15 coudées au-dessus de leurs sommets; enfin l'eau rentroit dans le sein de la terre. — Et voici le plus remarquable; c'est que tout se passoit, soit pour la quantité relative de liquide, la vitesse, les temps proportionnels, &c. conformément au récit de Moïse. — J'eus lieu d'admirer sincèrement le génie de ce Mécanicien.

contre la petite-vérole ordinaire, pourvu qu'elle ait été communiquée d'un cheval atteint du javart à une vache, & de celle-ci aux personnes employées à la traire; que si elle se communique directement du cheval malade aux domestiques qui le pansent, ce qui arrive quelquefois, quoique rarement, elle ne les garantit point aussi sûrement de l'influence variolique; & qu'enfin cette maladie, susceptible comme la petite-vérole ordinaire d'être inoculée, produit à-peu-près les mêmes apparences aux incisions, & suit la même marche fébrile, à l'éruption près, dont elle est toujours exempte.

Ces intéressantes recherches furent suspendues en 1796, par la cessation de la maladie. Mais l'humidité du printemps dernier ayant rendu le javart plus fréquent parmi les chevaux, les nombreux troupeaux du Comté de Gloucester ne tardèrent pas à être de nouveau infectés, & l'auteur saisit cette occasion de faire sur ce sujet d'autres expériences. Voici quel en fut le résultat.

« La maladie commença par une jument qui appartenait au propriétaire d'une grande laiterie. Elle fut atteinte du javart à la fin de février 1798. Les domestiques qui la pansoient, Thomas Virgoe, William Wherret, & William Haynes, eurent en conséquence des ulcères aux mains, des engorgemens douloureux dans les glandes des bras & des aisselles, des frissons

alternans avec une chaleur brûlante, une lassitude générale, & des douleurs vagues dans les membres. Ces symptômes de fièvre ne durèrent que 24 heures. Haynes & Virgoe qui avoient eu la petite-vérole inoculée, trouvèrent une grande ressemblance entre les deux maladies. Wherret n'avoit jamais eu la petite-vérole. Haynes fut journellement employé à traire les vaches, & leur communiqua l'infection. Elles commencerent à être malades dix jours après les premiers pansemens des chevaux. Mais comme on leur administra sur-le-champ des remèdes, elles furent promptement guéries. »

» 18^e. *Observation.* Curieux de déterminer exactement les progrès & les effets de la maladie communiquée de cette manière, je l'inoculai à John Baker, enfant de cinq ans, le 16 mars 1798, avec du pus pris sur les ulcères de Thomas Virgoe. Il tomba malade le sixième jour, eut les symptômes produits par la petite-vérole des vaches, & fut guéri le huitième jour. L'apparence du bouton qui survint à l'endroit de l'incision n'étoit pas tout-à-fait aussi semblable à celle qu'on observe dans la petite-vérole inoculée que lorsqu'on inocule la petite-vérole des vaches. Je l'ai fait graver pour que le lecteur puisse en juger. »

(À l'aspect de la gravure, qui est la seconde du livre, ce bouton nous paroît plus inégal,

plus bienâtre & plus élevé que dans la petite vérole inoculée, & l'érysipèle autour de l'incision est moins bien circonscrit & plus rouge dans le centre que vers les bords.)

« Il auroit été intéressant de voir si la maladie communiquée de cette manière à cet enfant l'auroit garanti aussi sûrement de la petite vérole, que si elle lui avoit été communiquée par l'intervention d'une vache ; si le pus du cheval que nous avons vu être un préservatif peu efficace avoit acquis cette propriété dans son passage par le corps humain ; s'il y avoit subi la même modification qu'il paroît subir dans le pis de la vache. Mais l'enfant prit bientôt après dans la maison de travail où il étoit élevé, une fièvre contagieuse qui empêcha de l'inoculer (1). »

(1) C'est bien dommage. Si cette expérience avoit été faite, & si elle avoit réussi, on auroit un moyen facile de répéter les expériences de l'auteur ; si du moins il est facile de trouver des gens qui consentent à les subir en inoculant le javart même qui probablement est une maladie de tous les pays. Mais s'il faut attendre qu'une vache en ait été infectée ; si pour qu'elle le soit, il faut que la personne chargée de panser les ulcères du cheval soit en même tems employée à traire la vache, le concours de ces circonstances est trop rare & trop difficile pour multiplier les observations de ce genre en d'autres pays ; d'autant plus que bien avertis, comme le sont aujourd'hui les Fermiers, du danger qu'il y a pour leurs bêtes à les faire traire par les mêmes domestiques qui pansent leurs

19°. *Observation.* Je voulus voir ensuite s'il y auroit quelque différence entre la maladie

chevaux, ils ne seront plus assez sots pour les y exposer, ce qui fera peut-être bientôt disparaître entièrement la petite-vérole des vaches. Il est vrai qu'en tout pays on pourroit inoculer directement le javart à la vache; mais outre que la chose n'est pas aussi facile qu'on l'imagineroit bien, puisque comme on le verra bientôt, cette inoculation faite avec un pus déjà épaissi n'a point réussi au Dr. Jenner, cela compliqueroit l'expérience au point d'en détourner peut-être les observateurs. Il y auroit donc un très-grand avantage à n'avoir besoin que du cheval pour produire la maladie sur les hommes, sans lui faire perdre sa propriété de garantir de la petite-vérole ordinaire. A la vérité, les personnes qui l'ont prise directement du cheval même, en pansant ses ulcères n'ont pas paru complètement à l'abri, ce qui pourroit faire croire que le corps humain n'est point propre à produire sur le virus la modification qu'il subit dans le corps de la vache, mais peut-être cette modification n'a-t-elle lieu qu'après la première action générale du virus. Pour bien faire l'expérience, il faudroit donc d'abord inoculer un homme, ou un enfant d'après la sérosité contenue dans les ulcères d'un cheval atteint du javart; inoculer ensuite un autre homme d'après le premier, & celui-ci derechef d'après le second. Il faudroit ensuite leur inoculer à l'un & à l'autre la petite-vérole ordinaire. Si, comme je le crois, ils ne la prenoient ni l'un ni l'autre, si cette expérience répétée avoit toujours le même succès, on seroit fondé à croire que le corps humain est tout aussi propre que celui des vaches à donner au virus du javart la modification nécessaire pour qu'il puisse garantir de la petite-vérole. (O)

communiquée directement de la vache par inoculation & celle qui avoit été communiquée à l'enfant que j'avois inoculé d'après Sarah Nelles. (Voyez la 17^e. Observation dans le premier Extrait.) Le 16 mars j'inoculai pour cet effet William Summers, enfant de cinq ans & demi, avec du pus pris directement sur le pis d'une vache infectée. Les symptômes furent à-peu-près les mêmes. Il tomba malade le sixieme jour, eut un vomissement, des frissons & un léger mal de tête. Mais ces symptômes se dissipèrent le huitieme jour. La couleur de l'ampoule fut un peu moins livide que dans le dix-septieme cas. »

» J'inoculai ensuite la petite-vérole ordinaire à cet enfant, mais sans succès; quoiqu'une autre personne qui n'avoit jamais eu la petite-vérole des vaches, ayant été inoculée avec le même pus, de la même maniere, & dans le même instant, prit bien la petite-vérole, comme à l'ordinaire. »

» 20^e. *Observation.* Je voulus voir après cela, si en passant successivement par le corps de plusieurs personnes, la maladie changeroit de nature & de propriété. William Pead, âgé de 8 ans, fut en conséquence inoculé le 28 mars avec du pus pris sur le bras de William Summers. Au sixieme jour, il se plaignit d'une douleur à l'aisselle. Au septieme jour il fut atteint des symptômes qu'on observe dans

L'inoculation de la petite-vérole ordinaire, & la ressemblance étoit si grande que je voulus examiner attentivement tout le corps pour voir s'il n'y auroit point d'éruption. Il n'y en avoit aucune apparence. Mais l'efflorescence autour de l'incision ressembloit si parfaitement à celle de la petite-vérole inoculée que je la fis graver au moment où le bouton commençoit à sécher, & à être entouré d'une aréole plus rouge à la circonférence qu'au centre. (C'est la troisième gravure. Tous ceux qui l'ont vue, en ont été singulièrement frappés.) »

» Cet enfant fut ensuite inoculé avec du pus variolique ordinaire, mais sans succès. Les incisions s'enflammerent le troisième jour. Le malade y éprouva une grande démangeaison ; mais le sixième jour cette inflammation se dissipa, sans produire aucun effet général. »

» 21°. *Observation.* Plusieurs personnes de tout âge furent inoculées le 5 avril, du bras de William Peard. La plus grande partie d'entr'elles tombèrent malades le sixième jour, & furent guéries le septième ; mais trois eurent une indisposition secondaire, en conséquence d'un érysipèle fort étendu qui se manifesta autour de l'incision, & qui paroissoit provenir de ce que le bouton étoit plus douloureux & plus gros qu'à l'ordinaire, ayant quatre ou cinq lignes (8 à 11 millimètres) de diamètre. Un de ces trois malades n'avoit que six

mois. L'érysipele fut promptement guéri par l'application de l'onguent mercuriel , application qu'on a recommandée en pareilles circonstances dans la petite-vérole. »

» Hannah Excell , âgée de 7 ans , l'une des personnes dont je viens de parler fut inoculée par trois piqûres qui produisirent chacune un bouton tellement semblable à celui que produit l'inoculation de la petite-vérole (ces trois boutons font le sujet de la quatrième gravure) que l'inoculateur le plus expérimenté auroit à peine pu en saisir la différence. La seule qui existe , comme des observations ultérieures me l'ont appris , c'est que le fluide contenu dans les boutons de la petite-vérole des vaches inoculée , demeure limpide jusqu'à la dessiccation , & ne devient pas purulent , comme celui qui est contenu dans les boutons de petite-vérole ordinaire à l'endroit des incisions. »

» 22^e Observation. Du bras de cette fille , j'inoculai le 12 avril quatre enfans , savoir John Macklove , âgé de 18 mois , Robert-François Jenner , âgé de 11 mois , Mary Pead , âgée de 5 ans , & Mary James , âgée de 6 ans. De ces quatre enfans , R. F. Jenner ne prit pas la maladie. Les autres l'eurent comme à l'ordinaire ; mais craignant pour eux l'érysipele observé dans les cas précédens , j'essayai de le prévenir sur deux d'entr'eux en recombrant pendant six heures l'ampoule de l'inci-

fon avec un caustique composé de parties égales de chaux vive & de savon, mais appliqué seulement 12 heures après le commencement de l'indisposition générale. Ce traitement réussit fort bien. Une demi-heure après l'application du caustique, dont les enfans s'aperçurent à peine, leur indisposition cessa totalement, & il ne survint point d'érysipele (1). Il est vrai qu'il

(1) L'auteur demande ici dans une note quel seroit l'effet d'un pareil traitement dans la Petite-vérole inoculée? Une application caustique faite sur l'incision quelques heures après le commencement de la fièvre éruptive, la seroit-elle, cesser, & si elle cessoit, seroit-ce sans préjudice à l'influence préservatrice de l'inoculation? C'est ce qu'il est difficile de décider *a priori*. J'avois inoculé un de mes enfans âgé de 2 mois. Lorsque l'apparence des bras me fit présumer que la fièvre n'étoit pas bien éloignée, je voulus examiner soigneusement quand & comment elle commenceroit. Pour cet effet, dans la soirée du septième jour, je lui touchai le pouls de quart d'heure en quart d'heure. Il fut parfaitement naturel, & à 90 ou 100 jusqu'à dix heures du soir. Alors je le trouvai tout d'un coup à 130 ou 140, & dès ce moment il se soutint dans cet état de fièvre. Cette observation m'avoit fait présumer que le pus formé dans l'incision, s'absorbe en un moment donné, & qu'à l'instant où il atteint le cœur, la fièvre commence, c'est-à-dire que le pouls devient très-fréquent. Mais les autres symptômes fébriles, l'abattement, le mal de tête, le dégoût, les maux de cœur &c. ne surviennent que le lendemain, & ce n'est qu'au troisième ou quatrième jour que se fait l'éruption générale. Tous ces symptômes m'avoient jusqu'à pré-

qu'il n'en survint point non plus à Mary Read ; sur le bras de laquelle on n'avoit point appliqué de caustique.

» 23°. *Observation.* Enfin, du bras de M. Pead, j'inoculai J. Barge, enfant de 2 ans. La maladie qui en fut la suite eut exactement la même apparence, & les mêmes symptômes que dans les cas précédens. Elle eut aussi la même influence, préservatrice contre la petite-vérole

sont parus l'effet du pus absorbé, plutôt que de celui qui est encore dans l'incision. Si donc on arrête l'inflammation du bras par quelque application caustique lorsque l'absorption est faite, lorsque la fièvre a commencé, est-il à présumer que la fièvre cesse ? J'en doute. Mais il arrive si fréquemment que l'expérience renverse les théories les plus plausibles, qu'il seroit très-possible qu'il en fût de même ici ; & j'avoue que ce que l'auteur raconte de la Petite-vérole des vaches ébranle un peu mon opinion, d'autant plus que pendant la fièvre de la Petite-vérole inoculée l'inflammation des bras fait de grands progrès, & qu'enfin lorsque la fièvre cesse, le bouton de l'incision s'enroule pour l'ordinaire d'une aréole moins rouge au centre que vers les bords. Quoiqu'il en soit, c'est l'ensemble de ces symptômes qui constitue le succès de l'inoculation, & il seroit fort étrange qu'on pût les arrêter tout d'un coup sans perdre le fruit de cette opération. Si cela étoit ainsi, ce seroit une des plus belles & des plus intéressantes découvertes médicales qu'on ait faites depuis longtemps. Elle surpasseroit bien par son utilité celle de l'influence préservatrice de la Petite-vérole des vaches. (O)

vérole ordinaire, pour laquelle il fut inoculé avec beaucoup de soin, mais sans succès. Il n'en résulta qu'une inflammation passagère autour des incisions. »

« La petite-vérole des vaches ne perd donc point ses propriétés primitives en passant successivement d'un corps humain dans un autre, puisque cet enfant étoit le cinquième à qui elle avoit été successivement transmise de cette manière. »

Aux vingt-trois observations dont nous venons de parcourir rapidement les détails, l'auteur ajoute des remarques générales qui contiennent encore quelques faits intéressans & des réflexions ingénieuses. En voici l'abrégé.

« Je crois avoir bien démontré, dit-il, que la petite-vérole des vaches est un préservatif assuré contre la petite-vérole ordinaire. S'il étoit nécessaire d'apporter de nouvelles preuves de ce fait, je pourrois ajouter qu'il a été amplement confirmé par le témoignage de Mr. Dolland, chirurgien, demeurant dans un Comté fort éloigné du Gloucestershire, également fameux par ses laiteries. Mylord Sommerville, Président du bureau d'Agriculture, à qui Sir Joseph Banks, avoit communiqué mes observations, s'étoit adressé à ce chirurgien pour avoir des informations sur cet objet. Elles ont été parfaitement conformes à ce que j'ai vu. La petite-

vérole des vaches & la propriété qu'elle a de garantir de la petite-vérole ordinaire sont bien connues aussi dans ce pays - là. »

» Il paroît encore suffisamment prouvé que la petite-vérole des vaches doit son origine au javart des chevaux , & je suis parfaitement convaincu que jamais elle ne se manifeste que dans les endroits où un cheval étant atteint du javart , les domestiques qui pansent les ulcères sont en même temps occupés à traire les vaches , à moins qu'elle ne leur ait été communiquée par des domestiques employés à traire une vache venue d'ailleurs & déjà infectée , ou qu'ils ne la leur aient apportée eux - mêmes d'une autre ferme. J'aurois voulu faire des expériences directes pour vérifier ce fait. J'en avois projeté quelques-unes pour le printemps de 1797 , mais la sécheresse de la saison rendit la chose impossible. Il n'y eut dans mon voisinage aucune vache infectée , aucun cheval atteint du javart. On sait que cette maladie a pour cause principale les pluies froides auxquelles les chevaux sont souvent exposés au printemps. Quand cette saison n'est pas pluvieuse , il est rare qu'ils en foyent atteints. »

» Le fluide contenu dans les ulcères d'un cheval atteint du javart , subit dans le pis de la vache une modification qui augmente certainement son activité. Car d'un côté , il est rare que les domestiques qui pansent les ulcères

d'un cheval malade en soyent affectés ; & de l'autre il n'est pas moins rare que dans le nombre des personnes employées à traire une vache infectée , il y en ait une seule qui échappe à l'infection. »

» Le moment où le virus du cheval a le plus d'activité est le commencement de la maladie , lorsqu'elle ne se manifeste point encore par des ulcères purulens , mais par des fentes qui se forment aux talons de l'animal , & dont il suinte un fluide transparent , mais d'une couleur foncée , semblable à celui qui se forme dans les ampoules produites par un érysipèle. Je suis porté à croire que ce fluide perd son activité quand il devient purulent (1). Car j'ai

(1) Cela me paroît fort extraordinaire. Car quoique dans la petite-vérole le pus le plus limpide m'ait toujours paru le plus actif , cependant tout le monde fait qu'on peut encore inoculer avec succès lorsqu'il est extrêmement épais & prêt à sécher. Les croutes même sont contagieuses , & qui pis est , les petites écailles qui se forment sous ces croutes , lorsqu'elles sont tombées , le sont probablement aussi. *Van Swieten* raconte (Commentar. in H. Boerhaave Aphorism. 1403. T. V. p. 150) que dans le Collège de Thérèse , grande maison d'éducation près de Vienne , où l'on séquestroit sur le champ les jeunes gens atteints de la petite-vérole , & où l'on étoit fort intéressé à abréger la durée du séquestre , on avoit observé qu'il falloit le prolonger au moins 60 jours , (*per novem septimanas*) pour que le convalescent pût communier

souvent essayé d'insérer du pus pris sur de vieux ulcères au talon d'un cheval dans une incision faite avec une lancette sur le pis d'une vache, sans jamais produire par cette opération d'autre effet sur la vache qu'une inflammation locale & passagère. »

Je soupçonne aussi que les vaches ne sont susceptibles de recevoir l'infection d'un cheval qu'au printemps & au commencement de l'été, saison pendant laquelle elles sont fort sujettes à des éruptions spontanées, qu'elles n'ont point dans d'autres temps. Mais ce n'est là qu'une conjecture qu'il faudroit soumettre à une suite d'expériences directes. Quoiqu'il en soit, il est bien certain que dès que la maladie est formée dans la vache, elle peut se communiquer dans toutes les saisons de l'année indifféremment.

» Le virus du cheval ou de la vache est-il susceptible d'infecter la peau humaine par le simple contact, lorsqu'elle est parfaitement saine ? C'est ce que je n'ai pu déterminer encore

quer avec les autres enfans sans leur faire courir le risque de la contagion. C'est sans doute par cette raison que la petite-vérole se communique avec tant de rapidité. Car long-temps avant l'expiration des 60 jours, les malades sortent, vont & viennent, se mêlent dans la société, & fréquentent les promenades, les églises, les collèges & tous les autres lieux publics, sans qu'on se défie d'eux. (O)

d'une maniere exacte. Je soupçonne que non, à moins que le contact n'ait lieu dans des endroits où l'épiderme est extrêmement mince, comme sur les levres. J'ai vu une jeune fille qui pour appaiser la chaleur douloureuse qu'elle éprouvoit à l'un de ses doigts, où la maladie s'étoit manifestée, le portoit souvent à sa bouche, & souffloit dessus. Il en résulta des ulceres semblables sur les levres. Mais à cette exception près, je n'ai connu aucun exemple bien prouvé de communication par le simple contact sans excoriation. Et si les domestiques qui trouvent une vache infectée échappent si rarement à l'infection, c'est parce que la nature de leurs occupations les expose à avoir presque toujours ou quelque coupure sur les doigts, ou quelque piqure d'épine, ou quelque autre accident pareil qui met à nud leur peau.

Il est singulier que la petite-vérole des vaches qui rend le corps humain inaccessible à la petite-vérole ordinaire, ne lui donne point cette sécurité relativement à elle-même, & qu'elle soit susceptible de revénir plusieurs fois. J'en ai déjà cité un exemple; voyez la neuvieme Observation. En voici un autre. Elizab. Wynne, qui avoit eu la petite-vérole des vaches en 1759 fut inoculée en 1797 avec du pus variolique sans succès. Mais en 1798 elle prit la petite-vérole des vaches pour la seconde fois. Je la vis au huitieme jour de l'infection. Elle fa

plaignoit de lassitude & de foiblesse générale ; & avoit alternativement des frissons & de la chaleur , le pouls fréquent & irrégulier , les extrémités froides. Ces symptômes avoient été précédés par un engorgement douloureux à l'aisselle. Elle avoit sur la main un bouton ulcéré semblable à ceux que j'ai décrits ci-dessus.

» C'est aussi une chose très-remarquable que le virus du cheval , dont les effets sont précaires , incertains & indéterminés , avant que d'avoir passé par le pis de la vache , devienne alors non-seulement plus actif , mais encore invariablement doué de cette propriété spécifique de produire constamment sur le corps humain , des symptômes semblables à ceux de la fièvre variolique , & d'opérer sur lui ce changement qui le rend pour toujours inaccessible à la contagion de la petite-vérole. Ne peut-on par raisonnablement conjecturer de-là que la petite-vérole doit son origine à un fluide engendré par quelque maladie dans le cheval , & successivement modifié ensuite par des circonstances accidentelles dont le concours lui a donné enfin cette forme contagieuse & maligne sous laquelle nous le voyons faire tant de ravages ? Et quand on considère le changement que le virus du cheval subit dans le corps de la vache , ne peut-on pas imaginer que le virus de la plupart des maladies contagieuses qui regnent parmi les hommes peut avoir été accoi-

dentellement produit par des causes plus compliquées qu'on ne l'imagineroit d'abord & avoir successivement subi plusieurs modifications, auxquelles ces maladies, très-différentes peut-être dans l'origine de ce qu'elles sont aujourd'hui, doivent enfin leur apparence actuelle. Il est aisé de concevoir, par exemple, que la rougeole, la fièvre rouge, & cette éruption analogue dont le caractère principal est d'être accompagné d'ulcères dans la gorge, peuvent toutes avoir eu la même origine, qui modifiée ensuite par différentes combinaisons nouvelles, en a fait autant de maladies spécifiquement distinctes les unes des autres (1).

(1) Certaines maladies contagieuses ne pourroient-elles pas aussi avoir une origine végétale, & provenir primitivement de l'attouchement de quelque plante vénéneuse. Il y a quelques années que dans plusieurs terrasses & jardins de notre territoire, on cultivoit un assez joli arbrisseau. C'étoit, si je ne me trompe, le *Rhus Toxicodendron* Linn. On l'émondoit toutes les années au printemps, & alors il y avoit toujours quelques-uns des jardiniers & des enfans qui l'avoient touché, qui prenoient des rougeurs, des échaubouluures & des boutons. Quant on s'en aperçut, on recommanda aux enfans de s'abstenir soigneusement d'y toucher, & les jardiniers ne le taillèrent plus que gantés. En se promenant un jour sur une terrasse où il y avoit quelques-unes de ces plantes, une Dame à qui on les faisoit voir eut la curiosité d'en couper une feuille & de s'en frotter le bras. Elle n'éprouva rien d'abord, mais quelques jours après, elle aperçut sur son bras

• Indépendamment des différentes nuances dont la petite-vérole est susceptible, selon qu'elle est distincte ou confluyente, elle peut certainement se montrer sous plusieurs formes différentes. Il y a environ sept ans qu'il régna dans la plupart des villes & des villages du Comté de Gloucester, une espèce de petite-vérole qui étoit si bénigne, qu'on auroit dit que tous les malades avoient été inoculés. Pas un n'en mourut ou ne l'eut même confluyente, au moins à ma connoissance. Cette bénignité ne tenoit certainement ni à la sécheresse ou à l'humidité de l'air, ni à sa température. Car je suivis les progrès de cette maladie pendant plus d'un an, sans jamais appercevoir aucune variation dans son apparence générale. Et mon respectable ami, le Dr. Hicks alors médecin de l'hôpital de Gloucester, & qui se proposa

de la rougeur & de l'inflammation, puis un petit amas de boutons en suppuration & ayant une apparence dartreuse. Ces boutons se communiquèrent à l'avant bras avec lequel ils étoient en contact dans les mouvemens de flexion. Ils la répandirent de-là par le contact sur tout le corps, & furent accompagnés d'une forte de fièvre bilieuse, dont elle eut bien de la peine à se remettre, & qui dura deux mois. Cette maladie étant le produit d'une vraie inoculation auroit certainement pu se communiquer à d'autres personnes, & de l'une à l'autre, on conçoit facilement qu'elle auroit pu prendre une forme régulière & devenir générale. (O)

PETITE-VÉROLE DES VACHES. 385

de publier les nombreuses observations qu'il eût occasion de faire sur cette maladie, fit la même remarque. On ne peut donc la considérer que comme une espèce de petite-vérole différente de la petite-vérole ordinaire, ou plutôt selon le langage des botanistes, comme une *variété*, c'est-à-dire, une modification particulière de la petite-vérole, peut-être accidentelle, mais susceptible de se propager (1).

(1) C'est peut-être quelque épidémie de ce genre qui faisoit dire aux Professeurs De Haën & Van Swieten qu'il n'y avoit pas une grande différence de mortalité entre la petite-vérole naturelle & l'inoculée, puisque sur 220 malades à la Haye dont le premier avoit pris note, il n'en étoit mort que 5, & que sur 355 dont le second avoit pu recueillir l'histoire à Vienne & dans les environs, il n'en étoit mort que 7; si du moins ces assertions méritent quelque confiance. Mais on peut à juste titre soupçonner quelque illusion dans ces sortes de calculs faits dans des maisons particulières & sur des malades choisis. J'ai connu un médecin qui pendant une forte épidémie de petite-vérole que nous eûmes à Genève en 1776 & qui emporta 210 malades, en traita 49 avant que d'en perdre un seul, quoiqu'il y en eût quelques-uns dont la petite-vérole paroissoit très-confluente & très-maligne. Si raisonnant à la manière de Mrs. De Haën & Van Swieten, il avoit conclu de-là qu'en général sur 49 malades de petite-vérole il n'en meurt pas un, la suite de sa pratique l'auroit cruellement détrompé. Le 50^e malade mourut. Le 51 mourut aussi. Le 57 mourut encore. Enfin quand il en eut vu 73, il en étoit mort 7,

Il a souvent été question dans les observations précédentes d'inoculations faites avec un pus bien choisi. C'est en effet une précaution très-importante , & dont l'oubli a eu de funestes conséquences. J'ai connu autrefois un inoculateur qui portoit constamment dans sa poche un petit flacon bouché & rempli de coton ou de lin imprégné de pus variolique en état de fluidité , avec lequel il ne se faisoit aucun scrupule d'inoculer , & souvent après l'avoir gardé fort long-temps sur lui. Il en résultoit à la vérité de l'inflammation aux incisions , des engorgemens à l'aisselle , de la fièvre , & quelquefois une éruption. Mais cette maladie étoit-elle bien la petite - vérole ? Pouvoit-elle mettre les malades à l'abri de la reprendre ? Non certainement. On ne peut pas supposer que du pus placé dans les circonstances les plus propres à le faire entrer en putréfaction , pût conserver les propriétés spécifiques , & donner une petite-vérole véritable , aussi plusieurs de ses inoculés exposés ensuite à la contagion prirent la petite-vérole ; & quelques-uns moururent victimes de la malheureuse sécurité qu'il leur avoit inspirée. J'ai eu connoissance de malheurs semblables arrivés à d'autres inoculateurs , probablement aussi en conséquence de la ma-

autre quelques autres qu'il vit aussi dans le même temps , mais qu'il refusa de traiter , parce que ç'eût été trop tard , & qu'il les jugeoit mourans. (O)

niere peu soigneuse dont ils gardoient le pus variolique sans le mettre à l'abri de la putréfaction (1).

(1) C'est une remarque que fait aussi Mr. Hufeland d'après quelques praticiens d'Allemagne, & sur laquelle il insiste beaucoup. (Voyez la *Bibli. Germanique* N°. 1.) Quant à moi je n'ai jamais eu occasion de rien observer de semblable. J'ai souvent inoculé avec du pus ancien, mais séché sur un verre, sur un fil de coton, sur un morceau de toile, ou sur une éponge; je le délayois dans de l'eau au moment de m'en servir & la seule différence que j'aye vu entre ce pus & le pus frais dont je ne me suis jamais servi qu'au moment où je venois de le prendre, c'est que le premier manque beaucoup plus souvent que le second. Mais quand il réussit la maladie est exactement la même. Puisque l'occasion s'en présente je dirai un mot d'une autre erreur dont j'ai vu deux exemples, & sur laquelle un jeune inoculateur ne sauroit être trop circonspect. Il arrive quelquefois que les boutons de la petite-vérole volante ressemblent si fort à ceux de la vraie petite-vérole, qu'on a pris l'une pour l'autre & qu'on a inoculé avec le pus de ces boutons. Dans les deux cas dont je parle, il en résulta de l'inflammation au bras & une maladie éruptive assez semblable à celle de la vraie petite-vérole. Heureusement qu'on s'aperçut de la différence, & qu'on s'en défia. On fit une seconde inoculation avec de la petite-vérole bien choisie & elle réussit. Comme ce n'étoit pas moi qui avoit fait les premières, je n'ai pas pu juger exactement s'il y avoit eu quelque différence d'action locale entre les deux virus; mais je fus averti qu'il y en avoit eu une très-sensible dans la nature de l'éruption, & en allant à la source, on reconnut l'erreur. (O)

» En parlant d'inoculation , je ne puis m'empêcher de faire aussi mention d'une autre circonstance que je regarde comme d'une grande importance. J'ai de fortes raisons de croire que si les piqûres ou les incisions sont assez profondes pour traverser la peau , & atteindre le tissu cellulaire , le risque de produire une maladie violente est beaucoup augmenté. Avant que les *Suttons* eussent introduit la méthode des piqûres ou des incisions très - légères , j'ai connu un inoculateur qui faisoit une incision assez profonde pour laisser voir *un peu de graisse* , (c'étoit son expression) & qui y inféroit le pus variolique. Mais indépendamment des accidens locaux , de l'irritation , de la douleur , de l'inflammation aux bras , & des abcès qui résultoient de cette pratique , on auroit peine à croire combien de malades avoient entre les mains une petite-vérole confluente & même mortelle. Un autre inoculateur , que je me rappelle bien , passoit avec une aiguille & retenoit sous la peau un sétou imprégné de pus variolique. Les suites de cette méthode n'étoient pas moins déplorables. A-peu-près dans le même temps , le Dr. Hardwick de Sodbury , avoit au contraire un succès presque aussi grand que celui qu'ont eu depuis les *Suttons*. Il faisoit sur la peau une incision aussi superficielle que possible , & y plaçoit le fil. Pendant la fièvre éruptive & durant tout le cours de la

maladie, il tenoit ensuite, conformément à la théorie reçue dans ce temps-là, tous les malades au lit, & avoit soin qu'ils éprouvassent constamment une chaleur douce ? Ne peut-on pas conclure de cette différence de succès entre les deux méthodes, que celui des inoculateurs modernes tient probablement plus à la manière de placer superficiellement le virus sur la peau, qu'au traitement subséquent de la maladie ? (1)

(1) Je suis porté à croire que le véritable siège de préférence pour que la petite-vérole soit bénigne, est le tissu muqueux entre l'épiderme & la peau. Car si le virus est appliqué sur l'épiderme sans incision, je ne saurois voir aucune différence entre cette manière de communication, & celle de la petite-vérole naturelle ; à moins qu'on ne suppose que celle-ci se communique plus fréquemment par les exhalaisons du malade que par le simple contact : quoiqu'il en soit, j'ai vu un cas d'inoculation naturelle, dans lequel la différence fut frappante. J'avois inoculé un petit enfant qui eut une éruption assez abondante ; cet enfant fut pendant toute la maladie porté par sa Bonne. Cette fille n'avoit point dit qu'elle n'eût jamais eu la petite-vérole. Elle s'étoit contentée de dire qu'elle ne la craignoit pas. Elle se trouvoit accidentellement avoir une petite écorchure au col, qui fut constamment en contact avec les bras de l'enfant. Quelques jours après elle se plaignit d'une légère inflammation à cet endroit. Il s'y forma un bouton qui vint en suppuration, produisit de la fièvre, & s'entoura enfin d'une aréole érysipélateuse, au moment où l'éruption générale se fit. La maladie fut très-heureuse, très-bénigne & par-

» Ce n'est pas que je prétende insinuer par là que l'air frais & les boissons froides pendant l'ardeur de la fièvre, ne tendent point à l'appaiser & à diminuer utilement le nombre des boutons. Je veux dire seulement qu'il est impossible d'expliquer le succès non interrompu de la méthode du Dr. Hardwick, & les tristes accidens qui suivoient celle des inoculateurs dont je viens de parler, sans l'attribuer à la différence de leur manière d'insérer la petite-vérole; puisque les uns & les autres avoient recours dans la maladie subséquente, au même traitement.

» Et puisque ce n'est pas le pus que l'on insère dans l'incision qui s'absorbe dans le sang, mais celui qui, par une opération particulière à l'économie animale, y est engendré, on peut concevoir que quoique la peau, la membrane adipeuse & la membrane muqueuse foyent toutes capables d'engendrer ce pus, lorsqu'elles

faitement semblable à la petite-vérole inoculée, non-seulement par le peu d'intensité des symptômes, & par l'apparence du bouton qui en avoit été le précurseur, mais encore par un autre caractère spécifique qui n'a point été assez remarqué, quoiqu'il fût seul pour distinguer la petite-vérole naturelle la plus bénigne, de la petite-vérole inoculée la plus abondante; c'est que la dessiccation des boutons commença au moins trois jours plutôt dans la petite-vérole inoculée que dans la petite-vérole naturelle. (O)

sont stimulées par le contact du pus variolique, l'action de chacune de ces parties peut cependant produire quelque variation dans la qualité du pus qu'elle engendre. Et comment pourroit-on expliquer autrement la différence qui se trouve entre la petite-vérole inoculée & la petite-vérole naturelle? Après tout, il y a lieu de croire que lorsque l'absorption a lieu, les particules varioliques absorbées, ou n'ont point encore leurs qualités spécifiques & contagieuses, ou qu'elles les perdent en conséquence de quelques changemens dans leurs principes par cette absorption même, puisqu'il a été prouvé que quoique le pus variolique prodigieusement délayé dans de l'eau, & probablement autant & plus qu'il le seroit dans le sang, s'il y existoit en nature, donne fort bien la petite-vérole, le sang lui-même des malades ne peut jamais la donner (1). — Mais cette digression est trop

(1) J'avois un jour quatre enfans à inoculer. Il n'y avoit point de petite-vérole dans la ville. Mais un officier de santé que j'avois chargé de m'avertir quand il y en auroit à la campagne, m'ayant indiqué une maison à la distance de trois kilomètres de la ville, en m'assurant que j'y trouverois ce que je cherchois, & que le malade étoit un enfant très-sain, je pris une voiture & j'y conduisis les quatre enfans pour les inoculer. Il se trouva que la petite-vérole étoit entièrement sèche, au point que je ne pus découvrir un seul bouton en suppuration. Mais en visitant bien le malade, j'aperçus entre le pouce & l'index

éloignée de mon sujet pour la prolonger. Je reviens à la petite-vérole des vaches.

» On ignore quand on a commencé à y faire attention dans ce pays. Nos plus vieux fermiers l'ont connue dans leur enfance. Ils se rappellent qu'elle avoit alors les mêmes symptômes & la même marche qu'aujourd'hui. Mais ils ignoroient à cette époque ses rapports avec la petite-vérole ordinaire ; c'est probablement l'introduction générale de l'inoculation qui les a fait découvrir.

» Son ancienneté dans le pays n'est probablement pas bien grande. Car il est vraisemblable qu'on n'employoit pas des hommes à traire les vaches, ni des femmes à panser les chevaux malades. Dans plusieurs autres pays de laiteries, ce n'est point la coutume de confondre ainsi les occupations des deux sexes. En Irlande le plus chétif valet se croiroit deshonoré si on l'occupoit à traire une vache. Aussi la maladie y est-elle absolument inconnue.

» Au reste, la plupart de nos fermiers igno-
roient autrefois que la maladie provint de cette
source

une grosse ampoule pleine d'une sérosité limpide & jaunâtre. Je l'ouvris & j'inoculai les quatre enfans avec cette sérosité. Mais cette inoculation fut complètement inutile. Il n'y eut aucune apparence d'action ni locale, ni générale, & il fallut les réinoculer. Les fluides hors des boutons ne sont donc pas imprégnés d'un virus capable de donner la maladie. (O)

source. Ce n'est que depuis quelques années qu'ils le savent ; & cette connoissance a déjà produit de bons effets. Il est probable que les précautions qu'ils font disposés à prendre à l'avenir , détruiront enfin cette maladie , ou la rendront du moins extrêmement rare.

» Que si l'on demande à quoi peuvent servir ces recherches sur ses rapports avec la petite-vérole ; je répondrai que malgré les bienfaits incontestables de l'inoculation , perfectionnée comme elle l'est aujourd'hui , il est pourtant vrai qu'entre les mains les plus habiles on voit quelquefois des accidens à la suite de la petite-vérole inoculée ; des cicatrices difformes , quelquefois même la mort. Il est impossible que ces malheurs n'inspirent pas un sentiment d'inquiétude & de terreur à l'idée de l'inoculation. Mais comme d'une part la petite-vérole des vaches est contre la petite-vérole ordinaire un préservatif aussi sûr que la petite-vérole inoculée , & que de l'autre elle n'est jamais accompagnée d'aucun accident qui puisse donner des craintes pour la vie , même dans les circonstances les plus défavorables , lorsqu'elle produit par exemple , une inflammation & des ulcères étendus sur les mains , ne peut-on pas conclure de là que l'on pourroit en tirer parti pour introduire une manière d'inoculation préférable à celle qui est généralement adoptée aujourd'hui , surtout dans les familles où l'on

auroit lieu de craindre quelque mauvaise prédisposition héréditaire? Ce qu'il y a de plus à redouter dans la petite-vérole, c'est une éruption trop abondante. Or dans la petite-vérole des vaches, jamais il n'y a d'éruption.

» Jamais aussi elle ne se communique par les exhalaisons du corps malade. Ce n'est que par le contact. Et même il ne paroît pas qu'un simple contact entre le virus & l'épiderme suffise. Il faut qu'il soit appliqué sur la peau mise à nud & dépouillée de la surpeau pour produire son effet. D'où il résulte que dans une famille on peut donner la maladie à un seul individu sans courir le risque d'infecter les autres, & de répandre la terreur dans le pays. J'ai vu plusieurs exemples de cette impossibilité de communiquer la petite-vérole des vaches par les exhalaisons des malades ou par le simple contact. Le premier enfant auquel je l'inoculai coucha pendant toute la maladie avec deux autres enfans qui n'avoient eu ni cette maladie, ni la petite-vérole ordinaire, sans infecter ni l'un ni l'autre. — Une jeune femme affectée de la petite-vérole des vaches, au point d'avoir sur les mains & sur les poignets plusieurs ulcères étendus & en état de suppuration avec beaucoup de fièvre, coucha de même pendant toute sa maladie avec une de ses compagnes qui n'avoit jamais eu ni l'une ni l'autre espèce de petite-vérole, sans lui communiquer aucune

PETITE-VÉROLE DES VACHES. 395

maladie. — Une troisième femme qui en étoit atteinte au même degré, nourrissoit un enfant, & ne l'abandonna point, sans que son nourrisson eût aucun mal.

» A d'autres égards encore l'inoculation de la petite-vérole des vaches auroit quelque avantage sur celle de la petite-vérole ordinaire. Nous voyons souvent celle-ci dans les personnes d'un tempéramment disposé aux scrofules exciter & mettre en activité cette cruelle maladie, & cela arrive tout aussi fréquemment lorsque les boutons sont en petit nombre & d'une bonne nature que lorsque la petite-vérole est confluyente ou d'un mauvais aspect. Peut-être que la petite-vérole des vaches n'auroit pas cet inconvénient. — On voit un assez grand nombre de personnes qui par quelque particularité de leur tempéramment ne peuvent prendre la petite-vérole par inoculation, & qui sont toute leur vie tourmentées de la crainte de la prendre naturellement. Il est vraisemblable que l'inoculation de la petite-vérole des vaches pourroit servir à dissiper ces terreurs. Car comme on peut l'avoir plusieurs fois, & comme la propriété qu'elle a de garantir de la petite-vérole ordinaire n'est que jusqu'à un certain point réciproque, il est probable que cette inoculation donneroit la première, & les mettroit par-là pour toujours à l'abri de la seconde. Il seroit fort extraordinaire que ces personnes là

se trouvaient tout à la fois inaccessibles à l'une & à l'autre.

» Aussi dans le seul cas que j'aye vu où l'action du virus de la petite-vérole des vaches ne se manifesta que par des symptômes locaux sans aucune indisposition générale, la malade se trouva cependant susceptible de prendre la petite-vérole ordinaire. Voici le fait. Elisabeth Sarlenet servoit dans une laiterie de Newpark, paroisse de Berkeley, lorsque la maladie se déclara dans le troupeau, & affecta tous les domestiques employés à traire les vaches. Ils eurent tous des symptômes d'indisposition générale. Elle seule n'en eut aucun, pas même d'engorgement aux glandes axillaires, quoiqu'elle eût plusieurs ulcères sur les doigts. Elle fut dans la suite accidentellement exposée à la contagion de la petite-vérole ordinaire, & la prit. Hannah Pick, une de ses compagnes, eut dans le même temps tous les symptômes de la petite-vérole des vaches complete, ulcères sur les doigts, tumeur & douleur sous les bras, fièvre, mal de tête, &c. Aussi plusieurs essais que je fis ensuite pour lui donner la petite-vérole ordinaire par inoculation, furent-ils inutiles.

» On pourroit peut-être encore faire servir cette susceptibilité du corps humain de prendre la petite-vérole des vaches toutes les fois qu'il y est exposé, au soulagement ou à la guérison de plusieurs maladies chroniques dans lesquelles si on l'inoculoit comme remède, tout nous annonce qu'une diversion de ce genre pourroit être utile.

» Je terminerai ces recherches que je me propose de poursuivre lorsque l'occasion s'en

présentera, par l'exposé d'un fait récent qui semble prouver que le virus de la petite-vérole des vaches peut s'engendrer non-seulement au bas de la jambe des chevaux, mais encore sur d'autres parties de leur corps. Un érysipele étendu se manifesta sans aucune cause apparente sur le haut de la cuisse d'un jeune poulain qui tetoit encore, & qui appartenoit à Mr. Millet, fermier de Rockhampton, près de Berkeley. Cette maladie dura plusieurs semaines, & se termina par trois ou quatre petits abscess. Le domestique qui les pansoit étoit aussi employé à traire les vaches. Il y en avoit 24 dans la ferme. Elles eurent toutes les symptômes de la maladie des vaches. La femme du fermier, le domestique qui pansoit le cheval, & une servante de la ferme, qui étoient les seules personnes employées à les traire, les prirent aussi; les deux domestiques en furent légèrement affectés, parce que le valet avoit eu autrefois la petite-vérole ordinaire & la servante celle des vaches. Mais la fermière qui n'avoit jamais eu ni l'une ni l'autre maladie en fut très-cruellement incommodée. La nature des symptômes qu'elle éprouva ne permit gueres de douter que la maladie communiquée par le poulain aux vaches, & par les vaches aux personnes employées à les traire ne fût bien la vraie & non la fausse petite-vérole des vaches (1). Mais pour le prouver

(1) Voyez le premier Extrait, page 268. Ne pourroit-on pas tirer parti de cette observation pour essayer si un érysipele artificiellement produit sur la peau d'un cheval ne donneroit pas la maladie? Si le javart est, comme on le dit, une maladie accidentelle, & qui n'a rien de spécifique, il semble probable que de quel-

complètement, il auroit fallu inoculer la petite-vérole ordinaire à la fermière. C'est ce que des circonstances particulières ne permirent pas. »

Tel est le sommaire, ou pour mieux dire la presque totalité de l'intéressant ouvrage du Dr. Jenner. Il est le premier qui ait fait connoître au public la maladie qui en fait l'objet, & la possibilité de garantir de la petite-vérole par l'inoculation de cette maladie. Mais un auteur anonyme qui ne paroît pas avoir eu connoissance de ces faits, vient de hasarder une idée analogue en proposant une suite d'expériences pour essayer si l'inoculation du Claveau, maladie des brebis qui a beaucoup de ressemblance avec la petite-vérole, ne pourroit pas utilement remplacer l'inoculation de la petite-vérole elle-même. Il ne cite aucun fait à l'appui de cette conjecture. Ainsi les observations à faire sur ce sujet auroient le mérite de la nouveauté (1);

que manière que fût produite la sérosité qui donne lieu à la petite-vérole des vaches, elle pourroit toujours avoir cet effet; que c'est une propriété particulière à la sérosité accidentellement épanchée par quelque cause que ce soit dans le tissu muqueux des chevaux; & si, comme je le présume, le corps humain est aussi propre à la modifier que celui des vaches, on auroit par là un moyen facile de faire l'expérience dont je parlois plus haut, page 370 à la note. (O);

(1) Voyez la feuille du Cultivateur du 12 frimaire N°. 15; on lit aussi dans celle du 7 frimaire N°. 14. des expériences très-curieuses du Cit. Coste. Il avoit éprouvé par l'effet du claveau une mortalité considérable dans ses moutons; & ayant observé que les plus jeunes bêtes avoient toujours la maladie plus bénigne, il imagina de l'inoculer à ses agneaux. Il fit frotter pour cet effet la surface du bercail qui recevoit ordinairement son troupeau avec la peau d'un mouton

& quelqu'en fut le résultat, fut-il même absolument négatif; ces observations ne pourroient manquer d'être utiles sous plus d'un rapport. Ceux de nos lecteurs qui voudront se mettre au fait de cette maladie, de sa marche, de ses symptômes, de son analogie, pour ne pas dire de son identité avec la petite - vérole, ainsi qu'avec le claveau des dindons, & des différens moyens de guérison dont elle est susceptible, peuvent consulter l'excellente instruction sur le claveau des moutons, rédigée par le Cit. Gilbert, professeur de l'école vétérinaire d'Alfort, & publiée par le Conseil d'agriculture sous le ministère du Citoyen BENEZECH.

mort de la maladie. Quelque grossier que fût ce mode d'inoculation, il réussit; sur 350 bêtes inoculées, il n'en perdit que deux, tandis qu'auparavant il en avoit perdu 230 sur le même nombre; les 348 qui en furent par ce moyen préservées, prospérèrent & se vendirent de 125. à 150 centimes par bête au-dessus du prix ordinaire, en considération de ce qu'elles avoient eu la maladie. Au reste, ce n'est pas la première fois qu'on ait inoculé le claveau. Le Prof. Venel & le Cit. Tessier avoient déjà tenté cette expérience avec succès; & l'un de nos compatriotes, le Cit. Lullin, qui passionné pour l'Agriculture marche depuis longtems avec honneur dans cette carrière sur les traces de son ayeul, le célèbre *Dechâteauvieux*, nous informe que menacé un jour de perdre par l'effet du claveau qui s'y étoit manifesté, les trois quarts d'un grand troupeau de brebis qu'il soignoit, il inocula par l'incision toutes les bêtes encore intactes, & réduisit par ce moyen sa perte à un huitième. (O)

E R R A T A.

Pag. 214. lig. 20. » millions seize mille » lisez
» mille seize »

TABLE DES ARTICLES

DU 9^{me}. VOLUME.

de la division, intitulée : SCIENCES ET ARTS.

EXTRAITS.

PHYSIQUE.

Observations sur les effets de l'huile jetée sur l'eau, par le Dr. Martin WALL.	Page. 3
Suffrages britanniques favorables à la physique spéculative, par le Cit. LESAGE.	24
Mouvements spontanés des mèches allumées & nageant dans un bassin d'huile, &c. par P. WILSON.	115
Essais sur le microscope, par G. Adams, 1 ^{er} . <i>Extrait.</i>	197
Idem, <i>Second Extrait.</i>	297

METEOROLOGIE.

Tableaux des observations météorologiques, après la page.	96
..... après la page.	195
..... après la page.	296
..... après la page.	400

GEOLOGIE.

Sur l'état primitif du globe & la catastrophe qui lui a succédé, par R. KIRWAN, <i>Premier Extrait.</i>	228
Idem, <i>Dernier Extrait.</i>	337

ASTRONOMIE.

Découverte de quatre nouveaux satellites de la planète d'Herschel, &c. par W. HERSCHEL.	97
---	----

OPTIQUE.

Solution d'un problème d'optique, par W. RITTENHOUSE.	129
---	-----

MATHEMATIQUES.

Observations sur les tables trigonométriques des Brahmines, par le Dr. PLAYFAIR.	139
--	-----

CHEMIE.

Explosions & inflammations spontanées, par le C. MOROZZO.	148
Observations & expériences sur la formation du fer, par SMITH.	289

HISTOIRE NATURELLE.

Elémens de minéralogie, par R. KIRWAN, 2 ^d . <i>Extrait.</i>	47
Détails sur les tourbes de Kincardine & Flanders, par W. Christ. TAIT.	162
Description des rochers d'Andersbach en Bohême.	291

BOTANIQUE.

Flore des champs, par Théod. MARTYN.	178
--------------------------------------	-----

PHYSIOLOGIE.

Dissertation sur la physiologie des plantes, par le Dr. George BELL.	67
--	----

MEDICINE.

Recherches sur l'origine, &c. de la petite-vérole des vaches, par Ed. JENNER, <i>Premier Extrait.</i>	258
Idem, <i>Second Extrait.</i>	367

ARTS.

Disposition particulière dans les armes à feu, inventée par J. WILSON.	192
--	-----

CORRESPONDANCE.

Lettre du Cit. J. B. GUYTON, aux Rédacteurs de la Bib. Brit.	94
--	----

ANNONCES, VARIETES, &c.

Constitution d'un homme destiné à vivre long-temps, par HUFELAND.	265
---	-----

Fin du 9^{me}. Volume de la division, intitulée :

SCIENCES ET ARTS.

1
3
15
17
64
94
176
67
119
147
159
94
265

